

124
alogus


a.

r.

triadica.



Berlin W. 15
10. XII. 1923.



Miner Ge

Fossilium Catalogus

I: Animalia.

Editus a

C. Diener.

Pars 19:

C. Diener

Lamellibranchiata triadica.



W. Junk
Berlin W. 15
1923



Lamellibranchiata Triadica.

Auct.: C. Diener.

Die Lamellibranchiaten der Triasperiode fügen sich in die systematische Anordnung, die von Broili in der letzten Auflage von K. v. Zittel's „Grundzügen der Palaeozoologie“ (1915) befolgt worden ist, so gut ein, daß ich nur in sehr wenigen Punkten von der letzteren abgewichen bin, z. B. in der Fassung der *Trigoniidae*.

Die Aufteilung der Arten mußte bei einzelnen weit gefaßten Gattungen (*Pecten*) in vielen Fällen unterbleiben, da für die meisten Gattungen die Zuweisung zu einer bestimmten Untergattung oder Gruppe sich als undurchführbar erwies. Wiederholte habe ich zu dem Auskunftsmitte greifen müssen, daß die Zuweisung zu einer bestimmten Untergattung wohl für jene Arten vorgenommen wurde, die dem betreffenden Subgenus mit Bestimmtheit zufallen, daß dagegen die zweifelhaften Spezies bei der Hauptgattung belassen wurden, so u. a. bei *Pseudomonotis*. Dieses Verfahren hat zur Folge, daß wohl die Subgenera *Eumicrotis*, *Eumorphotis* und *Claraia* einheitlich gefaßt sind, daß hingegen bei *Pseudomonotis s. s.* nicht nur die typischen Vertreter der Gruppe der *Ps. ochotica*, sondern auch alle zweifelhaften Elemente eingereiht sind, deren Zuteilung zu einer bestimmten Untergattung nicht erfolgen konnte.

Die artenreichste unter den Lamellibranchiatenfaunen der Triasperiode ist unzweifelhaft jene der rhaetischen Stufe. Da eine Neubearbeitung der alpinen Formen seit A. v. Dittmar (1864) und Martin (1865) leider nicht mehr stattgefunden hat, so sind die richtigen Genusnamen für viele Arten nicht mit Sicherheit festzustellen. So ist es z. B. zweifelhaft, ob irgend eine der früher als *Area* beschriebenen Formen bei dieser Gattung in ihrem gegenwärtigen Umfang verbleiben kann. Ich selbst war nicht in der Lage eine solche Revision vorzunehmen, habe daher den rhaetischen Spezies der ostalpinen Trias die ihnen von den beiden oben genannten Autoren zugewiesene generische Stellung belassen müssen, soweit nicht eine Änderung auf Grund späterer Arbeiten über exotische Faunen (Healey) durchgeführt werden konnte.

Die von Sandberger in seinem Verzeichnis der Triasversteinerungen von Unterfranken neu aufgestellten Bivalvenspezies sind als *Nomina nuda* zu betrachten und haben demzufolge in diesem Katalog keine Aufnahme gefunden.

Dagegen konnte ich die bei De-Sefani (Verhandl. Geol. R. A. Wien, 1882, p. 96—106) als neu eingeführten Arten nicht wohl in gleicher Weise behandeln, da sie zwar nicht abgebildet aber gut beschrieben worden sind.

In eine ähnliche Verlegenheit kommt man bezüglich einer nicht geringen Anzahl von Arten in A. v. Dittmars „Contortazone“, die nach den Angaben von Schafhäutl und C. v. Gembel aufgezählt aber niemals illustriert worden sind. Ich habe sie in den Katalog aufgenommen, obwohl sie ohne Zweifel minderwertige Spezies sind, diese Tatsache übrigens stets durch die Bemerkung: Deest imago! hervorgehoben. Wenn der Name einer solchen Spezies mit einem anderen in Konkurrenz trat, der sich auf eine abgebildete Art bezog, so habe ich — unbekümmert um eine allfällige Priorität — dem letzteren den Vorzug gegeben, z. B. *Gervilleia ornata* Moore (1861) vor *G. Faberi* Winkler (1859).

In Capellini's „Infralias von Spezia“ habe ich nur die abgebildeten Spezies berücksichtigt. Die von Stoppiani im dritten Teile seiner Paléontologie Lombarde (Couches à *Avicula contorta*) als *sp. ind.* bezeichneten Formen sind in der Regel selbst dann außer Berücksichtigung geblieben, wenn sie abgebildet worden sind, da ihre Wiedererkennung unmöglich und selbst die generische Bestimmung in vielen Fällen unsicher ist.

Im allgemeinen habe ich im Katalog nur Originalabbildungen verzeichnet, nicht aber Kopien, wie z. B. im 2. und 4. Teil des ersten Bandes der *Lethaea mesozoica*.

Die Trias schließe ich nach oben mit der Zone der *Avicula contorta* ab. Ich habe daher unter den von Stoppiani, Dumortier und Capellini aus dem Infralias angeführten Arten nur diejenigen in den Katalog aufgenommen, die nach de Stefani und Martin dieser Zone angehören, da bei den genannten Autoren der Infralias auch die tiefsten Liasschichten nach der deutschen Nomenklatur mitumfaßt.

In der Synonymenliste ist für jede einzelne Art der ursprüngliche Name der Spezies bezw. Gattung oder Untergattung ersichtlich gemacht worden, unter dem sie von dem betreffenden Autor zitiert wird.

Kursivschrift bedeutet Namen, die nach dem heutigen Stand unserer Kenntnis nicht mehr gebräuchlich sind.

Jede einzelne Spezies ist, um ihre Auffindung zu erleichtern, unter dem Namen jeder Gattung zitiert worden, unter dem sie ein Autor jemals angeführt hat.

Über die Bedeutung der im Katalog zur Anwendung gebrachten Abkürzungen gibt das Literaturverzeichnis Aufschluß.

Literatur.

- J. Ahlbürg: Die Trias im südlichen Oberschlesien. Abhandl. Preuß. Geol. Landesanst. N. F. Heft 50. Berlin, 1906.
- C. Airaghi: I molluschi dei schisti bituminosi di Besano in Lombardia. Atti Soc. Ital. scienze nat. Milano, LI. 1912, p. 5—30.
- F. v. Alberti: Beiträge zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalkes und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation (Trias). Stuttgart, 1834.
- Überblick über die Trias. Stuttgart, 1864.
- G. v. Arthaber: Die alpine Trias des Mediterrangebietes. *Lethaea mesozoica*, I/3, 1906.
- Die Trias von Bithynien. Beiträge zur Palaeontol. Österreich-Ungarns etc. XXVII. 1915. p. 191.
- Die Fossilführung der anisischen Stufe in der Umgebung von Trient. Jahrbuch G. R. A. LXV. 1915, p. 239—260.
- R. Assmann: Die Brachiopoden und Lamellibranchiaten der oberschlesischen Trias. Jahrb. Preuß. Geol. Landesanst. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3.
- J. Auerbach: Gora Bogdo. St. Petersburg, 1871 (Russ.).
- F. Bassani: Fossili nella dolomia triasica dei dintorni di Mercato S. Severino in provincia di Salerno. Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 1—14.
- Gisela Beneder: Die Homomyien und Pleuromyien des Muschelkalkes der Heidelberger Gegend. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LXXIII. 1921, p. 34—112.
- E. W. Benecke: Über Trias und Jura in den Südalpen. Geognost. Palaeontol. Beiträge von Benecke etc. I. 1865, p. 1—204.
- Über einige Muschelkalkablagerungen der Alpen. Ibidem II. 1868, p. 1—67.
- Über die Umgebung von Esino in der Lombardei. Ibidem, II. 1876, p. 311.
- Über die Trias in Elsaß-Lothringen und Luxemburg. Abhandl. z. Geol. Spezialkarte v. Elsaß-Lothringen I/4, 1877 (Fossilisten).
- Myophoria inflata im Schwäbischen Rhaet. Neues Jahrb. f. Min. etc. 1900, I. p. 218.
- Über *Mytilus eduliformis* Schloth. Zentralblatt f. Min. etc. 1905, p. 705—714.
- H. Berger: Die Keuperformation mit ihren Conchylien in der Gegend von Coburg. Neues Jahrb. f. Min. etc. 1854, p. 408—417.
- Die Versteinerungen im Roeth von Hildburghausen. Ibidem, 1859, p. 168—171.

- H. Berger: Die Versteinerungen des Schaumkalkes am Thüringerwald. *Ibidem*, 1860, p. 196—206.
- E. Beyrich: Zwei aus dem deutschen Muschelkalk noch nicht bekannte, Avicula-artige Muscheln. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XIV. 1862, Prot. p. 9.
- A. Bittner: Zwei neue Fundorte von Monotis in Niederösterreich. *Verhandl. G. R. A.* 1891, p. 272.
 — Triasprefakten von Balia in Kleinasiens. *Jahrb. G. R. A.* XLI. 1891, p. 97.
 — Neue Arten aus der Trias von Balia in Kleinasiens. *Ibidem*, XLII. 1892, p. 77.
 — Zur Kenntnis der Nuculiden und Arciden der Fauna von St. Cassian. *Verhandl. G. R. A.* 1894, p. 186.
 — Neue Brachiopoden und eine neue Halobia der Trias von Balia in Kleinasiens. *Jahrb. G. R. A.* XLV. 1895, p. 249.
 — Lamellibranchiaten der alpinen Trias. I. Revision der Lamellibranchiaten von St. Cassian. *Abhandl. G. R. A.* XVIII/1, 1895.
 — Beiträge zur Palaeontologie, insbesondere der triadischen Ab- lagerungen zentralasiatischer Hochgebirge. *Jahrb. G. R. A.* XLVIII. 1898, p. 681.
 — *Trias Brachiopoda and Lamellibranchiata. Pal. Ind. ser. XV. Himalayan Fossils*, Vol. III. Pt. 2. 1899.
 — Versteinerungen aus den Triasablagerungen des Süd-Ussuri- Gebietes, in der ostsibirischen Küstenprovinz. *Mém. Com. géol.* Vol. VII. No. 4, St. Pétersbourg, 1899.
 — Über ein von Herrn Bergauptmann J. Grimmer in Sarajevo untersuchtes Kohlevorkommen nächst Trebinje. *Ver- handl. G. R. A.* 1900, p. 145—148.
 — Über nachtriadische Verwandte der Gattung Mysidoptera, *Ibidem*, p. 207.
 — Über die triadische Lamellibranchiatengattung Mysidoptera. *Jahrb. G. R. A. L.* 1900. p. 59.
 — Über Pseudomonotis Telleri und verwandte Arten der unteren Trias, *Ibidem*, 1900, p. 559—593.
 — Lamellibranchiaten aus der Trias von Hudiklanee nächst Loitsch in Krain. *Ibidem*, 1901, LI. p. 225—235.
 — Lamellibranchiaten aus der Trias des Bakonyerwaldes. Resul- tate d. wissenschaftl. Erforschg. d. Balatonsees. I/1, *Palaeontol. Anhang.* Budapest, 1901.
 — Brachiopoden und Lamellibranchiaten aus der Trias von Bosnien, Dalmatien und Venetien. *Jahrb. G. R. A.* LII. 1902, p. 534—636.
- M. Blanckenhorn: Die Trias am Nordrande der Eifel. *Abhandl. Geol. Spezialkarte v. Preußen etc.* VI/2, Berlin 1888.
- G. Böhm: Über die Beziehungen von *Pachyerisma*, *Megalodon*, *Diceras* und *Caprina*. *Zeitschr. Deutsch. Geol.* XXXIV. 1882, p. 602.
- J. Böhm: Über die obertriadische Fauna der Bäreninsel. *K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.* XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903.
 — Über *Cassianella Eckii nov. sp.* *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* LVI. 1904, *Briefl. Mitt.* p. 95.
 — Über Triasversteinerungen vom Bellsunde auf Spitzbergen. *Arkiv f. Zoologi*, K. Svenska Vetensk. Akad. Stockholm, VIII. No. 2, 1912.
- O. Böttger: Die Tertiärformation von Sumatra und ihre Tierreste. III. Die Conchylien der unteren Tertiärschichten. *Palaeonto- graph. Suppl.* III. 1880, *Liefg.* 8, 9.
- A. Borissjak: Pseudomonotis ochotica der Krym-kaukasischen Trias. *Bull. Com. géol. St. Pétersbourg*, XXVIII. No. 156, 1909, p. 87—107.
- J. Bornemann: Versteinerungen im spanischen Muschelkalk. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* VIII. 1856, p. 165.
 — Über organische Reste der Lettenkohengruppe Thüringens. Ein Beitrag zur Fauna und Flora dieser Formation. Leipzig, 1856.

- J. Bornemann: Beiträge zur Kenntnis des Muschelkalkes, insbesondere der Schichtfolge und der Gesteine in Thüringen. Jahrb. Preuß. Geol. Landesanst. f. 1885, p. 267—322.
- A. Boué: Aperçu sur la constitution géologique des provinces Illyriennes. Mémoires Soc. géol. de France, II/1, 1835, p. 43—90.
- C. Braun: Die Tiere in den Pflanzenschiefern der Gegend von Baireuth. Baireuth, 1860.
- F. Broili: Die Fauna der Pachycardientuffe der Seiser Alp. Palaeontograph. L. 1904, p. 164—227.
- H. Bronn: Über die Muschelversteinerungen des süddeutschen Steinsalzgebirges, welche bisher unter dem Namen Pectinites salinarius zusammengegriffen wurden. Leonhard und Bronns Jahrb. f. Mineral. etc. I. 1830, p. 282.
- Lethaea geognostica. 2. Aufl. 1837, 3. Aufl. III. Teil, 1856.
- C. Brunner v. Wattenwyl: Aperçu géologique des environs du Lac de Lugano. Neue Denkschr. d. allgem. Schweizer. Naturforsch. Ges. XII. 1852, p. 1.
- L. v. Buch: Sur l'existence du Muschelkalk dans les Alpes de la Lombardie. Bull. Soc. géol. France, sér. 2, T. II. 1845, p. 348.
- C. Burckhardt: La faune marine du Trias supérieur de Zacatecas. Boletino Inst. geol. de Mexico, No. 21, 1905.
- G. Capellini: Fossili infraliasici dei dintorni del Golfo della Spezia. Mem. Acad. sci. Bologna, ser. 2, Vol. V. 1866.
- F. Catullo: Memoria geognostica paleozoica sulle Alpi Venete (1845). Memorie Soc. Ital. Modena, XXIV. 1848, p. 187—339.
- G. Checchia-Rispoli: Nuove osservazioni sulla fauna triasica della Punta delle Pietre Nere. Boll. Soc. geol. Ital. XX. 1901, p. 128.
- G. Comptier: Der mittlere Keuper in der Umgebung von Apolda. Zeitschr. f. d. ges. Naturwissenschaften, Leipzig, LXXVII, 1904, p. 81—117.
- M. Cossmann: Sur l'évolution des Trigoniens. Annales de Paléontol. T. VII/2, Paris, 1912, p. 58—84.
- O. G. Costa: Nota ad una comunicazione di G. Napoli. Annali Acad. aspiranti natur. Napoli, ser. 3, Vol. IV. 1864.
- Note paleontologiche e geologiche sui Monti Picentini nel Principato citeriore. Atti Istituto incorrag. Napoli, ser. 2, T. I. 1864, p. 25.
- H. Credner: Über die Gervillien der Triasformation in Thüringen. Neues Jahrb. f. Mineral. 1851, p. 641—657.
- G. Curioni: Sulla successione normale dei diversi membri del terreno triasico nella Lombardia. Giornale Ist. Lombardo, Milano, VII. 1855, p. 204—236.
- D. del Campa: Fossili della dolomia principale della valle di Brenta. Boll. Soc. geol. Ital. XXVI. 1907, p. 465—477.
- K. Deninger: Die mesozoischen Formationen auf Sardinien. Neues Jahrb. f. Mineral. Beil. Bd. XXIII. 1907, p. 437—448.
- C. Diener: Über den Typus der Gattung *Pseudomonotis* Beyr. Zentralblatt f. Mineral. 1902, p. 342.
- Noch ein Wort über den Typus der Gattung *Pseudomonotis*. Ibidem, 1903, p. 17.
- Himalayan Fossils. Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 1. The fauna of the Tropites limestone of Byans. 1906. — Vol. V. Pt. 2. The fauna of the Himalayan Muschelkalk, 1907. — Vol. V. Pt. 3. Ladinic, carnic and noric faunæ of Spiti, 1908. — Vol. I. Pt. 1. Upper triassic and liassic faunæ of the exotic blocks of Malla Johar. 1908. — Vol. VI. No. 2. The fauna of the Traumatocerinus-limestone. 1909.
- Notes on an upper triassic fauna from the Pishin district, Baluchistan. Records Geol. Surv. India, XXXVI/3, 1908, p. 12—21.
- Notes on some fossils from the sedimentary rocks of Oman. Ibidem, XXXVI/3, 1908, p. 156—163.
- Mediterrane Faunenelemente in den Otoceras beds des Hima laya. Zentralblatt f. Mineral. 1912, p. 58.

- C. D i e n e r: Triassic faunae of Kashmir. Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913.
- Japanische Triasfaunen. Denkschr. kais. Akad. Wiss. Wien, XCII. 1915, p. 26.
 - Die marinen Reiche der Triasperiode. Ibidem, p. 404—549.
 - Zur systematischen Stellung der Pelecypodengattung *Pomarangina*. Zentralblatt f. Mineral. 1915, p. 129.
- A. v. D i t t m a r: Die Contortazone. München, 1864.
- H. Du m o r t i e r: Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône. I. Infralias. Paris, 1864.
- W. D u n k e r: Über die im Kasseler Muschelkalk bis jetzt gefundenen Mollusken. Programm d. höheren Gewerbeschule in Kassel, 1848/49.
- Über die im Muschelkalk Oberschlesiens bis jetzt gefundenen Mollusken. Palaeontograph. I. 1851, p. 283.
- Th. E b e r t: Notiz über die Auffindung von Conchylien im mittleren Muschelkalke bei Rüdersdorf. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XVIII. 1866, p. 659.
- Über die Art des Vorkommens und die Verbreitung von *Gervilleia Murchisoni* G e i n. im mittleren Buntsandstein. Jahrb. Preuß. Geol. Landesanst. f. 1888, p. 237—243.
- H. E c k: Der Opatowitzer Kalkstein des oberschlesischen Muschelkalkes. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIV. 1862, p. 288.
- Versteinerungen aus Keuper und Buntsandstein. Ibidem, XVII. 1865, p. 254, Prot.
 - Über die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalkes in Oberschlesien. Berlin 1865.
 - Rüdersdorf und Umgegend. Abhandl. z. Geol. Spez. Karte v. Preußen I/1, 1872.
 - Zweite Bemerkung zur *Lethaea geognostica*, betreffend die deutsche Trias. Zentralblatt f. Mineral. 1904, p. 503—506.
- E. v. E i c h w a l d: Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergleichenden Geognosie auf einer Reise durch die Eifel, Tirol, Italien, Sizilien und Algier, 1851. II. Geognostischer Ausflug nach Tirol. Nouv. Mémoires Soc. imp. des Naturalistes Moscou, IX. 1851.
- H. E m m r i c h: Geognostische Beobachtungen in den östlichen bayerischen Alpen und den angrenzenden östlichen Alpen. Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 326.
- Th. E n g e l: Geognostischer Wegweiser durch Württemberg. 2. Aufl. 1896.
- O. F i e d l e r: Über Versteinerungen aus den Arlbergschichten bei Bludenz. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LVI. 1904, p. 8—13 (Briefl. Mitt.).
- v. F i s c h e r - O o s t e r: Die rhaetische Stufe der Umgebung von Thun. Mitteil. Naturwissenschaftl. Ges. Bern, 1869, p. 687.
- E. F r a a s: Der Petrefaktensammler. Stuttgart 1910.
- O. F r a a s: Über *Semionotus* und einige Keuperconchylien. Württembergische Naturwissenschaftl. Jahreshefte, XVII. 1861, p. 81.
- W. F r a n t z e n: Über *Gervilleia Goldfussi*. Jahrb. Preuß. Geol. Landesanst. 1886, p. 307—315.
- F. F r e c h: Über *Mecynodon* und *Myophoria*. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XLI. 1889, p. 127—138.
- Die devonischen Aviculiden Deutschlands. Abhandl. z. Geol. Spez. Karte v. Preußen, 1891.
 - Über *Diceras*-ähnliche Zweischaler aus der mittleren Alpentrias. Neues Jahrb. f. Mineral. 1902, II. p. 127.
 - Über *Gervilleia*. Zentralblatt f. Mineral. 1902, p. 609—620.
 - Neue Zweischaler und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. Resultate d. wissenschaftl. Erforschg. d. Balatonsees, Palaeontol. Anhang z. I. Teil d. I. Bandes, 1904.
 - Nachträge zu den Brachiopoden und Zweischalern der Bakonyer Trias (Werfener und Cassianer Estherienschichten). Ibidem, 1905.

- F. Frech: Die Leitfossilien der Werfener Schichten und Nachträge zur Fauna des Muschelkalkes, der Cassianer und Raibler Schichten, sowie des Rhaet und des Dachsteinkalkes (Haupt dolomit). *Ibidem*, 1907.
- Über Aviculiden von palaeozoischem Habitus aus der Trias von Zacatecas. *Compte-rendu Congrès Géol. internat. Mexico*, 1907, p. 327—335.
- Cirkumpazifische Trias. *Lethaea mesozoica*, I/4, 1908.
- W. Gabb: Description of the triassic fossils of California etc. *Geol. Surv. of California. Palaeontology*, I. 1864.
- A. Galdieri: La malacofauna triasica di Giffoni nel Salernitano. *Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli*, Vol. XII. ser. 2, No. 17, 1905.
- Sul Trias dei dintorni di Giffoni. *Atti Acad. Pontaniana*, Napoli, XXXVIII. 1908.
- H. Beinitz: Über einige Petrefakten des Zechsteins und Muschelkalks. *Neues Jahrb. f. Mineral.* 1842, p. 576.
- G. Gemmellaro: Sul Trias della regione occidentale della Sicilia. *Memorie Acad. dei Lincei*, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 451-473.
- G. B. Giattini: Fossili del Lovcen nel Montenegro. *Rivista Ital. di Paleontol.* VIII. Bologna, 1902, p. 62—66.
- L. Giebel: Kritisches über die Myophorinen des Muschelkalkes. *Zeitschr. f. d. ges. Naturwissenschaften*. Halle, V. 1855, p. 34.
- Die Versteinerungen im Muschelkalk von Lieskau bei Halle. *Ibidem*, VII. 1856. Sep. Berlin, 1856.
- Palaeontologische Untersuchungen. *Ibidem*, X. 1857, p. 301.
- Über die Gattung Neoschizodus im Lieskauer Muschelkalk. *Ibidem*, XXXI. 1868, p. 127.
- W. Goette: Die rhaetische Stufe und der unterste Lias der subtropischen Zone in der Tatra. *Bull. Acad. sciences de Cracovie*, sér. A. Nov.-Dec. 1916, p. 201.
- A. Goldfuss: Petrefacta Germaniae. II. Leipzig, 1838.
- M. Gortani: Nuovi fossili Raibliani della Carnia. *Rivista Ital. di Paleontol.* Bologna, VIII. 1902, p. 76—94.
- v. Gruenewalt: Versteinerungen des schlesischen Zechsteingebirges. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* III. 1851, p. 241.
- O. Gruppe: Der untere Keuper im südlichen Hannover. *A. v. Koenen - Festschrift*, 1907, p. 65—134.
- C. v. Gembel: Geognostische Beschreibung des Bayerischen Alpengebirges. I. 1861.
- Die Dachsteinbivalve und ihre alpinen Verwandten. *Sitzber. Akad. Wiss. Wien*, XLV. 1862. p. 325.
- Über das Vorkommen von unteren Triasschichten in Hochasien (nach den von den Brüdern Schlagintweit gesammelten Fundstücken beurteilt). *Sitzber. bayer. Akad. Wiss. München*, 1865 (II), p. 348—366.
- F. v. Haauer: Über die von Herrn Bergrat W. Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, II. 1850, p. 109.
- Über einige Fossilien aus dem Dolomit des Monte San Salvatore bei Lugano. *Sitzber. Akad. Wiss. Wien*, XV. 1855, p. 407.
- Palaeontologische Notizen. *Ibidem*, XXIV. 1857, p. 145.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Raibler Schichten. *Ibidem*, XXV. 1857, p. 253.
- M. Healey: The fauna of the Napeng beds of upper Burma. *Palaeontologia Indica*, new ser. Vol. II. Pt. 4, 1908.
- E. Hébert: Recherches sur l'age des grès à combustibles d'Helsingborg et d'Höganäs, suivies de quelques aperçus sur les grès de Höör. *Annales sciences géol.* Paris, 1869, p. 1.
- M. Hoernes: Über die Gastropoden und Acephalen der Hallstätter Schichten. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, IX, 1855, p. 49—54.
- R. Hoernes: Ein Beitrag zur Kenntnis der Megalodonten. *Verhandl. Geol. R. A.* 1876, p. 46.
- Materialien zu einer Monographie der Gattung Megalodon. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, XLII. 1880. p. 91.

- R. Hoernes: Über Analogien des Schloßapparates von Megalodon, Diceras und Caprina. Verhandl. Geol. R. A. 1882, p. 179.
- Beiträge zur Kenntnis der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony. Földt. Közlöny, 1899, p. 323—331, 351—360 Auszug in Frech: Neue Zweischaler und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. I. c. 1904.
- K. Hofmann: Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Hauptdolomits und der älteren Tertiärgebilde des Ofen-Kovacsier-Gebirges. Mitteil. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anstalt II. 1873. p. 181—206.
- V. Hohenstein: Beiträge zur Kenntnis des mittleren Muschelkalkes und des unteren Trochitenkalkes am östlichen Schwarzwaldrand. Geol. u. Palaeontol. Abhandl. v. Pompeckj u. v. Huene, N. F. XII/2, 1913.
- A. Hyatt: Jura and Trias of Taylorville, California. Bull. Geol. Soc. America. III. 1892.
- E. Jaworski: Die Fauna der obertriadischen Nucula-Mergel von Misol. Palaeontol. v. Timor, 2. Liefg. Abt. V. Stuttgart, 1915.
- Graf Keyserling: Fossile Mollusken, in A. v. Middendorffs „Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens“. I/1, 1848.
- E. Kittl: Geologie der Umgebung von Sarajevo. Jahrb. Geol. R. A. LIII. 1903, p. 707—719, 732—738.
- Die Triassfossilien vom Heurekasund. Report of the sec. Norwegian Arctic expedition in the Fram 1898—1902. No. 7, Kristiania, 1907.
- Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der südöstlichen Dobrudscha. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 477—532.
- Materialien zu einer Monographie der Halobiidae und Montidae der Trias. Resultate d. wissenschaftl. Erforschg. d. Balatonsees, I. Bd. I. Teil, Palaeontol. Anhang, 1912.
- A. v. Klipstein: Beiträge zur geologischen Kenntnis der östlichen Alpen. Gießen, 1843.
- K. Klöden: Die Versteinerungen der Mark Brandenburg. 1834.
- A. v. Koenen: Über die Gattung Anoplophora S d b g. (Unionina Pohl.). Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXIII. 1881, p. 680.
- Über Anoplophora. Ibidem, XXXV. 1883, p. 624.
- E. Koken: Über triassische Versteinerungen aus Chinä. Neues Jahrb. f. Mineral. 1900, I. p. 186—215.
- Beiträge zur Kenntnis der Schichten von Heiligenkreuz. Abhandl. Geol. R. A. XVI/4, 1913.
- K. Kolesch: Über Versteinerungen aus dem mittleren Buntsandstein von Ostthüringen. Zentralblatt f. Mineral. 1903, p. 660.
- L. Krumbbeck: Obere Trias von Sumatra. Die Padang Schichten von Westsumatra. Beitr. z. Geol. v. Niederländ. Indien II/3, Palaeontograph. Suppl. IV, 1914, p. 197—266.
- Obere Trias von Buru und Misol. Ibidem, II/1, 1914.
- Zur systematischen Stellung der Pelecypodengattung Pomarrangina. Zentralblatt f. Mineral. 1915, p. 419.
- A. Langenhahn: Versteinerungen der deutschen Trias. 2. Aufl. Friedrichroda (Jahreszahl fehlt).
- G. Laubé: Bemerkungen über die Münster'schen Arten von St. Cassian in der Münchener Palaeontologischen Sammlung. Jahrb. Geol. R. A. XIV. 1864, p. 402—412.
- Die Fauna der Schichten von St. Cassian. II. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 32—76.
- R. Lepsius: Das westliche Südtirol. Berlin, 1878.
- Levallois: Les couches de jonction du Trias et du Lias dans la Lorraine et dans la Suabe. Bull. Soc. géol. France, sér. 2. T. XXI. 1864, p. 374.
- A. Leymerie: Mémoire sur la partie inférieure du système secondaire du département du Rhône. Mémoires Soc. géol. France. III, 1838, p. 313.

- G. Lindström: Om Trias-och Juraförsteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1805.
- O. v. Linストow: Die organischen Reste der Trias von Lüneburg. Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1903, XXIV. 1907, p. 129—165.
- L. v. Loczy: Palaeontologische und stratigraphische Ergebnisse, in „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Grafen Bela Széchenyi in Ostasien“ III. Wien, 1899, p. 140—157.
- G. de Lorenzo: Sul Trias dei dintorni di Lagonegro in Basilicata. Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli, ser. 2, Vol. V. No. 8, 1892, p. 1.
— Fossili del Trias medio di Lagonegro. Paleontogr. Ital. II. 1896, p. 129—144.
- B. Lundgren: Studier öfver faunan i den stenkolsförande formationen i Skåne. Kgl. fysiogr. sällskapets mianeskrift, Lund, 1878.
— Undersökningar öfver molluskenfaunan i Sveriges äldre mesozoiska bilningar. Lunds Univers. Arsskrift, T. XVII. 1881, p. 1—57.
— Bemerkungen über die von der schwedischen Expedition nach Spitzbergen 1862 gesammelten Jura- und Triasfossilien. Bihang K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. VIII/12, Stockholm, 1883, p. 1—21.
- R. Lydekker: Geology of the Kashmir and Chamba territories. Mem. Geol. Surv. of India, XXII. 1883, p. 164.
- H. Mansuy: Contribution à la carte géologique de l'Indochine. Paléontologie. Service des Mines, Hanoi-Haiphong, 1908, p. 62-73.
— Etude géologique du Yunnan oriental. Paléontologie. Ibidem, Vol. I. fasc. 2, Hanoi-Haiphong, 1912.
— Mission Zeil dans le Laos septentrional. Résultats paléontologiques. Ibidem, Vol. I. fasc. 4/1. Hanoi-Haiphong, 1912.
— Contribution à la géologie du Tonkin. Paléontologie. Mém. Service géol. de l'Indochine. Vol. I. fasc. 4/2, Hanoi-Haiphong, 1912.
— Paléontologie dell'Annam et du Tonkin. Ibidem, Vol. II. fasc. 3, Hanoi-Haiphong, 1913.
— Contribution à l'étude des faunes paléozoïques et trasiques du Tonkin. Ibidem, Vol. II. fasc. 5/1, Hanoi-Haiphong, 1913.
— Sur la présence du genre Pomarangina Dieu de l'Himalaya dans le Trias du Tonkin. Ibidem, Vol. II. fasc. 5, Hanoi-Haiphong, 1913.
— Faunes triatiques et liasiques de Nacham (Tonkin). Ibidem Vol. VI/1, Hanoi 1919, p. 1—19.
— Fossiles des terrains mésozoïques de la région de Sam Nena, Laos nord-oriental. Ibidem, VII/2, p. 28—45.
- E. Mariani: Note paleontologiche sul Trias superiore della Carnia occidentale. Annali Istituto teen. Udine, ser. 2, Vol. XI. 1893, p. 13.
— Appuati di Paleontologia lombarda. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano. XXXVI. 1896, p. 1.
— Appunti geologici e paleontologici sui dintorni di Schilpario e sul gruppo della Presolana. Rendiconti Ist. Lombardo sci. e lett. Milano, XXXII. 1889.
— Su alcuni fossili del Trias medio dei dintorni di Portovaltravaglia e sulla fauna della dolomia del Monte San Salvatore presso Lugano. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 39—63.
— Su alcuni fossili del Monte Antelao nel Cadore. Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, Vol. XXXVIII. 1905, p. 563—573.
— Caratteri triassici della fauna retica lombarda. Ibidem, p. 854—858.
— Contributo allo studio delle bivalvi del calcare di Esino in Lombardia. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, Vol. XLVI. 1907, p. 235—256.
- A. Martelli: Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale. Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 323—360.

- J. Martin: Paléontologie stratigraphique de l'Infracambrien du dép. de la Côte d'Or. Mémoires Soc. géol. France, sér. 2. T. VII. 1863.
 — Zone à Avicula contorta ou étage Rhétien. Mémoires Académ. sci. de Dijon, XIII. 1865, p. 1—270 (Sep. Paris, 1865).
- F. Meek: Remark on the family Pteriidae, with descriptions of some new genera. Amer. Journ. of science, XXXVII. 1864, p. 212—220.
- G. Merciai: Fossili dei calcaro grigio-seuri di Monte Malbe presso Perugia. Atti Soc. Toscana sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 218—246.
- G. v. Merhart: Neue Funde aus der Trias der Bukowina. Mitteil. Geolog. Ges. Wien, III. 1910, p. 523—532.
- P. Merian: in Escher v. d. Linth: Geologische Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg und die angrenzenden Gebiete. Nouv. Mém. Soc. Helvét. sci. nat. XIII. Zürich, 1853.
- E. v. Mojsisovics: Über einige Triasversteinerungen aus den Südalpen. Jahrb. Geol. R. A. XXIII. 1873, p. 435.
 — Über die triadischen Pelecypodengattungen Daonella und Halobia. Abhandl. Geol. R. A. VII)2, 1874.
 — Über einige japanische Triasfossilien. Beitr. z. Palaeontol. Österr.-Ungarns etc. VII. 1888, p. 174.
- Ch. Moore: On the zone of the Lower Lias and the Avicula contorta-zone (Rhaetic beds and fossils). Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 483.
- Graf zu Münsster: Beiträge zur Geognosie und Petrefaktenkunde des südöstlichen Tirols. IV. 1841.
- B. Nelli: Il Raiblano del Monte Judica nella provincia di Catania. Rendiconti Acad. dei Lincei Roma, ser. 5, Vol. VIII. 1899, p. 91.
 — Il Raibl dei dintorni di Monte Judica. Boll. Soc. geol. Ital. Roma, XVIII./2, 1899.
- M. Neumann: Beiträge zu einer morphologischen Einteilung der Bivalven. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 701.
- R. Newton: On marins triassic Lamellibranchiata discovered in the Malay Peninsula. Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 130.
- F. Noetling: Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXII. 1880, p. 321.
 — Beiträge zur Morphologie der Pelecypoden. Das Torsionsgesetz der Schale. Neues Jahrb. f. Miner. Beil. Bd. XV. 1902, p. 394.
- P. Öberg: Om Trias-och Juraförsteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877.
- G.omboni: Dei fossili triascici del Veneto che furono descritti e figurati dal Prof. P. A. Catullo. Atti R. Ist. Veneto sci. lett. ed arti, Vol. VIII. ser. 5, Venezia 1882, p. 1—32.
- A. Oppel: Weitere Nachweise der Kössener Schichten in Schwaben und in Luxemburg. Sitzgber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 7.
 — et E. Suess: Über die mutmaßlichen Äquivalente der Kössener Schichten in Schwaben. Ibidem XXI. 1856, p. 535.
- C. Parona: Contributo allo studio dei Megalodonti. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XXX. 1888, p. 1.
 — Studio monografico della fauna Raibiana della Lombardia. Pavia, 1889.
- S. Passarge: Das Roeth im östlichen Thüringen. Inaug. Diss. Jena, 1891.
- W. Paulcke: Geologische Beobachtungen im helvetischen und lepontinischen Gebiet. II. Die helvetische Trias. Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 211—216.
- K. Penck: Aus der Trias von Kärnten. I. Muschelvorkommen von Feistritz a. d. Drau. II. Fauna der Toler Schichten des Hochobir. Verhandl. Geol. R. A. 1884, p. 382.
- L. Pflücker y Rico: Das Rhaet der Umgegend von Göttingen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XX. 1868, p. 397—432.
- H. Philipp: Palaeontologisch-Geologische Untersuchungen aus dem Gebiet von Predazzo. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LVI. 1904, p. 1—98.

- E. P h i l i p p i: Beitrag zur Kenntnis des Aufbaues und der Schichtfolge im Grignagebirge. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XLVII. 1895, p. 724.
 — Vorkommen von *Myophoria cardissoides* Sch. im oberen Muschelkalk des Eyachtals. *Neues Jahrb. f. Miner.* 1896, II, p. 195.
 — Geologie der Umgegend von Lecco und des Resegone Massivs in der Lombardei. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XLIX. 1897, p. 317.
 — Die Fauna des unteren Trigonodusdolomits vom Hühnerfeld bei Schwieberdingen und des sogenannten Cannstatter Kreidemergels. *Jahreshefte Ver. f. vaterl. Naturkunde Württemberg*, 1898, p. 145—224.
 — Beiträge zur Morphologie und Phylogenie der Lamellibranchier. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* L. 1898, p. 597—622, LII. 1900, p. 64—118, 619—640.
 — Über zwei neue Zweischalerarten von palaezoischem Habitus aus dem deutschen Muschelkalk. *Ibidem*, LI. 1899, *Verhandl.* p. 62.
 — Über ein interessantes Vorkommen von *Placunopsis ostracina*. *Ibidem*, LI. 1899, *Verhandl.* p. 67.
 — Die kontinentale Trias. *Lethaea mesozoica*, I/I, 1903.
- E. P i c a r d: Über den Keuper bei Schlotheim in Thüringen und seine Versteinerungen. *Zeitschr. f. d. ges. Naturwissenschaften* Halle, XI. 1858, No. 5.
 — Die Gattung *Pinna* in der Trias. *Jahrb. Preuß. Geol. Landesanst.* f. 1903, XXIV/3, p. 333—336.
- A. P i c h l e r: Zur Geognosie der Tiroler Alpen. *Neues Jahrb. f. Miner.* 1857, p. 689.
- M. P i r o u t e t: Note sommaire sur le Trias de la Nouvelle Calédonie. *Bull. Soc. géol. France*, 4. sér. T. VIII. 1908, p. 324—329.
- H. P o h l i g: Über maritime Unionen. *Palaeontograph.* XXVII. 1880, p. 109.
- S. P o l i f k a: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Schlerndolomits. *Jahrb. Geol. R. A.* XXXVI. 1886, p. 595—606.
- J. P o r t l o c k: Report on the geology of the county of Londonderry. Dublin, 1843.
- S. P r i n c i p i: Studio geologico del Monte Malbe e del Monte Tezio. *Boll. Soc. geol. Ital.* XXVII. 1908, p. 188—202.
 — Fossili retici del gruppo montuoso d'Amelia. *Rivista Ital. di Paleontol.* XVI. 1910, p. 13—36.
- H. P r o e s c h o l d t: Beitrag zur näheren Kenntnis des unteren Muschelkalkes in Franken und Thüringen. *Programm der Realschule in Meiningen*, 1879, p. 1—27.
- F. Q u e n s t e d t: Handbuch der Petrefaktenkunde. 1. Aufl. Tübingen, 1852, 3. Aufl. 1882/85.
 — Der Jura. Tübingen, 1857.
- H. R a s s m u s s: Zur Kenntnis der Werfener Schichten bei Berchtesgaden. *Monatsber. Deutsch. Geol. Ges.* LXIII. 1911, p. 553.
 — Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Alta Brianza. *Geol. u. Paleontol. Abhandl. (K o k e n)*, N. F. X/5, 1912, p. 18 (356) — 28 (366).
- C. R e n z: Über neue Vorkommen von Trias in Griechenland und Lias in Albanien. *Zentralblatt f. Miner.* 1904, p. 257—264.
 — Nachtrag zu den Muschelkalk-Zweischalern. In F r e c h: „Neue Zweischaler etc. aus der Bakonyer Trias“, I. c. 1904.
 — Über Halobien und Daonellen aus Griechenland, nebst asiatischen Vergleichsstücken. *Neues Jahrb. f. Miner.* 1906 I. p. 27—40.
 — Über die mesozoische Formationsgruppe der südwestlichen Balkanhalbinsel. *Ibidem*, Beil. Bd. XXI. 1906, p. 221.
 — Die Trias von Timor und Rotti im ostindischen Archipel. *Zentralblatt f. Miner.* 1909, p. 355—361.
 — Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoikum und Palaeozoikum. *Jahrb. Geol. R. A.* LX. 1910, p. 554.

- S. Reynolds et H. Vaughan: The Rhaetic beds of the South-Wales direct line. Quart. Journ. Geol. Soc. London LX. 1904, p. 194—208.
- E. Richter: Myophorien des ostthüringischen Wellenkalks. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXI. 1869, p. 44.
- F. Roemer: Neue Versteinerungen aus dem Muschelkalk von Willibadessen. Palaeontograph. I. 1851.
— Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870.
- H. Rolle: Über einige an der Grenze des Keuper und Lias in Schwaben auftretende Versteinerungen. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXVI. 1857, p. 13.
- J. Roth: Über Ammonites nodosus und Myophoria pes anseris bei Lüneburg. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XI. 1859, p. 4 (Protokolle).
- A. Rothpletz: Die Perm-, Trias- und Juraformation auf Timor und Roti im indischen Archipel. Palaeontograph. XXXIX. 1892, p. 84.
- E. Rübenstrunk: Beitrag zur Kenntnis der deutschen Trias-Myophorien. Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 87—248.
- W. Salomon: Geologische und palaeontologische Studien über die Marmolata. Palaeontograph. XLII. 1895, p. 1—210.
— Über Pseudomonotus und Pleuronectites. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LII. 1900, p. 348—359.
— Die Familienzugehörigkeit der Pleuronectiten. Zentralbl. f. Miner. 1902, p. 19—23.
- F. v. Sandberger: Beobachtungen in der Würzburger Trias-Würzburger Naturwiss. Zeitschr. V. 1864.
— Die Gliederung der Würzburger Trias und ihrer Äquivalente. Ibidem, VI. 1866/67, p. 196.
— Übersicht der Versteinerungen der Triasformation Unterfrankens. Verhandl. Med. phys. Ges. Würzburg, N. F. XXIII. 1890.
- S. Scalia: La fauna del Trias superiore del gruppo montuoso di Judica. Boll. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, Maggio 1908.
— Il gruppo di Monte Judica. Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 293—301.
— La fauna del Trias superiore del Monte Judica. Pte. 2. Mem. Acad. Gioenia di Catania, ser. 5, Vol. III. 1910.
- K. Schafhäutl: Geologische Bemerkungen über den Krammenberg bei Garmisch. Neues Jahrb. f. Miner. 1852.
— Beiträge zur näheren Kenntnis der bayerischen Voralpen. Ibidem, 1854, p. 513.
— Südbayerns Lethaea geognostica. 1863.
— Der weiße Jura im Wettersteingebirgsstock und der Lias im Hochfeln der bayerischen Alpen. Neues Jahrb. f. Miner. 1865, p. 789—802.
- K. v. Schaurath: Übersicht der geognostischen Verhältnisse der Gegend von Recoaro im Vicentinischen. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 481.
— Die Schaltierreste der Lettenkohlenformation des Herzogtums Coburg. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. IX. 1857, p. 85.
— Kritisches Verzeichnis der Versteinerungen der Trias im Vicentinischen. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 283.
- U. Schloenbach: Beitrag zur genauen Niveaubestimmung des auf der Grenze zwischen Keuper und Lias im Hannoverschen und Braunschweig auftretenden Sandsteines. Neues Jahrb. f. Miner. 1862, p. 146.
- v. Schlottheim: Petrefaktenkunde. Gotha, 1820.
— Nachträge zur Petrefaktenkunde. Gotha, 1822.
- K. Schmidt: Über den unteren Keuper des östlichen Thüringens. Abhandl. z. Geol. Spezialkarte v. Preußen, I/2, 1874.
— Das ostthüringische Röth. Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1881, p. 92—157.

- K. Schmid et Schleiden: Die geognostischen Verhältnisse des Saaltales bei Jena. 1846.
- M. Schmidt: Das Wellengebirge der Gegend von Freudenstadt. Mitt. d. Geol. Abt. d. Kgl. Statistischen Landesamtes, Stuttgart, No. 3, 1907.
- E. Schütze: Die Gattung *Pinna* im schwäbischen Muschelkalk. Zentralblatt f. Miner. 1906, p. 114.
- K. v. Seebach: Die Conchylienfauna der Weimarischen Trias. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861, p. 551—669.
--- Triasfossilien. Ibidem, XVIII. 1866, Prot. p. 7.
--- Zur Kritik der Gattung *Myophoria* und ihrer triassischen Arten. Nachrichten kgl. Ges. d. Wissensch. Göttingen, 1867.
--- Balaniden auf *Lima lineata*. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXIII. 1871, p. 781 (Prot.).
- J. Simionescu: Studii geol. sin paleontol. din Dobrogea. III. Fauna triassica dela Desli Caira. Acad. Romana, Boucarest, Publ. Ad amachia, No. XXVI. 1910.—IV. Fauna triassica din insula Popina. Ibidem, No. XXVII. 1910.—V. Fauna triassica inferiora. Ibidem, No. XXIX. 1911.
- V. Simonelli: Fossili retici della Montagna di Cetona. Mem. R. Acad. sci. Bologna, ser. 5, T. II. 1891.
- C. T. Simpson: Description of four triassic *Unios* from the Staked plains of Texas. Proceed. U. S. Nat. Museum, Washington, XVIII. 1896, p. 381—385.
- T. h. Skuphos: Die stratigraphische Stellung der Partnach- und der sogenannten unteren Carditaschichten in den Nordtiroler und bayerischen Alpen. Geognost. Jahreshefte, IV. Kassel, 1892, p. 133.
--- Über die Entwicklung und Verbreitung der Partnachschichten in Vorarlberg und im Fürstentum Liechtenstein. Jahrb. Geol. R. A. XLIII. 1893, p. 145—179.
- J. P. Smith: Über Pelecypodenzenonen in der Trias Nordamerikas. Zentralbl. f. Miner. 1902, p. 689—695.
- G. Stabile: Fossiles des environs du Lac de Lugano. Atti Soc. Elvet. sci. nat. riun. in Lugano. 1861 (Estratto).
- C. de Stefan: Vorläufige Mitteilung über die rhäetischen Fossilien der apuanischen Alpen. Verhandl. Geol. R. A. 1882, p. 96—106.
- G. di Stefan: Lo schisto marnoso con *Myophoria vestita* della Punta delle Pietre nere in Provincia di Foggia. Boll. R. Com. geol. Italia XXVI. 1895, p. 1—18.
--- La dolomia principale dei dintorni di Palermo e di Castellamare del Golfo (Trapani). Paleontogr. Ital. XVIII. 1912, p. 64—95.
- G. Steinmann: Über marine Trias in Peru. Zentralblatt f. Miner. 1909, p. 616.
- F. Stoliczka: Geological sections across the Himalaya Mts. from Wangtu bridge on the river Sutlej to Sungdo on the Indus. Mem. Geol. Surv. India, V/I. 1865.
- A. Stoppani: Studi geologici e paleontologici sulla Lombardia. Milano, 1857.
--- Paléontologie Lombarde. I. Les Pétrifications d'Esino. Milan, 1858/60. — II. Géologie et Paléontologie des couches à *Avicula contorta*. Milan, 1860/65.
- A. v. Strombeck: Beiträge zur Kenntnis des Muschelkalks im nordwestlichen Deutschland. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. I. 1848, p. 115.
--- Über *Cucullaea Beyrichii* aus dem Muschelkalk. Ibidem, I. 1848, p. 451.
--- Über eine neue *Modiola* und *Delphinula* aus dem Muschelkalk. Ibidem, II. 1849, p. 90.
--- Pterineen im Muschelkalk sind Gervillien. Ibidem, III. 1850, p. 133.
--- Über das Vorkommen von *Myophoria pes anseris*. Ibidem, X. 1858, p. 80.
--- Triasschichten mit *Myophora pes anseris* auf der Schafweide zu Lüneburg. Ibidem, XII. 1860, p. 381.

- L. v. T a u s c h: Über die Bivalvengattung *Conchodus* und *Conchodus Schwageri* nov. f. aus der obersten Trias der Nordalpen. Abhandl. Geol. R. A. XVII/1, 1892.
- A. T e g e t m e y e r: Beiträge zur Kenntnis des Keupers im nördlichen Thüringen. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, N. F. XIII. 1876, p. 405.
- F. T e l l e r: Die Pelecyopodenfauna von Werchojansk in Ostsibirien. In E. v. Mojsisovics „Arktische Triasfaunen“ Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, 7. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 103—137.
- Daonella Lommeli in den Pseudo-Gailtaler Schiefern von Cilli. Verhandl. Geol. R. A. 1889, p. 210.
- In E. Suess „Beiträge zur Stratigraphie Zentralasiens“. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXI. 1894, p. 460.
- O. T e r q u e m: Paléontologie de l'étage inférieur de la formation liasique de la province de Luxembourg et d'Hettange. Mém. Soc. géol. France. sér. 2, Vol. V. 1854.
- A. T o m m a s i: Il Trias inferiore delle nostre Alpi coi suoi giacimenti metalliferi. Il Pizzo dei Tre Signori. Milano, 1882.
- Rivista della fauna Raibiana del Friuli. Annali Ist. Tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 1—77.
- La fauna del calcare conchigliare di Lombardia. Pavia, 1894.
- Sulla fauna del Trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi. Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, Vol. XXVIII. 1895
- Contributo alla fauna del calcare bianco del Latemar e della Marmolata. Atti Acad. degli Agiati, Revereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 77—83.
- Nuovi fossili triassici di Sardegna. Boll. Soc. geol. Ital. XV. 1896, p. 497—503.
- La fauna del Trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi. Paleontogr. Ital. I. 1896.
- Alcune fossili nel Trias inferiore delle nostre Alpi. Rendiconti. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, Vol. XXXII. 1899.
- La fauna dei calcaro rossi e grigi del Monte Clapsavon nella Carnia occidentale, Paleontogr. Ital. V. 1899, p. 14.
- Revisione della fauna a Molluschi della dolomia principale di Lombardia. Paleontogr. Ital. IX. 1903, p. 95—124.
- Una Lima nuova ed una Pinna nel Muschelkalk di Recoraro. Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. Roma, 1904, p. 301—305.
- I fossili della lumachella triasica di Ghegna in Valsecca presso Roncabello. I. Paleontogr. Ital. XVII. 1911, p. 11—36. — II. Appendice. Ibidem, XIX. 1913, p. 71—77.
- La faunetta anisica di Valsecca in Val Brembana. Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, XLVI. 1913, p. 767—786.
- A. de T o n i: Illustrazione della fauna triasica di Valdepena. Mem. Ist. geol. Università di Padova, II. 1913, p. 177—187.
- A. T o r n q u i s t: Neue Beiträge zur Geologie und Paleontologie der Umgebung von Recoaro und Schio. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. L. 1898, p. 667—678. LI. 1899, p. 363—370. LII. 1900, p. 134—142.
- Die Daonellen des deutschen Muschelkalkes. Neues Jahrb. f. Miner. 1903, II. p. 83—92.
- Die Gliederung und Fossilführung der außeralpinen Trias auf Sardinien. Sitzgber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1098.
- Die außeralpine Trias auf den Balearen und in Catalonien. Ibidem, 1908, p. 902.
- F. T o u l a: Eine Muschelkalkfauna am Golfe von Ismid in Kleinasien. Beitr. z. Palaeontol. Osterr.-Ungarns etc. X. 1896, p. 160
- Schichten mit Gervilleia Bouei Ha u. am Gaumannmüller-kogel an der Weißbacher Straße im Randgebirge der Wiener Bucht. Jahrb. Geol. R. A. LIX. 1909, p. 386—398.
- Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden (Rauchstallbrunn-graben) mit nordalpiner St. Cassianer Fauna. Ibidem, LXIII. 1913, p. 101—112.

- F. T oula: Geologisch-Palaeontologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvar, Peci und Dular in Westbosnien. *Ibidem*, p. 644—648.
- Ch. T rechmann: The Trias of New-Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LXXIII. 1917, p. 165—245.
- J. V i g h: Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom Földtani Közlöny, XLIV. 1914, p. 599—605.
- P. V inassa de R egny: Fossili del Montenegro. I. Fauna dei calcari rossi e grigi del Sutorman. Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. X. 1903.
- Fossili retici di Caprona (Monte Pisano). Boll. Soc. geol. Ital., Roma, XXV. 1906, p. 825—843.
- V o g e l: Beiträge zur Kenntnis der mesozoischen Formationen in Borneo. Sammlungen d. Geol. Reichsmus. Leyden, VII/2, 1904, p. 217.
- W. V o l z: Beiträge zur geologischen Kenntnis von Nordsumatra. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LI. 1899, p. 27—36.
- E. V redenburg: On the occurrence of a species of *Halorites* in Baluchistan. Records Geol. Surv. India. XXXI. 1904, p. 166.
- L. W a g e n: Werfener Schichten in der Salt Range. Zentralblatt f. Miner. 1900, p. 285—288.
- Der Formenkreis des *Oxytoma inaequivalve* Sow. Jahrb. Geol. R. A. LI. 1901, p. 1—24.
- Über die Lamellibranchiaten der Frombachtuffe nebst Bemerkungen über deren verwandtschaftliche Beziehungen. Verhandl. Geol. R. A. 1906, p. 385—395.
- Die Lamellibranchiaten der Pachycardientuffe der Seiser Alm. Abhandl. Geol. R. A. XVIII/2, 1907.
- J. W a g e n: Beitrag zur genaueren Kenntnis des Muschelkalkes bei Jena. Abhandl. Geol. Spezialkarte v. Preußen, N. F. Heft 21, 1897.
- K. W alther: Zwölf Tafeln der verbreitetsten Fossilien aus dem Buntsandstein und Muschelkalk der Umgebung von Jena. 1906.
- J. W annier: Triasprefakte der Molukken und des Timorarchipels. Neues Jahrb. f. Miner. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 210.
- M. Weigelin: Myophoria Kefersteini aus der Bleiglanzbank des Gipskeupers von Sindelfingen und M. Schmidtii nov. sp. aus den Trochitenkalken von Donaueschingen. Jahreshefte Ver. f. vaterl. Naturkde. Württemberg, LXIX. 1913, p. 257—265.
- E. Weiss: *Myopnoria cardissoides* aus den Schichten mit Ammonite nodosus bei Saarlouis. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXII. 1870, p. 469 (Prot.).
- R. W ilckens: Palaeontologische Untersuchung triadischer Faunen aus der Umgebung von Predazzo in Südtirol. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 81—230.
- G. W inkler: Die Schichten mit *Avicula cantorta* inner- und außerhalb der Alpen. München, 1859.
- Der Oberkeuper nach Studien in den bayerischen Alpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861, p. 457.
- Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen. Neues Jahrb. f. Miner. 1864, p. 295.
- P. v. W ittenburg: Neue Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Werfener Schichten Südtirols, mit besonderer Berücksichtigung der Schichten von Wladiwostok. Zentralblatt f. Miner. 1908, p. 67.
- Einige neue Fossilien aus den Werfener Schichten Südtirols. Neues Jahrb. f. Miner. 1908, I. p. 16—21.
- Beiträge zur Kenntnis der Werfener Schichten Südtirols. Koken's Geol. u. Palaeontol. Abhandl. N. F. VIII/5, Jena, 1908.
- Einige Lamellibranchiaten der Salt Range, mit Berücksichtigung der Lamellibranchiaten des Süd-Ussuri-Gebietes. Neues Jahrb. f. Miner. 1909, I. p. 6—13.
- Geologische Studien an der ostasiatischen Küste im Golf Peters des Großen. *Ibidem*, Beil. Bd. XXVII. 1909, p. 531.

- P. v. Wittenburg: Über einige Triasfossilien von Spitzbergen. *Travaux Musée géol. Pierre-le-Grand près l'Académie sci. St. Pétersbourg*, IV. 1910, p. 31—39.
 — Über Triasfossilien vom Flusse Dulgolach. *Ibidem*, p. 63—73.
 — Über untertriadische Aufsammlungen am Fluß Teplaia, Gouv. Jenisseisk. *Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg*, sér. VI. 1911, p. 1084.
 — Über Werfener Schichten von Spitzbergen. *Ibidem*, 1912, p. 947.
 — Sur la forme caractéristique de *Pseudomonotis* du Trias supérieur du Caucase et d'Alaska. *Ibidem*, 1913, p. 475.
- S. v. Woehrmann: Die Fauna der sogenannten Cardita- und Raibler Schichten in den Nordtiroler und bayerischen Alpen. *Jahrb. Geol. R. A.* XXXIX. 1889, p. 189.
 — Über die systematische Stellung der Trigoniiden und die Abstammung der Nayaden. *Ibidem*, XLIII. 1893, p. 1.
 — Die Raibler Schichten nebst kritischer Zusammenstellung ihrer Fauna. *Ibidem*, XLIII. 1893, p. 617.
 — et Koken: Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlernplateau. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XLIV. 1892, p. 167.
- X. Wulfen: Abhandlung vom kärntherischen pfauenschweifigen Helmintholith oder dem sogen. opalisierenden Muschelmarmor. Erlangen, 1793.
- A. Wurm: Untersuchungen über den geologischen Bau und die Trias von Aragonien. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* LXIII. 1911, p. 94—120.
 — Über einige neue Funde aus der Umgebung von Heidelberg. *Ibidem*, LXVI. 1914, p. 444—448.
 — Beiträge zur Kenntnis der Trias von Catalonien, *Ibidem*, LXXI. 1919, Monatsber. p. 153—160.
- F. Zeller: Beiträge zur Kenntnis der Lettenkohle und des Keupers in Schwaben. *Neues Jahrb. f. Miner. Beilbd.* XXV. 1908, p. 65—106.
- J. Zenker: Beitrag zur Naturgeschichte der Urzeit. Jena 1833.
- Ch. v. Zietzen: Die Versteinerungen Württembergs. 1830/33.
- K. v. Zittel: Fossile Mollusken und Echinodermen von Neuseeland. Reise d. österr. Fregatte Novara etc. *Geol. Teil*, I/2, Palaeontologie von Neuseeland. Wien, 1864, p. 15—68.
 — Handbuch der Palaeontologie. I. Abt. Palaeozoologie, II. 1881, p. 18—142.

Abbreviations.

- Abhandlungen phys. Klasse d. kgl. Akademie d. Wissenschaften Berlin: *Abhandl. Akad. Berlin*.
- Denkschriften (Sitzungsberichte) kais. Akad. d. Wissenschaften Wien, math. nat. Klasse: *Denkschr. (Sitzber.) Akad. Wien*.
- Jahrbuch (Verhandlungen, Abhandlungen) k. k. Geologische Reichsanstalt in Wien: *Jahrb. (Verh., Abhandl.) G. R. A.*
- Beiträge zur Palaeontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients in Wien: *Beitr. Pal. Österr.*
- Neues Jahrbuch (Zentralblatt) für Mineralogie etc. Neues Jahrb. (Zentralbl.) f. Min.
- Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft: *Zeitschr. D. G. G.*
- Palaeontologie d. Umgebung d. Balatonsees: *Pal. Balaton*.
- Palaeontologia Indica: *Pal. Ind.*
- Paleontografia Italica: *Pal. Ital.*

Ordo: **Anisomyaria** Neumayr.Fam. **Aviculidae** Lam.Gen. **Actinodesma** Sandb.

- A. Bellamyi** Newton, On marine triassic Lam. Malay Pennins. Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 133, Pl. XII, fig. 2. Malacca, Obertrias.

Gen. **Avicula** Brug. (Pteria Scopoli).

[Subgen. **Bittneria** Broili, **Meleagrina** Lam.,
Leptodesma Hall inclus.]

- A. aculeata** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes. Pal. Balaton, I. 1901, p. 24, Taf. IV. fig. 12. Bakony, Karnisch.
A. aquivalvis Münster, Beiträge zur Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, Taf. VII. fig. 19 = Sp. incert., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian. Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 77.
A. alata Klöden, Verst. d. Mark Brandenburg, 1834, p. 198, Taf. III. fig. 3 (cf. v. Alberti, Überbl. über d. Trias, 1864, p. 90) non Trias, teste Eck, Rüdersdorf, Abhandl. Geol. Spez. Kto. v. Preußen, I/1, 1872, p. 87.
A. Albertii Goldfuss (1838) vide Gervilleia mytiloides.
A. alternans Graf zu Münster (1841) = Gen. ind. sp. ind., teste Bittner, Lamellibranch. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 174.
A. angulosa Lepsius (1878) vide Pseudomonotis angulosa.
A. antiqua Graf zu Münster (1841) = Sp. inval., teste Bittner, Lamellibranch. von St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 69.
A. cf. antiqua (Mstr.) Toulou, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 101, Taf. VI. fig. 37 = Gen. ind. sp. ind.
A. areoidea Bittner, Lamellibranch. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 74, Taf. IX. fig. 21, XXIV. fig. 18. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I. 1901, p. 22, Taf. IV. fig. 1. Südalpen, Bakony, Karnisch.
A. cf. areoidea (Bittn.) Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 80, Taf. V. fig. 20—24. Südalpen, Ladinisch.
A. arcuata Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 128, Taf. CXVII. fig. 1. — Münster, Beiträge z. Geogn. d. südösl. Tirols, IV. 1841, p. 77, Taf. VII, fig. 13. — Laubé, Fauna v. St. Cassian. Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 49, Taf. XVI. fig. 8. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 94. — Bittner, La- mellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 67, Taf. VIII, fig. 21, 22. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontograph. L. 1904, p. 164, Taf. XVIII. fig. 18. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. V. Vol. III. 1910, p. 31, Tav. III. fig. 61—63. Südalpen, Sizilien, Karnisch.
A. arcuata var. **bifrons** Bittner, l. c. p. 68, Taf. VIII. fig. 23. Südalpen, Karnisch.
A. areata Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 42, Tav. III. fig. 22. Sizilien, Karnisch.

- A. Arthaber Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica. Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 37, Tav. III. fig. 8, 9.
Sizilien, Karnisch.
- A. Arveli Renevier, Not. géol. et pal. sur les Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1864, p. 31, Pl. III. fig. 1. — Martin, Etage Rhétien, 1865, p. 243.
Schweiz, Rhaetisch.
- A. aspera Pichler, Zur Geognosie d. Tiroler Alpen, Neues Jahrb. f. Min. 1857, p. 694. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 205, Taf. VII. fig. 7, 8 [A. flabellum Schafhäutl, Südbayerns Lethaea geogn. 1865, p. 371, Taf. LXVe 2, fig. 16 inclus.]. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. Tech. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 21. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 656. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I. 1901, p. 23. Taf. IV. fig. 2—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes, I/3 1906, Taf. XLII. fig. 7. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Boll. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, 16 Maggio 1908, p. 18. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontaniana, XXXVIII. Napoli. 1908, p. 43, Tav. I. fig. 7. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 293, Tav. IX. fig. 7. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 32, Tav. II. fig. 69.
Nordalpen, Südalpen, Bakony, Apennin, Sizilien, Karnisch.
- A. aviculoides Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à A. contorta (Schistes noirs), 1863, p. 135, Pl. XXXI. fig. 4, 5. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 164.
Südalpen, Rhaetisch.
- A. Azzarolae Stoppa (1861) vide A. contorta var. Azzarolae.
A. bavarica Schafhäutl (1854) vide Oxytoma inaequivalve var. intermedia.
- A. bifrons Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV 1841, Taf. VII. fig. 17 = ? A. arcuata var. bifrons Bittner, teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/I, 1895, p. 68.
- A. Bittneri v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 650, lat. XIII. fig. 4. — Böhm, Obertriadische Fauna der Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 26, Taf. III. fig. 1—3. — Non A. Bittneri Frech, Über Gervilleia, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 615 (A. Frederici Waga g.)
Nordalpen, Bäreninsel, Karnisch.
- A. cf. Bittneri (Woehrm.) Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I. 1901, p. 26, Taf. IV. fig. 11. — Bakony, Karnisch.
- A. Boeckhi Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I. 1901, p. 25, Taf. IV. fig. 14—17.
Bakony, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. Boeckhi (Bittn.) Böhm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 24, Taf. III. fig. 19.
Bäreninsel, Karnisch.
- A. Broili Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verhandl. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 122, Taf. V. fig. 4. [Nom. nov. pr. A. Kokeni Broili (non v. Woehrmann), Pachycardientuffe d. Seiser Alp, Palaeontogr. L. 1904, p. 164, Taf. XVIII. fig. 19.] — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica. Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 38, Tav. III. fig. 14.
Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Sizilien, Karnisch.

- A. Bronnii v. Alberti** (1834), v. Zieten (1833), Goldfuss (1838), Bronn (1856), Giebel (1856), Tommasi (1894) vide Gervilleia costata.
- A. cf. Bronnii v. Loezy**, Wissenschaftl. Ergebnisse d. Reise d. Graf. B. Szechenyi in Ostasien, III. 1899, p. 140, Taf. X. fig. 14—17.
- Yunnan, Karnisch?
- A. cardiformis** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 78, Taf. VII. fig. 18. — Laubé, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV, 1865, p. 50, Taf. XVI, fig. 3. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 73, Taf. IX, fig. 20. — Waagen, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, ibidem, XVIII/2, 1907, p. 88.
- Südalpen, Karnisch.
- A. Cassiana** Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 71, Taf. VIII. fig. 6—8 [Nom. nov. pr. A. Gea (d'Orbigny) Laubé, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 50, Taf. XVI. fig. 9]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XXXIX, fig. 5. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 24, Tav. II. fig. 21, 22.
- Südalpen, Sizilien, Karnisch.
- A. cf. Cassiana** (Bittn.) Gortani, Nuovi fossili Raibl. della Carnia. Rivista Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 82, Taf. VIII, fig. 7. — Simionescu, Fauna trias. Desli-Caira, Acad. Romana, Publ. Adamachi, IV. Bucuresci, 1910, p. 482, Textfig. 23.
- Südalpen, Karnisch. — Dobrudschä, Ladinisch.
- A. sp. ind. aff. Cassianae** (Bittn.) Bittner, Lamellibr. v. Hudiklaue, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 225, Taf. VII. fig. 1. — Mansuy, Contribut. à la carte géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 67, Pl. XVII. fig. 8.
- Südalpen, Indochina, Ladinisch.
- A. caudata** Stoppanni, Paléont. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 92, Pl. XVIII. fig. 18, 19. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 73, Taf. VIII. fig. 17, 18 [A. mytiliformis Stoppanni, l. c. p. 91, Pl. XVIII, fig. 16, 17, Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna des Schlerndolomits, Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 599, A. decipiens Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 152, Taf. IV, fig. 36 inclus]. — De Lorenzo, Foss. Trias medio di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 129. — Mariaiani, Foss. del Trias medio di Portovaltravaglia etc. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901 p. 44, 61. — Broilli, Fauna d. Pachycardientuffe der Seiser Alp. Palaeontogr. L. 1904, p. 165, Taf. XVIII. fig. 21—23. — Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontaniana, XXXVIII. Napoli, 1908, p. 45, Tav. I. fig. 8 (A. decipiens). — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica. Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 25, Tav. II. fig. 29, 30 [A. mytiliformis (Stoppanni), l. c. p. 28, Tav. II. fig. 31—33, A. decipiens (Salomon), l. c. 24, Tav. II. fig. 24 inclus.] — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 12, Tav. I. fig. 31—34 [A. mytiliformis (Stoppanni), l. c. p. 11, Tav. I. fig. 30 inclus].
- Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Sizilien, Apennin, Basilicata, Karnisch.
- A. cf. caudata** (Stopp.) Philipp, Pál. Unters. Predazzo. Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 60, Taf. III. fig. 13—15. — Mansuy, Faunes paléozoïques et trias. de l'Annam et du Tonkin. Mém. Serv. Carte géol. Indochine, II/3, 1913, p. 26, Pl. III. fig. 16.
- Südalpen, Ladinisch. — Tonkin, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. caudatae** (Stopp.) Diener, Pal. Ind. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites limest. of Byans, p. 10, Pl. XVII. fig. 8.
- Himalaya, Obertrias.

- A. ceratophaga* Graf zu Münster (non Schlotheim),
Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 77, Taf. VII.
fig. 14 = *A. sp. ind.* teste Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian,
Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 73.
- A. Cislonensis* Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlerndol.
Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 598, Taf. VIII. fig. 3, 4.
Südalpen, Ladinisch.
- A. Clarai* Lepsius (1878), Tommasi (1895) vide Pseudomonotis (Claraia) Clarai.
- A. complanata* v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 245, Taf. XVI.
fig. 7 = ? *A. Cassiana* Bittner.
- A.* (an *Pseudomonotis?*) *concinna* M. Hoernes, Gastrop. u. Acephalen d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX.
1855, p. 51, Taf. II. fig. 16. Nordalpen, Norisch.
- A. contorta* Portlock, Report on the geology of Londonderry,
1843, p. 126, Pl. XXVA fig. 16. — Oppel et Suess, Über
d. Äquivalente d. Kössener Schichten in Schwaben, Sitzber.
Akad. Wien, XXI. 1856, p. 547, Taf. II. fig. 5. — Winkler,
Schichten d. *A. contorta*, 1859, p. 11, Taf. I. fig. 6. — Moore,
Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861,
p. 499, Pl. XV. fig. 10. — Stoppiani, Pal. Lomb. III. Couches
à *A. contorta*, 1861, p. 168, Pl. X. fig. 15—21. — v. Dittmar,
Contortazone, 1864, p. 163 [*A. inaequiradiata* var. Schaf-
häutl., Beitr. z. näheren Kenntn. d. bayer. Voralpen, N. Jahrb.
f. Min. 1854, p. 555, Taf. VIII. fig. 22, A. Escheri Merian,
in Escher v. d. Linth, Geol. Bem. über d. nördl. Voral-
berg, Nouv. Mém. Soc. Helvét. sci. nat. Zürich, XIII. 1853,
p. 19, Taf. II. fig. 14—16, V. fig. 49, 50, Gervleia striocurva
Quenstedt, Der Jura 1856, p. 28, Taf. I. fig. 17 inclus.]. —
Renevier, Not. géol. sur les Alpes Vaudoises, I. Infralias etc.
Bull. Soc. Vaud. sci. nat. VIII. 1864, p. 68, Pl. III. fig. 2, 3. —
Martin, Etage Rhétien, 1865, p. 242 [*A. solitaria* Moore,
Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861,
p. 499, Pl. IX. fig. 11 inclus.]. — Capellini, Foss. infralias.
del golfo della Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, Vol.
V. 1866, p. 478, Tav. V. fig. 13. — Pflückery Rico, Rhaet
von Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 408, Taf. VII. fig. 2
(Cassianella). — Fischer-Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun,
Mitt. Naturforsch. Ges. Bern, 1869, p. 77, Taf. IV. fig. 12 (Cassia-
nella). — Simonielli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci.
Ist. Bologna, ser. 5, Vol. II. 1892, p. 238, Tav. I. fig. 7. — Rey-
nolds et Vaughan, Rhaetic beds of the S. Wales direct-
line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 202. —
v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1905, Taf. XLIX.
fig. 4. — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new
ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 32, Pl. V. fig. 1—5 [*A. solitaria*
Moore l. c. inclus.]. — Principi, Foss. retici d'Amelia,
Riv. Ital. di Paleontol. XVI. 1910, p. 25, Tav. I. fig. 21—24. —
Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad.
sci. Cracovie, Nov. Déc. 1918, p. 123.
Deutschland, England, Schweiz, Nordalpen, Südalpen,
Karpathen, Apenninen, Burma, Rhaetisch.
- A. contorta* var. *Azzarolae* Stoppiani, Pal. Lomb. III. Couches
à *A. contorta* (Azzarola), 1861, p. 169, Pl. XI. fig. 3. — v. Ditt-
mar, Contortazone, 1864, p. 163. Südalpen, Rhaetisch.
- A. Cortinensis* Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R.
A. XVIII/1, 1895, p. 71, Taf. VIII. fig. 5. — Scalia, Fauna
del Trias sup. del Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat.,
Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 24, Tav. 11. fig. 23.
Südalpen, Sizilien, Karnisch.
- A. costatella* Stoppiani (1858) vide Lima costatella.

- A. *crispata* Goldfuss, Petref. Germaniae, II. 1838, p. 121, Taf. CXVII. fig. 4. — v. Schauroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 105. Taf. V. fig. 2 (Bakewellia costata var. crispata). — v. Alberti, Überbl. über d. Trias, 1864, p. 92.
 Süddeutschland, Muschelkalk.
- A. *eristata* Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 39, Tav. III. fig. 15.
 Sizilien, Karnisch.
- A. *Dalailamae* Verneuil (18) vide *Mytilus Dalailamae*.
 A. *decipiens* Salomon (1895), Galdieri (1908), Scalia (1910) vide A. *caudata* Stopp.
 A. *decussata* Graf zu Münster (1838, 1841) vide *Cassianella decussata*.
- A. *Deshayesi* (Terquem) Cappellini, Foss. infralias. del golfo della Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1868, p. 85, Tav. V. fig. 1—6. — De Stefanii, Rhaet. Foss. d. apuanischen Alpen, Verhandl. G. R. A. 1882, p. 101. — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, II. 1891, p. 18, Tav. I. fig. 9. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 838.
 Lias. — Apennin, Rhaetisch.
- A. cf. *Deshayesi* (Terqu.) Principi, Foss. retici d'Amelia, Rivista Ital. di Paleontol. XVI. 1910, p. 26.
 Appenin Rhaetisch.
- A. (?) *difficilis* Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895 p. 80, Taf. XXIV. fig. 19.
 Südalpen, Karnisch.
- A. *Di Stefanoi* Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 34, Tav. II. fig. 71—75.
 Sizilien, Karnisch.
- A. *dubia* Graf zu Münster (1841) vide *Leda dubia*.
 A. *Escheri Merian* (1853) vide A. *contorta*.
 A. *exilis* Stoppaani, Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. I. 1859, p. 92, Pl. XIX. fig. 2 (non Pal. Lomb. III. Couches à Avicula contorta, p. 259, Pl. LX, fig. 9—14 = *Perna exilis*). — Benecke, Über die Umgebung von Esino, Geogr. Pal. Beitr. II. 1878, p. 311, Taf. XXIV. fig. 12, 13. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XLII. fig. 17. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 15, Tav. II. fig. 14, 15. (nec De Lorenzo (1892), nec Bassani (1893) = *Perna exilis*).
 Südalpen, Ladinisch.
- A. *falcata* Stoppaani, Pal. Lomb. III. Couches à Avicula contorta (Schistes noirs), 1863, p. 135, Pl. XXXI. fig. 6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 164. — Galdieri, Malacofauna Trias di Giffoni, Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli, Vol. XII. ser. 2, No. 17, 1905, p. 26, Textfig. 13. — Galdieri Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. Napoli, XXXVIII. 1908, p. 83 [A. polymorpha Costa, Note geol. e pal. sui Mti. Picentini, Atti Ist. incorr. di Napoli, ser 2, T. I. 1864, p. 254, Tav. VI. fig. 22 inclus.].
 Südalpen, Nordalpen (?), Apennin (Salerno), Rhaetisch.
- A. *fallax* Pflücker y Rico, Das Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 409 (deest imago). — Vaughan, in Reynolds et Vaughan, The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 203.
 Deutschland, England, Rhaetisch.
- A. *flabellum* Schafhäutl (1865) vide A. *aspera*.
 A. *Flumendosai* Tommasi, Nuovi foss. trias. di Sardegna, Boll. Soc. geol. Ital. XV. 1896, p. 498, Tav. XI. ifg. 2.
 Sardinien, Karnisch.

- A. *Frechii* Bittner (1895) *Scalia* (1910) vide A. *Frederici*.
A. cf. Frechii (Bittn.) *Broili* (1904) vide A. cf. *pannonica*.
A. Frederici Waagen, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiser-
 alm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 90 [Nom. nov. pr.
 A. *Frechii* Bittner, Lam. v. St. Cassian, ibidem, XVIII/1,
 1895, p. 72, Taf. VIII. fig. 12, 13 et A. Bittneri *Frech* (non
 v. *Woehrmann*), Zentralbl. f. Min. etc. 1902, p. 615.] —
 Wilekens, Palaeontol. Unters. triad. Faunen v. Predazzo,
 Verhandl. naturhist. med. Ver. Heidelberg, N. F. 1909, p. 120,
 Taf. V. fig. 2 (A. Wöhramann). — *Scalia*, Fauna del Trias
 sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5,
 Vol. III. 1910, p. 28, Tav. II. fig. 41, 48, 49 (A. *Frechii*). —
 Tommasi Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 14,
 Tav. I. fig. 36 (A. cf. *Woehrmann*).}
 Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
A. Galeazzi Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta,
 1863, p. 136, Pl. XXXI. fig. 7—9 (Gervilleia). — v. Dittmar,
 Contortazone, 1864, p. 166 (Gervilleia).
 Südalpen, Rhaetisch.
A. cf. Galeazzi (Stopp.) *Frech*, Leitfoss d. Werfener Schichten
 u. Nachträge, Pal. Balaton, I/1, 1907, p. 91, Textfig. 26.
 Bakony, Rhaetisch.
A. Gammaniurae *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica,
 Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, Ser. 5. Vol. III. 1910,
 p. 30, Tav. II. fig. 60.
 Sizilien, Karnisch.
A. gansingensis v. Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 93,
 Taf. I fig. 8. — Blanckenhorn, Die Trias am Nordrande
 der Eifel, Abhandl. Geol. Spez. Kte. v. Preußen, VI/2, 1885,
 p. 100, Taf. III. fig. 1—4 [Bakewellia laevigata Fraas, Über
 Semionotus etc. Württemberg. Naturwiss. Jahreshefte, XVII.
 1862, p. 100, Taf. I. fig. 28 inclus.]. — Zeller, Lettenkohle
 u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV.
 1908, p. 76.
 Deutschland, Keuper.
A. sp. ind. ex aff. gansingensis (Alb.) *Scalia*, Fauna del Trias
 sup. di Mte. Judica. Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5,
 Vol. III. 1910, p. 31, Tav. III. fig. 64.
 Sizilien, Karnisch.
A. Gea D'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 201 [Nom. nov. pr.
 A. antiqua Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl.
 Tirols, IV. 1841, p. 77, Taf. VII. fig. 15] = sp. inval., teste
 Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A.
 XVIII/1, 1895, p. 69. — Stur, Geol. d. Steiermark, p. 252,
 259, v. Wöhramann (1889), Di Stefano (1895), Nelli
 (1899), Fiedler (1904) vide A. Sturi. — Laubé (1885)
 vide A. Cassiana.
A. Gemma *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad.
 Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 35, Tav. III.
 fig. 6.
 Sizilien, Karnisch.
A. (?) Girthiana Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III.
 Pt. 2. 1899, Iris Brach. and Lam. p. 48, Pl. VII. fig. 17—19.
 Himalaya, Karnisch.
A. globulus Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z.
 Geogn. etc. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 23, Taf. XVI. fig. 13
 = Posidonia an Daonella juv., teste Kittl, Monogr. d. Halobiidae u. Mnotidae, Pal. Balaton, I/1, 1912, p. 6, Taf. I. fig. 8.
A. Gortanii Schalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem.
 Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5. Vol. III. 1910, p. 27,
 Tav. II. fig. 42.
 Sizilien, Karnisch.
A. grabovicensis Kittl, Umgeb. v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A.
 LIII. 1903, p. 707, Taf. XXIII. fig. 9.
 Dinariden, Anisisch.

A. granulata Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 38, Tav. III. fig. 11—13.

Sizilien, Karnisch.

A. gregaria Stoppanni (1861), v. Dittmar (1864), De Steffani (1882) vide Modiola gregaria.

A. gryphaeata Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 127, Taf. CXVI. fig. 10a—d, Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 75, Taf. VII. fig. 7 vide Cassianella gryphaeata, Goldfuss, l. c. Taf. CXVI. fig. 10e vide Cassianella Beyrichii.

A. Hallensis v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 205, Taf. VII. fig. 9. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 70, Taf. VIII. fig. 19, 20. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 29, Tav. II. fig. 50. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 13, Tav. I. fig. 35.

Nordalpen, Südalpen, Sizilien, Karnisch.

A. Hofmanni Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 27, Taf. IV. fig. 6—9. — Frech, Aviculiden von Zacatecas, C. R. Congrès géol. X. Mexico, 1907, p. 332, Taf. I. fig. 2, 4 ((var. pseudopterinaea) Frech, l. c. p. 333, Taf. I, fig. 5 inclus.).

Bakony, Mexico, Karnisch.

A. Homfrayi Gabb, Palaeontol. of. California, I. 1864, p. 30, Pl. VI. fig. 26.

Nevada, Trias.

A. Ichnusae Tommasi, Nuovi foss. trias. di Sardegna, Boll. Soc. geol. Ital. XV. 1896, p. 498, Tav. XI. fig. 1.

Sardinien, Karnisch.

A. imbricata Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 36, Tav. III. fig. 7.

Sizilien, Karnisch.

Non **Avicula imbricata Mansuy**, Terr. més. de Sam Nena, Mém. Serv. géol. Indochine, VII/1 = **A. Mansuyi nob.**

Indochina (Laos), Obertrias.

A. inaequicostata Benecke (1868) vide Pseudomonotis (Eumorphotis) inaequicostata.

A. inaequiradiata Schafhäutl, Geogn. Bemerk. über d. Kramerberg bei Garmisch, Neues Jahrb. f. Min. 1852, p. 284, Taf. III. fig. 7, Winkler (1859), Stoppanni (1863) vide Cassianella inaequiradiata.

A. inaequiradiata var. Schafhäutl, Beitr. zur näheren Kenntn. d. bayerischen Voralpen, Neues Jahrb. f. Min. 1854, p. 555, Taf. VIII. fig. 22 vide A. contorta.

A. insolita Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 99, Taf. VIII. fig. 31.

Bakony, Ladinisch.

A. intermedia Emrich (1853), Winkler (1859) vide Oxytoma inaequivale var. intermedia.

A. japodica Bittner, Lamellibr. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 226, Taf. VII. fig. 2.

Südalpen, Ladinisch.

A. Koessensis v. Dittmar (1864) vide Oxytoma inaequivale var. intermedia.

A. Kokeni v. Wohrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 175, Taf. VIII. fig. 8, 9. — Waagen, Lamellibr. d. Pachycardien-tuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 91, Taf. XXXIV. fig. 7 (non 6,8 = A. Waageni Wick.). —

- Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica. Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 27, Tav. II. fig. 43, 45.
 Non A. Kokeni *Broili*, Fauna der Pachycardientuffe d. Seiser Alp, Palaeontogr. L. 1904, p. 164, Taf. XVIII. fig. 19 =
A. Broili Wilek. Südalpen, Sizilien, Karnisch.
- A. *Kokeni* (v. Woehrmann) var. *plana* Wilekens, Paleontol. Unters. triad. Faunen v. Predazzo. Verhandl. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 121, Taf. V. fig. 3.
 Südalpen, Ladinisch.
- A. *Kossmati* Bittner, Lamellibr. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI, 1901, p. 226, Taf. VII. fig. 12.
 Südalpen, Ladinisch.
- A. *Laczko* Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias. Pal. Balaton, I/1, 1904, p. 29, Textfig. 41.
 Bakony, Karnisch.
A. laevigata Klöden (1834) vide Gervilleia costata.
A. lineata Goldfuss (1838) vide Gervilleia lineata.
- A. *Loomisii* Broili, Fauna d. Pachycardientuffe d. Seiser Alp, Palaeontogr. L. 1904, p. 167, Taf. XVIII. fig. 28.
 Südalpen, Karnisch.
A. Luganensis v. Haauer (1857) vide Aviculopeeten Luganensis.
- A. *Marinellii* Gortani, Nuovi foss. Raibliani della Carnia, Rivista Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 82, Taf. VIII. fig. 12.
 Südalpen, Karnisch.
- A. *mediocalcis* Hohenstein, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 50 (220), Taf. I. fig. 36—38.
 Süddeutschland, Muschelkalk.
- A. *miljacensis* Kittl, Geol. v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 708, Taf. XXIII. fig. 10.
 Dinariden, Anisisch.
- A. modiolaris* (Münster) Schafhäutl (1863) vide Gervilleia Saneti Galli.
- A. *mueronata* Gabb, Palaeontol. of California, I. 1864, Pl. V. fig. 27.
 California, Obertrias.
A. mytiliformis Stoppani (1886), *Scalia* (1910); Tommasi (1911) vide *A. caudata*.
- A. Napolii* Costa (1864) vide Cassianella Napolii.
- A. *Nilssoni* Lundgren, Studier öfver faunan i. d. stenkolsför. form. i Skane. Fisiogr. Sellsks. Minneskr. Lund, 1878, p. 41, Taf. I. fig. 38, 39. — Lundgren, Molluskaen i Sveriges äldre mesoz. bild. Lunds Univers. Arskr. XVII. 1881, p. 33. Skåne, Rhaetisch, Lias.
- A. *obtusa* Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 72, Taf. VIII. fig. 16.
 Südalpen, Karnisch.
- A. cf. *obtusa* (Bittn.) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 485. — *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 52, Tav. II. fig. 65, 66. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 15. — Toulou, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 101, Taf. VI. fig. 38.
 Dobrudscha, Ladinisch. — Nordalpen, Südalpen, Sizilien, Karnisch.
- A. *ochotica* Keyserling (1848) vide Pseudomonotis ochotica,
- A. *ornato-plicata* *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 35, Tav. III. fig. 1—5.
 Sizilien, Karnisch.
- A. *Pahangensis* Newton, On marine triass. Lamellibr. Malay Pennins. Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 131, Pl. XII. fig. 3—5 (Pteria).
 Malacca, Obertrias.

- A. pannonica** Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 25, Taf. IV. fig. 13. — **Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 26, Taf. II. fig. 38—40. Bakony, Sizilien, Karnisch.
- A. cf. pannonica** (Bittn.) Waagen, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 89, Taf. XXXIV. fig. 2 [A. cf. Frechii Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontogr. L. 1904, p. 166, Taf. XVIII. fig. 24 inclusus.] Südalpen, Karnisch.
- A. parallela** **Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 41, Taf. III. fig. 20. Sizilien, Karnisch.
- A. Paronai** **Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 39, Taf. III. fig. 16. Sizilien, Karnisch.
- A. Pastannahensis** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 88, Pl. XII. fig. 6. Himalaya, Anisisch.
- A. pectinoides* v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 242, Taf. XV. fig. 23 = gen. ind. sp. ind. teste Bittder, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 75.
- A. pes hominis** **Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 40, Taf. III. fig. 17. Sizilien, Karnisch.
- A. planidorsata* Münnster (1841) vide Cassianella planidorsata.
- A. Plataniai** **Scalia**, Fauna del Trias sup. del Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 32, Taf. 11. fig. 68. Sizilien, Karnisch.
- A. polaris** Kittle, Triassfoss. vom Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. Expedition, No. 7, Kristiania, 1907, p. 12, Taf. I. fig. 2—4. Ellesmereland, Karnisch.
- A. polymorpha* Costa (1864) vide Perna exilis.
- A. Prosslinensis** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 168, Taf. XIX. fig. 1. Südalpen, Karnisch.
- A. psilonoti** (Capellini) De Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuanischen Alpen, Verhandl. G. R. A. 1882, p. 100 [Typ. Myconcha psilonoti Capellini, Foss. infralias. del golfo della Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 53, Taf. IV. fig. 1, non Mytilus psilonoti Quenstedt (1858)]. Apennin, Rhaet.
- A. pulchella** v. Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 92, Taf. 1, fig. 7. Süddeutschland, Muschelkalk.
- A. pygmaea* Münnster (1841) vide Pseudomonotis (?) pygmaea.
- A. recta** Gortani, Nuovi foss. Raibl. della Carnia. Rivista Ital. Pal. VIII. 1902, p. 82, Taf. VIII. fig. 17. Südalpen, Karnisch.
- A. salinaria* d'Orbigny (1849) vide Monotis salinaria.
- A. Salomoni** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 100 Taf. XVIII. fig. 25, 26. Südalpen, Karnisch.
- A. salvata* Brunner (1852), Stabile (1854) vide Gervilleis salvata.
- A. Seguenzai** **Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 41, Taf. III. fig. 21. Sizilien, Karnisch.

- A. Seisiana Broili**, Fauna d. Pachycardeintuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 166, Taf. XVIII. fig. 27. — **Wagen**, Lamellibranchiaten d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 90, Taf. XXXIV. fig. 3—5. Südalpen, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. Seisianae (Broili)** Dicner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vel. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatoocrinus limest. p. 30, Pl. V. fig. 17. Himalaya, Karnisch.
- A. sicana Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, Ser. 5, Vol. III. 1910, p. 25, Tav. II. fig. 26—28. Sizilien, Karnisch.
- A. sicula Scalia**, I. c. p. 26, Tav. II. fig. 34—37. Sizilien, Karnisch.
- A. Sinemuriensis (d'Orbigny)** Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, 1869, p. 77, Taf. IV, fig. 14 = Oxytoma inaequivale Sow. (Var. intermedia Emmr?). Sizilien, Karnisch.
- A. socialis v. Ziethen** (1833), **Geldfuss** (1838), **Girard** (1843), **Geinitz** (1846), **Catullo** (1848) vide Hoernesia socialis.
- A. sola Öberg**, Triasforst. fran Spetsbergen. K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 4, 1877, p. 18, Taf. V. fig. 8. Spitzbergen, Anisisch.
- A. solitaria Moore** (1861) vide A. contorta.
- A. speciosa Merian** (1853) vide Cassianella inaequiradiata.
- A. Stoppanii Tommasi**, Rivista fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. Tecnico Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 22, Tav. II. fig. 1. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 656. — **Bittner**, Lamellibr. von St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 70. Südalpen, Apulien, Karnisch.
- A. cf. Stoppanii (Tommasi)** Frech, Neue Zweischaler etc. aus der Bakonyer Trias, Pal. Balaton, I/1, 1904, p. 46, Textfig. 64. Bakony, Hauptdolomit.
- A. striatoplicata v. Hauer** (1850) vide Pseudomonotis striatoplicata.
- A. Sturi Bittner**, Lamellibr. von St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 69, Taf. VIII. fig. 1—4. [Nom. nov. pro A. Gea (d'Orbigny) Stur, Geologie d. Steiermark, p. 252, 259, ? A. Gea v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 205, Taf. VIII. fig. 1, A. Gea Tommasi, Rivista fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. Tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 20 inclus.]. — **Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 29, Tav. II. fig. 51—56. — **Nelli**, Il Raibl dei dintorni di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 213, Tav. VIII. fig. 18 (A. Gea). — **Fiedler**, Verst. aus d. Arlbergschichten bei Bludenz, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, Briefl. Mitt. p. 9. Nordalpen, Südalpen, Sizilien, Karnisch.
- A. cf. Sturi (Bittn.) Bittner**, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 70, Taf. VIII. fig. 14, 15. — **Wilckens**, Paleontol. Untersuchg. triad. Faunen d. Umgebg. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 120. Bakony, Karnisch.
- A. sp. ind. ex aff Sturi (Bittn.) Bittner**, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 24. Bakony, Karnisch.
- A. subspeciosa Martin** (1865) vide Cassianella subspeciosa.
- A. subtrigona Scalia**, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 30, Tav. II. fig. 57—59. Sizilien, Karnisch.

- A. *Taramellii Tommasi* (1882, 1895) vide *Pseudomonotis* (*Eumorphotis*) *Taramellii*.
 A. *tenuidorsata* v. *Klipstein* (1843) vide *Cassianella planidorsata*.
 A. *tenuistria* Münster (1838, 1841) vide *Cassianella tenuistria*.
 A. *Tofanae Bittner*, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 71, Taf. VIII, fig. 9—11. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 165, Taf. XVIII, fig. 20. — Principi, Studio geol. del Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 193, Tav. VII, fig. 7. Südalpen, Karnisch, Apennin, Rhaet.
 A. cf. *Tofanae* (Bittn.) Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 24. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 28, Tav. II, fig. 46, 47. Bakony, Sizilien, Karnisch.
 A. sp. ind. aff. *Tofanae* (Bittn.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. I, 1906, Fauna Tropites limest. of Byans, p. 9, Pl. XVII, fig. 7. Himalaya, Obertrias.
 A. *Tommasii Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 37, Tav. III, fig. 10. Sizilien, Karnisch.
 A. *trapezoides* v. *Klipstein* (1843) vide *Cassianella bidorsata*.
 A. *varicosa Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica. Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 40. Tav. III, fig. 18, 19. Sizilien, Karnisch.
 A. *Venetiana* v. Hauer (1851), Benecke (1868), Lepsius (1878), Tommasi (1882, 1895), Salomon (1895) vide *Pseudomonotis Venetiana*.
 A. *Waageni Wilckens*, Pal. Unters. triad. Faunen von Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 122, Taf. V, fig. 4 [Nom. nov. pr. A. Kokeni Waagen, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abh. G. R. A. XVIII/2, 1907, Taf. XXXIV, fig. 6, 8, non 7]. Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
 A. *Weissenbachensis Tula*, Schichten mit Gerv. Bouei vom Gaumannmüllerkogel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 389, Taf. XII, fig. 5. Nordalpen, Karnisch.
 A. *Woehrmanni Wilckens* (1909) vide A. Frederici.
 A. *Zamboninii Scalia*, Fauna Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 33, Tav. II, fig. 25. Sizilien, Karnisch.
 A. *Zeuschneri Wissmann* (1841), v. Hauer (1850) vide *Pseudomonotis Zeuschneri*, v. Schau Roth (1859) vide *Pseudomonotis* (*Eumorphotis*) *Schaurothi*.
 A. sp. ind. v. Hauer, Über d. von Bergr. Fuchsin d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 10, Taf. IV, fig. 1 = Gen. ind. sp. ind.
 A. sp. ind. I. *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1859, p. 70, Pl. XI, fig. 3, 4. Südalpen, Rhaet.
 A. sp. ind. II. *Stoppani*, l. c. Pl. XI, fig. 5. Südalpen, Rhaet.
 A. sp. ind. I. *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, schistes noirs, 1863, p. 136, Pl. XXXI, fig. 10. Südalpen, Rhaet.
 A. sv. ind. II *Stoppani*, l. c. p. 136 Pl. XXXI, fig. 11. Südalpen, Rhaet.
 A. sp. ind. III. *Stoppani*, l. c. p. 136, Pl. XXXI, fig. 12, 13. Südalpen, Rhaet.

- A. (an *Oxytoma?*) sp. ind. Paron a, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 95, Tav. VIII. fig. 8 = Gen. ind. sp. ind. teste v. Woehrmann Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 657.
- A. nov. sp. ind. Bassani, Foss. nella dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 8, Tav. I. fig. 8, 9.
- Apennin, Rhaet.
- A. sp. nov. Tommasi, Fauna Trias inf. vers. merid. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 51, Tav. III. fig. 8 = ? Pseudomonotis Telleri Bittn., teste Bittner, Über Pseudom. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 569.
- A. sp. ind. Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 24, Textfig. 4.
- Bäreninsel, Karnisch.
- A. (an *Pleuroneectites?*) sp. ind. Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 86, Taf. V. fig. 25.
- Südalpen, Ladinisch.
- A. sp. ind. I. Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 168, Taf. XIX. fig. 3.
- Südalpen, Karnisch.
- A. sp. ind. II. Broili, l. c. p. 169, Taf. XIX. fig. 2.
- Südalpen, Karnisch.
- A. sp. ind. III. Broili, l. c. p. 169, Taf. XIX. fig. 4.
- Südalpen, Karnisch.
- A. sp. ind. Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 36, Pl. V. fig. 6—8.
- Burma, Rhaet.
- A. sp. ind. Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 42, Tav. III fig. 23.
- Sizilien, Karnisch.
- A. sp. ind. Troula, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 102, Taf. VI. fig. 39, 40 = Gen. ind. sp. ind.

Subgen. **Bittneria** Broili,

- Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 168.
Typ. Avicula efflata Broili (1904).
- B. efflata Broili, Fauna d. Pach cardientuffe, l. c. p. 167, Taf. XVIII, fig. 29—32. — Wagen, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abh. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 91, Taf. XXXIV. fig. 9, 10.
- Südalpen, Karnisch.

Subgen. **Leptodesma** Hall.

- I. Torelli Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 25, Taf. III. fig. 13, 16, 17, 21, 26.
- Bäreninsel, Karnisch.

Subgen. **Meleagrina** Lam.

- II. Fouloni Bittner, Triasprefakten v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 111, Taf. II. fig. 2, Textfig.
- Anatolien, Norisch.
- M. septentrionalis Teller, Pelecypoden von Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Petersbourg, 7. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 134, Taf. XIX. fig. 6.
- Nordsibirien, Norisch.

M. *Tundrae* Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojanask, l. c. p. 133, Taf. XIX. fig. 9.
Nordsibirien, Norisch.

Gen. **Aviculopecten** M'Coy.

(Subgen. **Oxypteria** L. Waagen inclus.).

Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 149.

- A. *aerarius* Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien. Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 593, Taf. XXVI. fig. 18. Dinariden, Anisisch.
- A. *Beneckeai* Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian. Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 77, Taf. XXIV. fig. 17. Südalpen, Ladinisch.
- A. *Bosniae* Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien. Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 592, 606. Taf. XXVI. fig. 16, 17. — Toulá, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 103, Taf. VI. fig. 42. Dinariden, Anisisch. — Nordalpen, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. *Bosniae* (Bittn.) Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 708. Dinariden, Anisisch.
- A. *Di Stefanoi Marianii*, Contrib. allo studio bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 241, Tav. IV. fig. 6, Textfig. Südalpen, Ladinisch.
- A. *elegantulus* Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 97, Taf. VIII. fig. 16. Bakony, Anisisch.
- A. *Esinensis* Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian. Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 77, Taf. VIII. fig. 27. Südalpen, Ladinisch.
- A. *Herbiehii* Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien etc. Jahrb. G. R. A. II. 1902, p. 604, Taf. XXVI. fig. 14, 15. Dinariden, Anisisch.
- A. *interruptus* Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien. Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 591, Taf. XXVI. fig. 13. Dinariden, Anisisch.
- A. *Katzeri* Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien etc. Jahrb. G. R. A. LII, 1902, p. 608, Taf. XXVI. fig. 22. Dinariden, Anisisch.
- A. *Luganensis* v. Hauser, Palaeontol. Notizen, Sitzber. Akad. Wien, XXIV. 1857, p. 151, Taf. I. fig. 4, 5. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 148. Südalpen, Ladinisch.
- A. *Milenae Vinassa de Regny*, Foss. del Montenegro, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, Vol. X. 1903, p. 223 (465), Tav. II. fig. 23. Dinariden, Ladinisch.
- A. *Schlosseri* Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien etc. Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 606, Taf. XXVI. fig. 19—21. Dinariden, Anisisch.
- A. *tenuistriatus* Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 23, Taf. III. fig. 20. Bäreninsel, Karnisch.
- A. *triadicus* Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 147, Taf. IV. fig. 35. Südalpen, Ladinisch.
- A. *Viezzeneae Willekens*, Palaeontol. Untersuchung. triad. Fauna v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 128, Taf. V. fig. 13. Südalpen, Ladinisch.

- A. Wissmanni Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols IV, 1841, p. 78, Taf. VIII. fig. 1. — Laube, Bemerkungen über d. Münster'schen Arten von St. Cassian, Jahrb. G. R. A. XIV. 1864, p. 407 (Halobia). — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 148. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 76, Taf. VIII. fig. 25, 26. — De Lorenzo, Foss. Trias medio di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 139. — Tornquist, Recoaro u. Schio, II. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 363, Taf. XIX. fig. 4. — Marianini, Contrib. studio bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 241, Tav. IX. fig. 5. — Scalia, Fauna Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 43. Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Sizilien, Basilicata, Karnisch.

- A. Wissmanni (Münst.) var. rarecostata Simionescu, Fauna trias. ins. Popina Acad., Rom. IV. Bucuresci (Adamachi), 1910, p. 513. Textfig. 22.

Dobrudscha, Karnisch.

Subgen. **Oxypteria** Waagen.

Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abh. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 93.

Typ. Aviculopecten Bittneri Waagen (1907).

C. Bittneri Waagen, l. c. p. 93, Taf. XXXIV. fig. 11.

Südalpen, Karnisch.

Gen. **Cassianella** Beyrich.

(Subgen. **Burckhardtia** Frech inclus.).

[Syn.: *Actinophorus* Meeck, Remark on the family Pteriidae. Amer. Journ. of sci. XXXVII. 1864, p. 218, et *Gryphorhynchus* Meeck, l. c. p. 217.]

Beyrich, Zwei aus d. deutsch. Muschelk. noch nicht bekannte Avicula-artige Muscheln. Zeitschr. D. G. G. XIV. 1862, Prot. p. 9. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 50.

Typ. Avicula gryphaeata Münster 1838).

C. ampezzana Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1 1895, p. 58, Taf. VI. fig. 10, 11.

Südalpen, Karnisch.

C. ampezzana var. praecursor Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Balaton, 1904, p. 17, Textfig. 16.

Bakony, Anisisch.

C. angusta Bittner, Triasprefakte v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 11, Taf. II. fig. 15, 16. — Bittner, Neue Arten aus d. Trias v. Balia, ibidem, XLII. 1892, p. 84, Taf. V. fig. 1. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 60, Taf. V. fig. 23—26. — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, 1901, p. 29, Taf. V. fig. 4—6. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 294, Tav. IX. fig. 10, 11. — Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 44, Tav. III. fig. 29—40.

Nordalpen, Südalpen, Bakony, Sizilien, Karnisch. — Anatolien, Norisch.

C. cf. angusta (Bittn.) Toulou, Schichten mit Gerv. Bouei vom Gaumannmüllerkogel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 390, Taf. XII. fig. 6.

Nordalpen, Karnisch.

- C. avicularis** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 70, Taf. VII. fig. 3 (Gryphaea). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 75, Taf. XX. fig. 10 (Gryphaea?). — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 61, Taf. VI. fig. 12–14, 15. Südalpen, Karnisch.
- C. Beyrichii** Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1 1895, p. 54, Taf. VI. fig. 16–21 [Typ. Avicula gryphaeata Münster, in Goldfuss, Petrefacta Germ. II. 1838, p. 127, Taf. CXVI. fig. 10e, 10a—d exclus., Cassianella gryphaeata Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 46, Taf. XVII. fig. 1a–h inclus.]. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 170, Taf. XIX. fig. 9, 10. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 47, Tav. I. fig. 9. Südalpen, Apennia, Karnisch.
- C. Beyrichii** (Bittn.) var. **Viezzenensis** Willekens, Palaeont. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Abh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 126, Taf. V. fig. 9–11, Textfig. 3. Südalpen, Ladinisch.
- C. bidorsata** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 76, Taf. VII. fig. 9 (Avicula). — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII[1], 1895, p. 59, Taf. VII. fig. 4, 5. [? Avicula trapezoides v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 243, Taf. XV. fig. 24 inclus.]. Südalpen, Karnisch.
- C. Cisloneensis** Pelafka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlern-dolomits Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 600, Taf. XVIII, fig. 5. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 66. Südalpen, Ladinisch.
- C. contorta** Pflücker (1868), Fischer-Ooster (1869) vide Avicula contorta.
- C. decussata** Graf zu Münster, in Goldfuss Petref. Germ. II. 1838, p. 128, Taf. CXVI. fig. 12 (Avicula). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 76, Taf. VII. fig. 10 (Avicula). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 47, Taf. XVII. fig. 2d–k (non 2a, b, c = C. planidorsata). — Parona, Studio monogr. (non 2a, b, c = C. planidorsata). — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 95, Tav. VIII. fig. 5. — Woermann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Woermann, Raibler Schichten, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 175. — v. Woermann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 657. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 63, Taf. VII. fig. 6–15, 20. — Neilli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 215, Tav. VIII. fig. 21. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 169, Taf. XIX. fig. 5. — Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIX. fig. 4. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 48, Tav. I. fig. 10. — Wurm, Trias von Catalonien, Zeitschr. D. G. G. LXXI. 1919, Monatsber. p. 156. Nordalpen, Südalpen, Apennin, Sizilien, Karnisch. — Catalonien, Obertrias.
- C. sp. ind. aff. decussatae** (Mstr.) Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abh. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1908, p. 61, Taf. II. fig. 5. Deutschland, Muschelkalk.
- C. Dieneri** Wagen, Lamellibr. d. Pachycardientuffo d. Seiser Alm. Abh. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 87, Taf. XXXIV. fig. 1. Südalpen, Karnisch.

- C. *Dinii Galdieri*, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 49, Tav. I. fig. 11 [= ? *Avicula Dinii*, teste L. Wagen, Verh. G. R. A. 1909, p. 84.] — *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 34, Tav. II. fig. 70.

Apennin, Sizilien, Karnisch.

- C. *Eeki Böhm*, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, Briefl. Mitt. p. 95, Textfig. 1 [*Avicula tenuistria Beyrich*, non *Graf zu Münster*, ibidem II, 1850, p. 256, XIV. 1862, p. 9, Eek, Form. d. bunten Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 98 inclus.). — *Assmann*, Brach. u. Lamellibr. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 597, Taf. XXXI. fig. 12—15.

Deutschland, Muschelkalk.

- C. *Escheri v. Arthaber*, Lethaea mes. I/3, Alpine Trias, 1906, Taf. XLIX. fig. 5 vide C. *inaequiradiata*.

- C. *euglypha Laubbe*, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 46, Taf. XVII. fig. 5. — *Bittner*, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 52, Taf. VII. fig. 1.

Südalpen, Karnisch.

- C. *euglyphoides Bittner*, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 52, Taf. VII. fig. 2, 3.

Südalpen, Karnisch.

- C. *gryphaeata* *Graf zu Münster*, in Goldfuss Petref. Germ. II. 1838, p. 127, Taf. CXVI. fig. 10a—d (non e) [*Avicula*]. — *Graf zu Münster*, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 75, Taf. VII. fig. 7 (*Avicula*). — *Laubbe*, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 46, Taf. XVII. fig. 1i (la—h exclus. = C. *Beyrichii* *Bittn.*) [*Ostrea avicularis* v. *Klipstein*, Östl. Alped. 1843, p. 246, Taf. XV, fig. 30, O. Bronni v. *Klipstein*, I. c. p. 247, Taf. XV, fig. 31 inclus.]. — *Parona*, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 96, Tav. VIII. fig. 8. — v. *Wohrmann*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 657. — *Bittner*, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 56, Taf. VI. fig. 1—3. — *Nelli*, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 214 Tav. VIII. fig. 14, 15. — *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Judica, Boll. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, Maggio 1908, p. 19. — *Galdieri*, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 51, Tav. I. fig. 13. — *Scalia*, I, gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII 1909, p. 294, Tav. IX. fig. 8, 9. — *Scalia*, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 43, Tav. III. fig. 24—27.

Nordalpen, Südalpen, Apennia, Sizilien, Karnisch.

- C. cf. *gryphaeata* (Mstr.) v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 165.

Nordalpen, Rhaet.

- C. cf. *gryphaeata* (Mstr.) *Simionescu*, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. (Adamachi) IV. Boucarest, 1910, p. 512. — *Mansuy*, Contrib. géol. Tonkin, Paléontol. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 64.

Dobrudscha, Karnisch. — Tonkin, Obertrias.

- C. nov. sp. ind. ex aff. *gryphaeatae* (Mstr.) et *tequistriatae* (Mstr.) *Mariani*, Caratt. trias. della fauna retica Lombardia, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XXXVIII. 1905, p. 857, Textfig.

Südalpen, Rhaet.

- C. *gryphostoma* v. *Gembel*, Über das Vorkommen von unt. Triasschichten in Hochasiens, Sitzsber. bayer. Akad. München, 1865 (II), p. 361, Textfig. 13.

Himalaya, Skythisch (?).

- C. *Inaequiradiata* Schafhäutl., Geogn. Untersuchg. d. südbayerisch. Alpengeb. 1851, p. 53 (Avicula). — Schafhäutl., Geogn. Bem. über d. Kramerberg bei Garmisch, N. Jahrb. f. Min. 1852, p. 284, Taf. III. fig. 7 (Avicula). — Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 13 (Avicula). — Stoppani, Paléont. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 69, Pl. XI. fig. 2 (Avicula). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone in d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, Nov. Dec. 1916, p. 126 [Avicula speciosa Merian, in Escher v. d. Linth, Bem. über d. nördl. Vorarlberg, Nouv. Mém. Soc. Helvet. sci. nat. Zürich, XIII. 1853, p. 19, Pl. II. fig. 1—13, Cassianella speciosa v. Dittmar Contortazone, 1864, p. 164, Fischer-Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Nat. Ges. Bern, 1869, p. 77, Taf. IV. fig. 13, C. Escheri v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLIX. fig. 5 inclus.]. — Karpthen, Nordalpen, Südalpen, Schweiz, Rhaet.
- C. *Johannis Boehmi* Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 153, Taf. IV. fig. 44—46. — Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
- C. *Katia lotica* Krumbbeck, Obere Trias v. Sumatra. Beitr. Geol. Niederl. Indien, II/3, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 226, Taf. XVI. fig. 2, 3. — Sumatra, Norisch.
- C. *Napolii Costa*, Nota ad una comm. di C. Napoli, Annali Acad. aspir. nat. Napoli, ser. 3, Vol. IV. 1864, p. 35, Textfig. 5 (Avicula). — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 52, Tav. I. fig. 14. — Apennin, Karnisch.
- C. *orobica* Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 91, Tav. 1. fig. 12. — Südalpen, Anisisch.
- C. *planidorsata* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 76, Taf. VII. fig. 11 (Avicula). — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 65, Taf. VII. fig. 16—19, 21 [Avicula impressa Graf zu Münster, l. c. p. 76, Taf. VII. fig. 12, A. tenuidorsata v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 240, Taf. XV. fig. 20, C. decussata Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 47, Taf. XVII. fig. 2a, b, c (non d—k) inclus.]. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 170, Taf. XIX. fig. 6, 7. — Waggon, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abh. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 87. — Südalpen, Karnisch.
- C. cf. *planidorsata* (Mstr.) v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 164. — Nordalpen, Rhaetisch.
- C. *pulchella* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Him. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lamellibr. p. 58, Pl. VIII. fig. 10. — Himalaya, Norisch.
- C. *Rosenbuschi* Philipp, Pal. Untersuchg. Predazzo, Ztschr., D. G. G. LVI. 1904, p. 87, Taf. V. fig. 27—30. — Südalpen, Ladinisch.
- C. *scapellensis* Scalia, Fauna del Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 45, Tav. III. fig. 42. — Sizilien, Karnisch.
- C. *sieula* Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 45, Tav. III. fig. 41. — Sizilien, Karnisch.
- C. *speciosa* (Mer.) v. Dittmar (1864), Fischer-Ooster (1869), v. Arthaber (1906) vide C. inaequiradiata.
- C. *Sturi* v. Wöhrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 206, Taf. VII. fig. 10—12, Raibler Schichten, ibidem XLIII. 1893, p. 657 vide Hoernesia Sturi.

- C. subeuglypha* K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913. p. 143, Taf. I. fig. 16. — J a w o r s k i , Nuculamerget v. Misol, Palaeontol. v. Timor, II/5, 1915, p. 94, Taf. XLIII. fig. 18, 19. Indonesien, Norisch.
- C. subspeciosa* M a r t i n , Zone à Av. contorta, Mém. Acad. sci. Dijon, XII. 1865, p. 243 (Avicula). [Nom. nov. pr. Avicula speciosa Merian, in E s c h e r v. d. L i n t h , Geol. Bem. über d. nördl. Vorarlberg, Nouv. Mém. Soc. Helvet. sci. nat. Zürich, XIII. 1853, p. 19, Pl. II. fig. 6—13 [non Hall (1843)]].
- Nordalpen, Rhaet
- C. cf. subspeciosa* H e a l e y , Fauna of the Napeng beds. Pal. Ind. new ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 30, Pl. IV. fig. 15. Burma, Rhaet.
- C. tectiformis* B ö h m , Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 29, Taf. IV. fig. 15, 16. Bäreninsel, Karnisch.
- C. tenuistria* G r a f z u M ü n s t e r , in G o l d f u s s , Petref. Germ. II, 1838, p. 127, Taf. CXVI. fig. 11 (Avicula). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV, 1841, p. 78, Taf. VII. fig. 8 (Avicula). — L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkchr. Akad. Wien, XXV, 1865, p. 48, Taf. XVII. fig. 3d—g (non a—o = Cassianella sp. ind.). — B i t t n e r , Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 58, Taf. VI. fig. 6 — B r o i l i , Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 170, Taf. XIX. fig. 8. — W i l c k e n s , Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 123, Taf. V. fig. 6, 7. — S c a l i a , Fauna Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 44, Tav. III. fig. 28. Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Sizilien, Karnisch.
- C. tenuistria* var. *tonkinensis*, M a n s u y , Faune mes. de Sam Nena, Mém. Serv. géol. Indochine, VII/1. Indochina, Karnisch.
- C. cf. tenuistria* (M s t r.) v. A l b e r t i , Überblick über d. Trias, 1864, p. 91. Süddeutschland, Mittelkeuper.
- C. transiens* W i l c k e n s , Pal. Untersuchung. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 124, Taf. V. fig. 5, 8. Südalpen, Ladinisch.
- C. Verbeekii* K r u m b e c k , Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. Geol. Niederl. Indien, II/3, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 225, Taf. XVI. fig. 4—6. Sumatra, Norisch.
- C. sp. ind.* B i t t n e r , Geol. Aufnahmen in Judicarien, Jahrb. G. R. A. XXXI. 1881, p. 242. Südalpen, Anisisch.
- C. sp. ind.* B i t t n e r , Pal. Ind. ser. XV. Him. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and. Lamellibr. p. 49, Pl. VIII. fig. 7—9. Himalaya, Karnisch.
- C. sp. ind.* B i t t n e r , Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, 1901, p. 97, Taf. VII. fig. 32. Bakony, Anisisch.
- C. sp. ind.* T r e c h m a n n , Trias of New Zealand, Quart. Jour. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 206, Pl. XXI. fig. 19. Neuseeland, Karnisch.
- C. sp. ind.* I. H e a l e y , Fauna of the Naping beds, Pal. Ind. new ser. vol. II. No. 4, 1908, p. 27, Pl. IV. fig. 12. — II. H e a l e y , ibidem, p. 28, Pl. IV. fig. 13. — III. H e a l e y , ibidem, p. 29, Pl. IV. fig. 14. — IV. H e a l e y , ibidem, p. 29, Pl. IV. fig. 16. Burma, Rhaet.

- C. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. I. Pt. 1, 1908, Upper Triassic etc. faunae of the exotic blocks etc. p. 4, Pl. VIII. fig. 6.
Himalaya, Karnisch.
- C. sp. ind. Wilckens, Pal. Untersuchung triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 127, Taf. V. fig. 12.
Südalpen, Ladinisch.

Subgen. **Burckhardtia** Frech,

- Aviculiden von Zacatecas, Compte-rendu Congrès géol. internat. X. Mexico, 1907, p. 334.
Typ. B. Boesei Frech (1907).
- B. Aguilerae Frech, l. c. p. 335, Taf. II. fig. 1.
Mexico, Karnisch.
- B. Boesei Frech, l. c. p. 334, Taf. II, fig. 2.
Mexico, Karnisch.
- B. (?) sp. ind. (aff decussatae Mstr.?) Frech, l. c. p. 335, Taf. II. fig. 3.
Mexico, Karnisch.

Gen. **Lilangina** Diener.

- Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carni and noric faunae of Spiti, p. 62.
Typ. Lilangina nobilis Diener (1908).
- L. nobilis Diener, l. c. p. 62, Pl. VIII. fig. 1, 2.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Oxytoma** Meek.

- O. Czekanowskii Teller, Pelecypoden von Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 131, Taf. XIX. fig. 4, 5.
Nordsibirien, Norisch.
- C. inaequivalve (Sow.) var. intermedia Emmerich, Geognost. Beobachtgn. aus d. östl. bayer. Alpen. Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 376 (Avicula). — Winkler, Schichten d. Arvicula contorta, 1859, p. 13. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt., Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 77, Taf. IV. fig. 14. — L. Waagen, Der Formenkreis d. O. inaequivalve, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 13, Taf. I. fig. I, 2 [Avicula bavarica Schafhäutl, Beitr. z. näheren Kenntn. d. bayer. Voralpen, II. N. Jahrb. f. Min. 1854, p. 544, Taf. VIII. fig. 11, Avic. Koessenensis v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 164 inclus.]. — Merwartz, Neue Funde aus d. Trias d. Bukowina, Mitt. Geol. Ges. Wien, III. 1910, p. 526. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, Nov. Dec. 1916, p. 124, Taf. VIII. fig. 6.
Nordalpen, Westschweiz, Karpathen, Rhaet. Lias.
- O. Mojsisovici Teller, Pelecypoden v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 129, Taf. XIX. fig. 7, 8.
Nordsibirien, Norisch.
- O. sp. ind. Böhm, Triasversteinerungen vom Bellund, Archiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 6, Taf. I. fig. 8.
Spitzbergen, Norisch.

Gen. **Pseudomonotis** Beyrich,
 (Subgen. **Claraia** Bittner, **Eumicrotis** Meek,
Eumorphotis Bittner inclus.).

Beyrich, Über zwei neue Formengruppen aus d. Familie d. Aviculiden; Zeitschr. D. G. G. XIV. 1862, p. 9. — Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 105. — Salomon, Über Pseudomonotis u. Pleuronectites, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 358. — Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 559. — Cossmann, Revue crit. de Paléozool. VI. 1902, p. 75 (Typ. Ps. speluncaria Sch.). — Diener, Über d. Typus d. Gattg. Pseudomonotis, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 342 (Typ. Ps. ochotica Keyss.). — Cossmann, Revue crit. de Paléozool. VI. 1902, p. 194. — Diener, Noch ein Wort über d. Typus d. Gattg. Pseudomonotis, Zentralbl. f. Min. 1903, p. 17. — Frech, Leitfoss. d. Werf. Schichten etc. Pal. Balaton, 1907, p. 17.

Typ. Avicula ochotica Keyserling (1848).

Ps. asperata Bittner (1900) vide *Ps. (Eumorphotis) Telleri* var. *asperata*.

Ps. Bittneri Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 93, Taf. VI. fig. 18, 19. Südalpen, Ladinisch.

Ps. bokharica Bittner, Beitr. z. Pal. triad. Ablag. zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 717, Taf. XV. fig. 1. Bokhara, Skythisch.

Ps. camuna Salomon (1900) vide *Ps. Telleri*.

Ps. caucasica v. Wittenburg, Sur la forme caractér. de Pseudomon. du Caucase etc. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1913, p. 480, 486, Pl. I. fig. 1—4. Kaukasus, Norisch.

Ps. convexa Mansuy, Mission Zeil dans le Laos etc. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 45, Pl. IX. fig. 5. Indochina, Mittl. Trias (?).

Ps. cycloidea Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 125, Taf. XIX. fig. 1. Nordsibirien, Norisch.

Ps. (?) dubiosa Bittner (1901) vide *Posidonia (?) dubiosa*. *Ps. excentrostriata* Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, Beitr. z. Geol. v. Niederrl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 31, Taf. 1. fig. 15. Indonesien, Norisch.

Ps. himaica Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III, Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lam. p. 10, Pl. I. fig. 16—21. Himalaya, Skythisch.

Ps. jakutica Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 124, Taf. XVII. fig. 16—18. Nordsibirien, Norisch.

Ps. Laosensis Mansuy, Mission Zeil dans le Laos etc. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 46, Pl. IX. fig. 8. Indochina, Mittl. Trias (?).

Ps. (?) Michaeli Assmann, Brach. u. Lamellibr. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 596, Taf. XXXI, fig. 10, 11. Deutschland, Muschelkalk.

- Ps. ochotica** Keyserling, in Th. v. Middendorff's Reise in d. äußersten Norden u. Osten Sibiriens, St. Petersburg, I/1, 1848, p. 257 Taf. VI. fig. 15—17 (Avicula). — Teller, Pelecypodenfauna von Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Petersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 116, Taf. XVII. fig. 1—15, XVIII. fig. 1—11. — Teller, in E. v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Österr. VII. 1888, p. 175, Taf. II. fig. 6—8. — Borissjak, Pseudomon. ochotica der krym-kaukasischen Trias, Bull. Com. géol. St. Petersbourg, XXVIII. 1909, No. 156, p. 87. — Steinmann, Marine Trias in Peru, Zentralbl. f. Min. 1909, p. 617. — v. Wittenburg, Sur la forme caractér. de Pseudomon. du Caucase etc. Bull. Acad. sci. St. Petersbourg 1913, p. 485. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, XCII. 1915, p. 26, Taf. IV. fig. 7. — Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London LXXIII. 1917, p. 193, Pl. XIX. fig. 1—8.
Sibirien, Insel Kotelny, Japan, Neuseeland, Alaska, Peru, Spitzbergen, Krym, Norisch.
- Ps. ochotica** (Keyserl.) var. *ambigua* Teller, l. c. p. 121, Taf. XVIII. fig. 3, 5. — Trechmann, Trias of New Zealand, l. c. p. 194, Pl. XIX. fig. 2.
Nordsibirien, Neuseeland, Norisch.
- Ps. ochotica** (Keyserl.) var. *acuteostata* Trechmann, Trias of New Zealand, l. c. p. 194, Pl. XIX. fig. 7.
Neuseeland, Norisch.
- Ps. ochotica** (Keyserl.) var. *densistriata* Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, l. c. p. 119, Taf. XVII. fig. 7, 8, 13, 14, XVIII. fig. 9, 10 [Monotis subcircularis Gabb, Description triass. foss. California, Palaeontology, Vol. I. 1864, p. 31, Pl. VI. fig. 29, 29a inclus.]. — Smith, Pelecypodenzenen in d. Trias Nordamerikas, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 694 (Ps. subcircularis). — Renz, Halobien u. Daonellen aus Griechenland, N. Jahrb. f. Min. 1906, l. p. 39, Taf. III. fig. 6, 8 [Monotis salinaria Rothpletz, Perm-, Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Palaeontograph. XXXIX. 1892, p. 91, Taf. XIII. fig. 1—3 inclus.]. — Wanner, Triaspref. d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 189, Taf. VII. fig. 9 [Monotis salinaria Rothpletz, l. c. inclus.]. — Frech, Circumpazifische Trias, Lethaea mes. I/4, 1908, Taf. LVIII. fig. 2. — Boehm, Triasverst. vom Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 6, Taf. I. fig. 9. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, XCII. 1915, p. 27, Taf. IV. fig. 5. [Ps. subcircularis (Gabb) v. Wittenburg, Sur la forme caractér. de Pseudomon. du Caucase etc. Bull. Acad. sci. St. Petersbourg, 1913, p. 485, Pl. I. fig. 5, 7 et Ps. subcircularis var. kaldjakensis v. Wittenburg, l. c. p. 483, Pl. I fig. 6 inclus.]. — Trechmann, Trias of New Zealand, l. c. p. 194, Pl. XIX. fig. 1.
Ins. Kaldjak, Alaska, Californien, Japan, Nordsibirien, Peru, Indonesien, Neuseeland, Norisch.
- Ps. ochotica** (Keyserl.) var. *eurhachis* Teller, l. c. p. 120, Taf. XVIII. fig. 1. — Diener, Japanische Triasfaunen l. c. p. 29, Taf. III. fig. 3, IV. fig. 6—8. — Trechmann, Trias of New Zealand, l. c. p. 194, Pl. XIX. fig. 5.
Nordsibirien, Japan, Neuseeland, Norisch.
- Ps. ochotica** (Keyserl.) var. *pachypleura* Teller, l. c. p. 121, Taf. XVIII. fig. 2, 4. — Trechmann, Trias of New Zealand, l. c. p. 194, Pl. XIX. fig. 3.
Nordsibirien, Neuseeland, Norisch.
- Ps. ochotica** (Keyserl.) var. *sparsicostata* Teller, l. c. p. 120, Taf. XVII. fig. 11. — Frech, Circumpazifische Trias, Lethaea mes. I/4, 1908, Taf. XLVIII. fig. 3a, b (non c = Ps. ochotica forma typ.). — Trechmann, Trias of New Zealand, l. c. p. 194, Pl. XIX. fig. 4.
Nordsibirien, Neuseeland, Norisch.

- Ps. ovata* Salomon (1895) vide *Ps. (Claraia) aurita*.
- Ps. Pealei* White, Triass. foss. of SE. Idaho, XII. Ann. Rep. U. S. Geol. a. Geogr. Surv. Terr. Pt. I. 1883, p. 109. — Smith, Pelecypodenzenen i. d. Trias Nordamerikas, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 690.
- Idaho, Skythisch.
- Ps. plicatuloides* Mansuy, Paléontol. du Yunnan orient. Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 129, Pl. XXIV. fig. 5.
- Yunnan, Obertrias (?).
- Ps. pygmaea* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 78, Taf. VII. fig. 21 (Avicula). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXV. 1865, p. 51, Taf. XVI. fig. 11 (syn. exclus.). [Monotis]. — v. Zittel, Handbuch d. Palaeozool. II. 1881, p. 34. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abh. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 75, Taf. VIII. fig. 28.
- Südalpen, Karnisch.
- Ps. Ratzensis* v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 30 (278), Taf. IV (XXXIX), fig. 8, 9.
- Südalpen, Skythisch.
- Ps. reticulata* (v. Richthofen) v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 30 (278), Taf. II. (XXXVII), fig. 8, 9.
- Südalpen, Skythisch.
- Ps. Richmondiana* v. Zittel, Foss. Moll. etc. von Neuseeland, Reise d. österr. Fregatte Novara etc. Geol. Teil, I/2, Palaeontol. v. Neuseeland 1864, p. 26. Taf. IV. fig. 1. — Pirotet, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 327. — v. Wittenburg, Sur la forme caractér. de Pseudomon. du Caucase etc. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1913, p. 468. — Frech, Circumpaz. Trias, Lethaea mes. I/4, 1908, Taf. XLVIII. fig. 4a, b (fig. 4c, d = var. truncata). — Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LXXIII. 1917, p. 194, Pl. XIX. fig. 9.
- Neuseeland, Neu-Caledonien, Norisch.
- Ps. saxorum* v. Wittenburg, Lamellibr. d. Salt Range, N. Jahrb. f. Min. 1909, I. p. 11, Taf. III. fig. 5.
- Salt Range, Skythisch.
- Ps. scutiformis* Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 125, Taf. XIX. fig. 3. — v. Wittenburg, Triasfoss. vom Fl. Dulgolach, Trav. Musée géol. Pierre-le Grand, Acad. sci. St. Pétersborg, Taf. V. fig. 9—11.
- Nordsibirien, Norisch.
- Ps. spinicosta* v. Wittenburg, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeontol. d. Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 76, Textfig. 6, 7. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 28 (276), Taf. III. (XXXVIII), fig. 8, 9.
- Südalpen, Skythisch.
- Ps. striatoplicata* v. Hauser, Über d. von Bergrat Fuchs gesamm. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 11, Taf. III. fig. 11 (Avicula). — Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ab-lagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 713.
- Südalpen, Skythisch.
- Ps. subcircularis* (Gabb) Smith (1902), v. Wittenburg, (1913) vide *Ps. ochotica* var. *densestriata*.
- Ps. sublaevis* Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 125 Taf. XIX. fig. 2.
- Nordsibirien, Norisch.

- Ps. tenuistriata* Bittner (1898) vide *Ps. (Eumorphotis) Telleri* var. *tenuistriata*.
- Ps. Tolmatschewi** v. Wittenburg, Triasfoss. v. Spitzbergen, Trav. Musée géol. Pierre-le Grand Acad. sci. St. Pétersbourg, IV. 1910, p. 35, Taf. I. fig. 2, 3. Spitzbergen, Karnisch.
- Ps. (?) tridentina** Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. Agiati Rovereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 82, Tav. I. fig. 6. Südalpen, Ladinisch.
- Ps. Zeuschneri** Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 9, Taf. XVI. fig. 1. (Avicula). — v. Hauer, Über d. von Bergrat Fuchs ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 9, Taf. III. fig. 3, 4. (Avicula). — Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 713. non *Ps. Zeuschneri* v. Schaueroth (1859) = *Ps. (Eumorphotis) Schauerothi*. Südalpen, Skythisch.
- Ps. Zittelii** Telleri, Pelecypodenfauna v. Werchojanssk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 127, Taf. XIX. fig. 10. Nordsibirien, Norisch.
- Ps. sp. ind.** Bittner, Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 716, Taf. XV. fig. 8 vide *Ps. (Eumorphotis) squamosa*.

Subgen. **Claraia** Bittner.

Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900. p. 568.
Typ. Posidonomya Clarii Emmerich (1844).

- Cl. aurita** v. Hauer, Über d. von Bergrat Fuchs in d. Venetianer Alpen gesammelten Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 12, Taf. III. fig. 5, 7 (caet. exclus.) [Posidonomya] (Pos. Becheri Catullo, Mem. geo-pal. Alpi Ven. 1847, p. 53, Tav. II. fig. 4 inclus.). — Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 587, Taf. XXIV. fig. 10—12 [? Posid. ovata Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. im Vicentin. Sitzber. Akad. Wien, XXXIV. 1859, p. 316, Pseudomon. ovata Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 80, Taf. IV. fig. 42, Posidon. Haueri Tommasi, Fauna Trias infer. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 52, Tav. III. fig. 10 inclus.]. — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonywaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 82. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten, ibidem. 1907, p. 19, Taf. VI. fig. 1—4. — Simionescu, Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 160. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 25 (237), Taf. II (XXXVII). fig. 13, 14, III (XXXVIII). fig. 1. — Simionescu, Fauna trias. inf. din Dobrogea, Acad. Romana, Publ. Adamachi, Bourcaren, V. 1911, p. 66. — Diener, Mediterr. Faunenelemente in d. Otoceras beds d. Himalaya, Zentralbl. f. Min. 1912, p. 59. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 42, Pl. V. fig. 9.

Südalpen, Nordalpen, Bakony, Dobrudscha, Himalaya, Skythisch.
Cl. cf. aurita (Hau.) v. Wittenburg, Untertriad. Aufsammlungen an d. Teplaia, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1911, p. 1084.

Sibirien (Gouv. Jenisseisk), Skythisch.

- Cl. Clarii** Emmerich, in Leonhards Taschenbuch, 1844, p. 793 (Posidonomya). — v. Hauer, Über d. von Bergrat Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien,

II. 1850, p. 4, 11, Taf. I. fig. 9, III. fig. 1, 2 [Posid. radiata Catullo], Mem. geo-pal. Alpi Venete, 1846, p. 54, Taf. II. fig. 5 inclus.]. — Eichwald, Geogn. Ausflug nach Tirol, Nouv. Mém. Soc. Natur. Moscou, IX. 1851, P. II. fig. 2 (Posidonomya). — Bronn, Lethaea geogn. III/b, 1856, p. 59, Taf. XII/I, fig. 9 (Posidonomya). — v. Schaurroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin. Sitzber. Akad. Wien, XXXIV. 1859, p. 313 Taf. II. fig. 11 (Posidonomya). — Loppius, Das westliche Südtirol, 1878, p. 348, Taf. I. fig. 1. (Avicula). — Tommasi, Il Trias infer. delle nostre Alpi, 1882, p. 61, Taf. I. fig. 7 (Monotis). — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 80, Taf. IV. fig. 41. — Tommasi, Fauna trias. infer. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 50, Taf. III. fig. 7 (Avicula). — Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 583, 585, Taf. XXIV. fig. 14, 15. — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakony, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 82. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 3, 4. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten, Pal. Balaton, I/1, 1907, p. 24, Taf. III. fig. 5, 6. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 25 (273), Taf. III (XXXVIII). fig. 2.
Nordalpen, Südalpen, Bakony, Dinariden, Skythisch.

Cl. *decidens* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lamellibr. p. 11, Pl. I. fig. 22—24. — Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 43, Pl. V. fig. 14.

Himalaya, Skythisch.

Cl. *Griesbachi* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lamellibr. p. 2, Pl. I. fig. 4. — Bittner, Über Ps. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 578. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Balaton, I/1, 1907, p. 21, Taf. VI. fig. 5. — Mansuy, Contribut. à la carte géol. de l'Indochine, Serv. d. Mines, Paléontol. Hanoi-Haiphong, 1908, p. 63, Pl. XVI. fig. 4, 5. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 41, Pl. V. fig. 8.

Himalaya, Indochina, Bakony, Skythisch.

Cl. *intermedia* Bittner, Über Ps. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 585, Taf. XXIV. fig. 13 [Nom. nov. pr. Posidonomya aurita v. Haue r, Über d. von Bergrat Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, Taf. III. fig. 6, Pos. innom. v. Haue r, ibidem, p. 12, Taf. III. fig. 9 inclus.]. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 26 (274), Taf. III (XXXVIII), fig. 3—5.

Südalpen, Skythisch.

Cl. *orbicularis* v. Richthofen, Geognost. Beschreibung d. Umgegend v. Predazzo, St. Cassian u. d. Seiseralpe, 1860, p. 55. (Posidonomya). — Bittner, Über Ps. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 588, Taf. XXIV. fig. 16—20. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 26 (274), Taf. II (XXXVII), fig. 12.

Südalpen, Skythisch.

Cl. *Painkhandana* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lamellibr. p. 5, Pl. I. fig. 5. — Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 43, Pl. V. fig. 10.

Himalaya, Skythisch.

Cl. *Punjabiensis* v. Wittenburg, Lamellibr. d. Salt Range, N. Jahrb. f. Min. 1909, I, p. 11, Taf. III. fig. 3.

Salt Range, Skythisch.

Cl. *Stachei* Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 587 (deest imago).

Südalpen, Skythisch.

- C. tridentina** Bittner, Über Ps. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 589, Taf. XXIV. fig. 1—9.
Südalpen, Skythisch.

Subgen. **Eumicrotis** Meek.

Remarks on the fam. Pteriidae (Aviculidae), with deser. of some new genera, Amer. Journ. of sci. a. arts, ser. 2, Vol. XXXVII. Newhaven, 1864, p. 212. — Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 567.

- E. arctica** Böhm, Triasverst. vom Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 7, Taf. I. fig. 10. Spitzbergen, Karnisch (?).

- E. spitzbergensis** Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 27, Taf. II. fig. 10—13. — Böhm, Triasverst. vom Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 7. Bäreninsel, Spitzbergen, Karnisch, Norisch.

Subgen. **Eumorphotis** Bittner.

Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900. p. 566.

Typ. Pseudomonotis Telleri Bittner (1898).

- E. angulata** Leptius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 351, Taf. I. fig. 2 (Avicula).

Südalpen, Skythisch.

- E. artus** Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 27, Taf. II. fig. 9, 16, 18. Bäreninsel, Karnisch.

- E. Aueri** v. Wittenburg, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. d. Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 76, Textfig. 8. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 28 (276), Taf. III. fig. 11.

Südalpen, Skythisch.

- E. austriaca** Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 572, Taf. XXII. fig. 9.

Nordalpen, Skythirsh.

- E. sp. ind. aff. austriacae** (Bittn.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 45, Pl. V. fig. 12. Himalaya, Skythirsh.

- E. Benecke** Bittner, Über Ps. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 574, Taf. XXIII. fig. 5. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 29 (277), Taf. IV. (XXXIX) fig. 1.

Südalpen, Skythirsh, Anisisch.

- E. Dieneri** v. Wittenburg, Lam. d. Salt Range, N. Jahrb. f. Min. 1909, I. p. 9, Taf. II. fig. 1.

Salt Range, Skythirsh.

- E. Fuchsii** v. Hauser, Über d. v. Bergrat Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II, 1850, p. 4, Taf. I. fig. 8 (Pecten). — Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 713.

Südalpen, Skythirsh.

- E. hinnitidea** Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 716, Taf. XV. fig. 8—10. — Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 87, Taf. IX. fig. 47—56. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichfen etc. Pal. Balaton, 1907, p. 27, Taf. IV. fig. 4.

Bokhara, Bakony, Skythirsh.

- E. hinnitidea* (Bittner) var. *minor* Frech, Nachtr. zu Cephal.
u. Zweischalern d. Bakony, Pal. Balaton, 1905, p. 4, Textfig. 3.
Bakony, Skythisch.
- E. illyrica* Bittner, Lamellibr. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI,
1901, p. 227, Taf. VII. fig. 13, 14. Südalpen, Ladinisch.
- E. cf. illyrica* Mansuy, Etude géol. du Yunnan orient. Paléont.
Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 120, Pl. XXI. fig. 10.
Yunnan, Karnisch.
- E. inaequicostata* Benecke, Über einige Muschelkalkablagerungen d.
Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 21, Taf. I. fig. 5, 6 (Avicula).—
Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr.
D. G. G. L. 1898, p. 612. — Bittner, Beitr. z. Palaeontol.
triad. Ablag. zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII.
1898, p. 713, Taf. XV. fig. 5, 6. — v. Arthaber, Alpine
Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 5. — Frech,
Leitfoss. d. Werfener Schichten, Pal. Balaton, 1907, p. 26, Taf. IV.
fig. 1, 2. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols,
Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 28 (276),
Taf. III (XXXVIII), fig. 10. Südalpen, Bakony, Skythisch.
- E. Iwanowi* Bittner, Verst. d. Süd-Ussuri Geb. Mém. Com. géol.
St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 8, Taf. I. fig. 1—9. — v.
Wittenburg, Geol. Studien im Golf Peters d. Großen,
N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXVII. 1909, p. 534, Taf. IX. fig. 1,
2, X. fig. 3, 5. Ussuribucht, Skythisch.
- E. sp. ind. ex aff. Iwanowi* (Bittn.) Smith, Pelecypodenzonen
in d. Trias Nordamerikas, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 490.
California, Skythisch.
- E. Kittlpii* Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L.
1900, p. 572, Taf. XXIII. fig. 1, 2. Dinariden, Südalpen, Skythisch.
- E. Koken* v. Wittenburg, Neue Beitr. z. Palaeontol. u. Geol.
d. Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 75,
Textfig. 5. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols,
Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908,
p. 27 (275), Taf. IV. (XXXIX), fig. 5. Südalpen, Skythisch.
- E. laezkoi* Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes
Pal. Balaton, 1901, p. 88, Taf. IX. fig. 33—41. — Frech,
Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Balaton 1907, p. 22,
Taf. VI. fig. 7. Bakony, Skythisch.
- E. leptopleura* v. Wittenburg, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. d.
Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 77,
Textfig. 9. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols,
Koken's Geol. u. Pal. Abh. N. F. VIII/5, 1908, p. 30
(278), Taf. III (XXXVIII), fig. 13. Südalpen, Skythisch.
- E. Lipoldi* Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R.
A. L. 1900, p. 576, Taf. XXIII. fig. 4. Südalpen, Skythisch.
- E. loezyli* Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Babonyerwaldes
Pal. Balaton, I/1, 1901, p. 89, Taf. IX. fig. 28—32. — Frech,
Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 22, Taf. VI.
fig. 6. Bakony, Skythisch.
- E. multiformis* Bittner, Verst. d. Süd-Ussurige. Mém. Com.
géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 10, Taf. II. fig. 11—22. —
Diener, Meditarr. Faunenelemente in d. Otoceras beds d.
Himalaya, Zentralbl. f. Min. 1912 p. 59. — Diener, Triass.
fauna of Kashmir. Pal. Ind. new ser.. Vol. V. No. 1 1913, p. 44,
Pl. V. fig. 13. — Mansuy, Foss. terr. més. Sam Nena, Mém.
Serv. géol. Indochine, VII/1. Ussuribucht, Himalaya, Indochina, Skythisch.

- E. *Schaurothi*, nom. nov. pr. *Avicula Zeuschneri* v. *Schauroth*, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin. Sitzber. Akad. Wien, XXXIV. 1859, p. 318, Taf. II. fig. 12, cf. *Bittner*, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 713. Südalpen, Skythisch.
- E. *squamosa* *Frech*, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Balaton, 1907, p. 27, Taf. IV. fig. 5, 6 [Pseudomon. sp. ind. *Bittner*, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 716, Taf. XV fig. 8 inclus.]. Bakony, Bokhara, Skythisch.
- E. *Taramellii Tommasi*, Il Trias inf. delle nostre Alpi, 1882, p. 59, Tav. I. fig. 3 (non 3b) [Avicula]. — *Tommasi*, Fauna del Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 51, Tav. III. fig. 8 (Avicula). — *Bittner*, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 569. Südalpen, Skythisch.
- E. *Telleri* *Bittner*, Beitr. z. Pal. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 710, Taf. XV. fig. 11—15. — *Bittner*, Über Pseudomon. Telleri etc. ibidem, L. 1900, p. 568, Taf. XXII. fig. 1—5. — *Philipp*, Pal. Untersuchg. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 55, Taf. II. fig. 8—15 [Ps. cf. *Telleri* *Bittner*, Über Ps. Telleri etc. l. c. p. 570, Taf. XXII. fig. 7, 8, 10, Pseudomon. camuna Salomon. Über Pseudomon. u. Pleuronectites, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 359, Taf. XIV. fig. 4 inclus.]. — *Frech*, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Balaton, 1907, p. 22, Taf. II. fig. 3, 4. Nordalpen, Südalpen, Bakony, Bokhara, Skythisch.
- E. *Telleri* var. *asperata* *Bittner*, Über Pseudomon. Tellari etc. l. c. p. 570, Taf. XXII. fig. 6 (E. *asperata*). — *Philipp*, Pal. Untersuchg. Predazzo, l. c. p. 56. Südalpen, Skythisch.
- E. *Telleri* var. *tenuistriata* *Bittner*, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen Zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 711, Taf. XV. fig. 7 (E. *tenuistriata*). — *Philipp*, Pal. Untersuchg. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 56. — *Dienker*, Mediterr. Faunenelemente in d. Otoceras beds d. Himalaya, Zentralbl. f. Min. 1912, p. 59. — *Dienker* Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 44, Pl. V. fig. 11. Bokhara, Himalaya, Südalpen, Skythisch.
- E. sp. ind. ex aff. *Telleri* (*Bittn.*) *Waggon*, Werfener Schichten i. d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 286. Salt Range, Skythisch.
- E. sp. ind. aff. *Telleri* (*Bittn.*) *Salomon*, Über Pseudomon. u. Pleuronectites, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 358, Taf. XIV. fig. 3. — *Salomon*, Die Familienzugehörigkeit d. Pleuronectiten, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 21. — *Philipp*, Pal. Untersuchg. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 57. Südalpen, Skythisch.
- E. *Tschernyschewi* v. *Wittenburg*, Triasfoss. v. Spitzbergen, Trav. Mus. géol. Pierre-le-Grand. Acad. sci. St. Pétersbourg, IV. 1910, p. 34. Taf. I. fig. 1. Spitzbergen, Karnisch.
- E. *vagans* *Böhm*, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 29, Taf. II fig. 17, 24. Bäreninsel, Karnisch.
- E. *variabilis* *Böhm*, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 28, Taf. II. fig. 19, 23. Bäreninsel, Karnisch.

E. *Venetiana* v. Hauer, Über d. von Bergrat Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 2, Taf. I. fig. 1—3 (Avicula). — Benecke, Über einige Muschelkalkablagerungen d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 11, Taf. I. fig. 19 (Avicula). — Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 351. —omboni, Foss. trias. del Veneto, Atti Ist. Veneto sci. etc. Vol. VIII. ser. 5, 1882, p. 10 [Lima gibbosa Catullo (non Sowerby), Mem. geo. pal. Alpi Venete, 1848, p. 239, Tav. I. fig. 1 inclusus.] (Avicula). — Tommasi, Il Trias infer. delle nostre Alpi, 1882, p. 58, Tav. I. fig. 2 (Avicula). — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 79, Taf. IV. fig. 40 (Avicula?). — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 48, Tav. III. fig. 6 (Avicula). — Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentral-asiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 712, Taf. XV. fig. 2—4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 6. — Simionescu, Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verhandl. G. R. A. 1908, p. 160. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 29 (277), Taf. III (XXXVIII), fig. 7. — Simionescu, Fauna trias. infer. Dobrogea, Acad. Romana, Adamachi, Bouacrest, V. 1911, p. 65, Textfig. 2. — Diener, Die marinen Reiche d. Trias per. Denkschr. Akad. Wien, XCII. 1915, p. 449.

Südalpen, Dobrudscha, Kaukasus, Skythisch.

E. cf. *Venetiana* (v. Hauer) v. Wittenburg, Werfener Schichten v. Spitzbergen. Bhll. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1912, p. 947. Spitzbergen, Skythisch.

E. sp. ind. aff. *Venetianae* (Hauer) Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lamellibr. p. 6, Pl. I. fig. 8. Himalaya, Skythisch.

E. *Waageni*, v. Wittenburg, Lamellibr. d. Salt. Range, N. Jahrb. f. Min. 1909, I. p. 10, Taf. III. fig. 1. Salt Range, Skythisch.

E. sp. ind. Bittner, Über Pseudomon. Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 577, Taf. XXIII. fig. 3. Südralpen, Skythisch.

Gen. **Rhynchopterus** Gabb.

Palaeontol. of California, I. 1864, p. 31.

Typ. *Rh. obesus* Gabb (1864).

Rh. obesus Gabb, I. c. p. 32, Pl. V. fig. 30. Nevada,?

Rh. perna Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 30, Taf. IV. fig. 12. Bäreninsel, Karnisch.

Fam. Monotidae Kittl.

Gen. **Monotis** Bronn.

Muschelverst. d. süddeutsch. Steinsalzgeb. etc. Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. I. 1830, p. 279. — Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 106. — Neumann, Beitr. zu einer morphol. Einteilung d. Bivalven, Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 1891, p. 739. — Renz, Über Halobien etc. aus Griechenland, Jahrb. f. Min. 1906, I. p. 40. — Typ. *Monotis salinaria* Bronn (1830).

M. Alberti Goldfuss (1838), v. Eck (1865), Nöetling (1880),
Tommasi (1894) vide Pecten (Velopecten) Albertii.

M. barbata Schafhäutl (1853) vide Pecten (Chlamys) Valoniensis.

M. (an *Pseudomonotis*?) *Boreas* Öberg, Om Trias först. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Haddl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877, p. 17, Taf. V. fig. 5. — *Teller*, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 107 (*Pseudomonotis*). — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 168.

Spitzbergen, Anisisch.

M. Clarai Tommasi (1882) vide *Pseudomonotis* (*Claraia*) Clarai.
M. dalmatina Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 173, Taf. X. fig. 22.

Dinariden, Karnisch.

M. digona Kittl, Halobiidae etc., Pal. Balaton, 1912, p. 174, Taf. X. fig. 16—18.

Nordalpen, Norisch.

M. (?) *Iligera* Lindström, Om Trias och Juraförst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. VI/1, Stockholm, 1865, p. 7 (deest imago). — *Teller*, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 107 (*Pseudomonotis*).

Spitzbergen, Anisisch.

M. Haueri Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 171, Taf. X. fig. 7—9. [*M. salinaria* M. Hoernes, Gastropoden u. Acephalen d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 50, Taf. II, fig. 14, Rothpletz, Perm-Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 91, Taf. XIII. fig. 1—3 (non, teste Renz 1906, Wanner 1907), Vredenburg, Occurrence of a species of *Halorites* in Baluchistan, Rec. Geol. Surv. India, XXXI. p. 168, Pl. XVII. fig. 1, Diener, Upper triassic faunae of the Pishia district, ibidem, XXXIV, 1908, Pl. III. fig. 1, caet. exclus. inclus.]

Nordalpen, Ostkarpathen, Himalaya, Indonesien, Norisch.

M. cf. Haueri Kittl, l. c. p. 172. Typ. *M. salinaria* Bukowski, Verh. G. R. A. 1896, p. 105 (deest imago).

Dinariden, Karnisch.

M. limaeformis Gemmellaro, Sul Trias della reg. occid. della Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 471, Tav. V. fig. 8—10. — De Lorenzo, Foss. Trias medio di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 13, 130. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 175.

Sizilien, Basilicata, Karnisch.

M. lineata M. Hoernes, Gastr. u. Aceph. d. Hallst. Kalke, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 51, Taf. II. fig. 15. — Bittner, Zwei neue Fundorte v. Monotis in Niederösterr. Verh. G. R. A. 1891, p. 272. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 173, Taf. X. fig. 19—21.

Nordalpen, Norisch.

M. Lommeli Salter (1865) vide *Daonella indica*.

M. megalota v. Mojsisovics, Über einige Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 435, Taf. XIV. fig. 1. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 175.

Dinariden, Obertrias.

M. pygmaea Laubé (1865) vide *Pseudomonotis* (?) *pygmaea*.

M. rufis Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occid. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 470, Tav. V. fig. 5—7. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 173, Taf. X. fig. 12—15.

Nordalpen, Norisch. — Dinariden, Sizilien, Karnisch.

M. salinaria Brönn, Über d. Muschelverst. d. süddeutsch. Salzgeb. etc. Leonhard u. Brönn's Jahrb. f. Min. I. 1830, p. 279, Taf. IV. fig. 1. — Goldfuß, Petref. Germ. II. 1838, p. 139, Taf. CXXI. fig. 2 (M. inaequivalvis Brönn, ibidem, p. 140, Taf. CXXI. fig. 2a inclus.). — d'Orbigny, Prodrome etc. I. 1849, p. 200 (Avicula). — Medlicott and Blanford, Manual geol. of India, II. 1879, p. 637, Pl. II. fig. 6. — Bittner, Zwei neue Fundorte v. Monotis in Niederösterr. Verh. G. R. A. 1891, p. 272. — Teller, in Süsses. Beitr. zur Stratigraphie Zentralasiens, Denkschr. Akad. Wien, LXI, 1894, p. 460. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/00, p. 22. — Vogel, Beitr. z. Kenntn. d. mesozoischen Format. auf Borneo, Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, VII/2, 1904, p. 217, Taf. VIII. — Diener, Notes on an upper triass. fauna from the Pishin district, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 13, Pl. II. fig. 2, 3 (non fig. i = M. Haueri Kittl). — v. Arthaber, Lethaea mes. I/3, Alpine Trias, 1906, Taf. XLIX. fig. 2. — Wanner, Triaspetrofakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 190, Taf. IX. fig. 2—4. — Frech, Leitfoss. Werfener Schichten etc. Pal. Balaton, 1907, p. 23. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3. Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 128, Pl. XXII. fig. 3—6. — Kittl, Halobiidae, etc. Pal. Balaton, 1912, p. 169, Taf. X. fig. 1—6. — Teller, in Tietze, Verh. G. R. A. 1912, p. 15. — v. Wittenburg, Sur la forme caractér. de Pseudomon. du Caucase etc. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1913, p. 486. — Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LXXXIII. 1917, p. 195, Pl. XIX. fig. 10.

Nec **M. salinaria** M. Hoernes (1855), Rothpletz (1892), Vredenburg (1904 = M. Haueri, teste Kittl, l. c. p. 171).
Nordalpen, Südalpen, Pamir, Baluchistan, Himalaya,
Indonesien, Neuseeland, Norisch.

M. salinaria Rothpletz (1892) vide **M. Haueri** Kittl an Pseudomonotis ochotica var. densistriata.

M. salinaria var. **hemisphaerica** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Sec. LXXXIII. 1917. p. 195, Pl. XX. fig. 2.

Neuseeland, Norisch.

M. salinaria var. **intermedia** Trechmann, l. c. p. 195, Pl. XX. fig. 1.

Neuseeland, Norisch.

M. salinaria var. **richmondiana** Zittel (1864) vide Pseudomonotis richmondiana.

M. Stoppanii Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 471, Tav. V. fig. 1—3. — Scalia, Fauna del Trias sup. del Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 51. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 175. Sizilien, Karnisch.

M. subcircularis Gabb (1864), Kittl (1912) vide Pseudomonotis ochotica var. densistriata.

M. tenuicostata Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 172, Taf. X. fig. 10.

Nordalpen, Norisch.

M. (an Pseudomonotis ?) sp. ind. Lindström, Om Trias och Juraförst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, p. 7, Taf. I. fig. 17. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 167 Anm.

Spitzbergen, Anisisch.

Fam. Halobiidae Kittl.

Gen. **Amonotis** Kittl.

Geol. v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 736. — Kittl,
Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 163.

Typ. *A. cancellaria* Kittl (1903).

A. cancellaria Kittl, Sarajevo, l. c. p. 736, Textfig. 47. — Kittl,
Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 165, Textfig. 37.

Dinariden, ?

A. Rothpletzi Wanner, Triaspetrefakten d. Molukken, N. Jahrb.
f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 193, Taf. VIII. fig. 10, IX. fig. 1,
Indonesien, Obertrias.

Gen. **Daonella** v. Mojsisovics.

Über Halobia u. Daonella, Abhandl. G. R. A. VII. 1874, p. 7. —
Neumayr, Beitr. zu einer morpholog. Einteilg. d. Bivalven,
Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 1891, p. 738. — Frech, Leitfoss.
d. Werfener Schichten etc. Pal. Balaton, 1907, p. 9. — Kittl,
Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 29.

Typ. *Halsbia Lommeli* Wissmann (1841).

D. Anastasiui Kittl, Triasbildungen d. nordöst. Dobrudscha,
Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 484, Taf. I. fig. 8.
Dobrudscha, Ladinisch.

D. (?) aperta Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 57,
Taf. VIII. fig. 19.

Bakony, Karnisch.

D. arctica v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl.
G. R. A. VII. 1874, p. 21, Taf. II. fig. 4. — Kittl, Halobiidae
etc. Pal. Balaton, 1912, p. 65. Spitzbergen, Anisisch.

D. Arzelensis Kittl, Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 47,
Taf. III. fig. 13.

Nordalpen, Ladinisch.

D. badiotica v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl.
G. R. A. VII. 1874, p. 15, Taf. I. fig. 9. — Kittl, Mono-
graphie d. Halobiidae etc. Pal. Balaton, 1912, p. 47.
Südalpen, Ladinisch.

D. Bergeri v. Mojsisovics (1874), Tornquist (1903) vide
Dipleurites Bergeri.

D. Beyrichi v. Mojsisovics (1874) vide Halobia Beyrichii.

D. Boekhi v. Mojsisovics, Über Halobia u. Daonella Abhandl.
G. R. A. VII/2, 1874, p. 8, Taf. III. fig. 15. — Kittl, Halobiidae
etc. Pal. Balaton, 1912, p. 32, Taf. I. fig. 3—5 [D. obsoleta
v. Mojsisovics, l. c. p. 9, Taf. III. fig. 14, 16, 17 inclus.].
Bakony, Anisisch.

D. bulogensis Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 43, Taf. III.
fig. 5—10 (var. multipartita, l. c. p. 44, Taf. III. fig. 11 inclus.).
Dinariden, Nordalpen, Ladinisch.

D. cassiana v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl.
G. R. A. VII/2, 1874, p. 10, Taf. I. fig. 13 (fig. 2, 3 exclus =
Halobia styriaca, teste Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal.
Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a Lamellibr. p. 35). —
Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A.
XVIII/1, 1895, p. 78, Taf. IX. fig. 16. — Kittl, Halobiidae etc.
Pal. Bal. 1912, p. 58, Taf. IV. fig. 1.

non *D. cassiana* Renz, Halobien etc. aus Griechenld. Neues
Jahrb. f. Min. 1906, I. p. 33, Taf. III. fig. 4—7 [= ? D. vel Hal.
Wichmanni Rothpl., teste Kittl, Halobiidae, l. c. p. 59].
Südalpen, Karnisch.

D. cf. cassiana Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895,
p. 115, Taf. V. fig. 9, 10.

Südalpen, Ladinisch.

- D. sp. ind. aff. *cassianae* (Mojs.) Dierer, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 1, 1908, Ladinic, earnic a. noric faunae of Spiti, p. 11, Pl. III. fig. 9. Himalaya, Ladinisch.
- D. *deseccata* (Schafhäutl) Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 83. Nordalpen, Ladinisch.
- D. *dubia* Gabb, Pal. of California, I. 1864, p. 30, Pl. V. fig. 28 (Halobia). — v. Mojsisovics, Über Daonella etc. Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 22 [Hal. Lommeli Lindström, Svenska Vet. Akad. Handl. VI/6, 1865, Taf. II. fig. 8, caet. exclus. inclus.]. — Smith, Pelecypodenzenen i. d. Trias Nordamerikas, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 693 [? = D. paucicostata Tornquist, D. Lommeli Meek, Whiteaves inclus.] Nevada, Spitzbergen (?), Anisisch.
- D. *elongata* v. Mojsisovics, Über Daonella etc. Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 13, Taf. II. fig. 9. — Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1913, p. 76, 177, Texfig. 37. Südalpen, Anisisch.
- D. *esinensis* Salomon, Marmolata, Palaontogr. XLII. 1895, p. 114, Taf. IV. fig. 47—49 (Halobia). — Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 67, Taf. II. fig. 10—12. Südalpen, Nordalpen, Bakony, Ladinisch.
- D. fluxa* v. Mojsisovics (1874) vide Halobia fluxa.
- D. *Frami* Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arctic exped. No. 7, 1907, p. 13, Taf. I. fig. 5, 6. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 55. Ellesmereland, Karnisch.
- D. *franconica* (Sandberger) Tornquist, Daonellen d. deutsch. Muschelkalkes, Neues Jahrb. f. Min. 1903, II. p. 84, Taf. I. fig. 1, 2. — Tornquist, Außeralpine Trias auf d. Balearen, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVI. 1908, p. 909. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 73. Deutschland, Balearen, Muschelkalk.
- D. *gaderana* Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 64, Taf. II. fig. 13—15 (var. *pseudoarctica* Kittl, l.c. p. 65, Taf. II. fig. 16 inclus.). Südalpen, Anisisch.
- D. *de Geeri* Böhm, Triasverst. v. Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 9, Taf. I. fig. 13—15, Textfig. 3. Spitzbergen, Ladinisch.
- D. *gosaviensis* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 34, Taf. I. fig. 32. Nordalpen, Norisch.
- D. *grabensis* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 75, Taf. II. fig. 17. Dinariden, Anisisch.
- D. Guembeli* v. Mojsisevics (1872), Tommasi (1894) vide Enteropleura Guembeli.
- D. *hagighiolensis* Kittl, Triasbild. d. NO. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 483, Taf. I. fig. 6, 7. Dobrudscha, Ladinisch.
- D. *hungarica* v. Mojsisovics, Über Daonella etc. Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 18, Taf. II. fig. 19. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 40, Taf. IV. fig. 2. Bakony, Anisisch, Ladinisch.
- D. *imperialis* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 56, Taf. V. fig. 3, 4. Nordalpen, Norisch.
- D. *indica* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 39, Pl. VII. 4—11 (Monotis Lommeli Salter, Palaeontol. of Niti, 1865, p. 68, Pl. IX. fig. 1 inclus.). — v. Krafft Exotic blocks of Malla Johar, Mem. Geol. Surv. India, XXXII. 1902, p. 142. — Wanner, Triasprefaktien d. Molukken, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV.

- 1907, p. 202, Taf. IX. fig. 8, 9, X. fig. 2, 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. Pt. 3, Ladinic, carnic a. norric faunae of Spiti, 1908, p. 11, Pl. III. fig. 6, 7, 10. — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, 1908, p. 3 Pl. VIII. fig. 1. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatoerinus limest. p. 30. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 48, Taf. IV. fig. 10, 11, IX. fig. 23. — v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Öst. XXVII. 1915, p. 191. — Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 196, Pl. XX. fig. 7, XXI. fig. 5 Himalaya, Ladinisch, karnisch. — Indonesien, Karnisch. — Dinariden, Karnisch. — Nordalpen, Bakony, Ladinisch. — Anatolien, Ladinisch. — Neuseeland, Ladinisch.
- D. cf. indica** (Bittn.) Kittl, l. c. p. 50, Textfig. 9, 10.
Nordalpen, Ladinisch?
- D. Kotoi v. Mojsisovics**, Über ein. japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 174, Taf. II. fig. 3. — Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 74. Japan (Shikoku), Ladinisch.
- D. lamellosa** Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 84, Taf. X. fig. 23, 24.
Dinariden, ?
- D. latecostata** Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 60, Taf. IV. fig. 4.
Bakony, Ladinisch.
- D. lenticularis* Gemmellaro (1882) vid Halobia lenticularis.
- D. Lepsiusii* Gemmellaro (1882) vide Halobia (?) Lepsiusii.
- D. illintana** Wanner, Triaspref. d. Molukken, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 194, Taf. IX, fig. 5, X. fig. 1. — Kittl, Halobiidae. Pal. Bal. 1912, p. 60.
Indonesien, Karnisch.
- D. Lindströmi v. Mojsisovics**, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 22, Taf. II. fig. 15—17 = Nom. nov. pr. Halobia Lommeli Lindström (non Wissmann) Om Trias-och Juraförst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. VI/6, p. 6, Taf. II. fig. 9 (8, ii exclus.). — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 68 (Halobia Lommeli Öberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. XIV/14, 1877, p. 16, Taf. V. fig. 2 inclus.).
Spitzbergen, Anisisch.
- D. Loczyi** Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 51, Taf. III. fig. 12.
Bakony, Ladinisch.
- D. Lommeli** Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 22, Taf. XVI. fig. 11 (Halobia). — v. Eichwald, Naturhist. Bem. auf e. Reise durch Tirol etc. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou 1851, p. 104, Taf. II. fig. 1 (Halobia). — Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétr. d'Esino, 1859, p. 93, Pl. XIX. fig. 6 (Posidonomya). — Benecke, Trias u. Jura i. d. Südalpen, Beneckes Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, S. 155 (Halobia). — v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 19, Taf. II. fig. 13, 14. — Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 356, Taf. II. fig. 4 (Halobia). — Teller, Daon. Lommeli in d. Pseudogaitaler Schiefern v. Cilli, Verhandl. G. R. A. 1889, p. 210. — Rothpletz, Perm-, Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 93. Taf. XIV. fig. 11, 12, Textfig. 1—4 (Halobia). — Mariani, Note pal. sul Trias sup. d. Carnia occ. Annali Ist. teen. Udine, ser. 2, Vol. XI. 1893, p. 29, Tav. II. fig. 5. — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 83, 114, 154, Taf. V. fig. 2, 3 (Halobia). — Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 33, Pl. VII. fig. 1, 2 (D. cf. Lommeli). — Bittner, Lamellibr. d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 102. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXVIII. fig. 4. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 386. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic,

- carnic a. noric faunae of Spiti, p. 9, Pl. III. fig. 1—5. — **Kittl**, Halobiidae etc. 1912, p. 69, Taf. IV. fig. 15, 16. — **Toula**, Geol. Beobacht. in Westbosnien, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 641, Textfig. 18 (var.) — **De Tonni**, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II, 1913, p. 177. — v. **Arthaber**, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Oest. XXVI. 1915, p. 192, Taf. XVIII. fig. 4.
 Südalpen, Nordalpen, Bakony, Dinariden, Griechenland,
 Anatolien, Himalaya, Ladinisch.
- D. sp. ind. aff. Lommeli** (Wissm.) **Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic, noric faunae of Spiti, p. 10, Pl. III. fig. 8. Himalaya, Ladinisch.
- D. longobardica** **Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 67, Taf. II. fig. 19, III. fig. 1. Südalpen, Ladinisch.
- D. Loveni** Böhm., Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, 1903, p. 33, Taf. III. fig. 30 vide Halobia Zitteli, fig. 22, 25, 31 vide Halobia Loveni.
- D. Marmolatae** **Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 66, Taf. II. fig. 9. — **De Tonni**, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 178, Tav. XV. fig. 2. Südalpen, Ladinisch.
- D. Moussonii Merian**, in Escher v. d. Linth, Geol. Bem. üb. d. nöndl. Vorarlberg, 1853, p. 93, Taf. V. fig. 46—48 (Posidonomya). — **Stoppani**, Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. I. 1859, p. 94 (Posidonomya). — v. **Mojsisovics**, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 9, Taf. III. fig. 18, 19. — **Lepsius**, Das westl. Südtirol, 1878, p. 356, Taf. II. fig. 2 (Halobia). — **Tommasi**, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 99. — v. **Arthaber**, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXV. fig. 16. — **Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 35, Taf. I. fig. 20—23. — **Airaghi**, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 7 (Halobia). Non **D. Moussonii** De Lorenzo, Sul Trias dei dint. di Lagonegro, Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli, V/2, No. 8, 1893, p. 8, Textfig. 3 = Halobia styriaca. Südalpen, Südralpen, Anisisch.
- D. cf. Moussonii** (Mer.) Simionescu, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 512, Textfig. 21 (Halobia). Dobrudsch, Karnisch.
- D. cf. Moussonii** (Mer.) **Kittl**, Halobiidae, l. c. p. 37, Textfig. 4. Nordalpen, Anisisch.
- D. sp. ind. ex aff. Moussonii** (Mer.) Boekh., Földt. Közl. XVIII. 1888, p. 280, 292. — **Kittl**, Halobiidae, l. c. p. 36, deest imago. Banat (Ungarn), Anisisch.
- D. noduligera** **Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 83, Taf. IV. fig. 9. Südalpen, Ladinisch.
- D. obliqua** v. **Mojsisovics** (1874) vide D. Pichleri.
- D. sp. ind. aff. obliquae** (Mojs.) **Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocriinus limest. p. 30, Pl. V. fig. 15. Himalaya, Karnisch.
- D. obliquesecta** **Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 176, Textfig. 36. Südalpen, Anisisch.
- D. obsoleta** v. **Mojsisovics** (1874) vide D. Boekhi.
- D. parthanensi** Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 367, Taf. LXIX a fig. 6, 7 (Posidonomya). — v. **Mojsisovics**, Über Daonella etc. Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 13. — **Lepsius**, Das westl. Südtirol, 1878, p. 357, Taf. II. fig. 2 (Halobia). — **Skuhros**, Stratigr. Stellg. d. Partnach-Schichten, Geogn. Jahresshefte, IV. 1892, p. 137, Fig. 3—5. — **Salomon**, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 154, Taf. V. fig. 5—8 (Halobia) = sp. non val. teste Rothpletz,

- Palacontogr. XLIX. 1892, p. 96, Bittner, Himal. Foss. Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 40, Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 55.
- D. paucicostata** Tornquist, Recoaro, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 673, Taf. XXIII. fig. 1—4. — Kittl, Geol. v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 631. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. 1912, p. 39, Taf. III. fig. 2—4.
Südalpen, Dinariden, Ladinisch.
- D. Pauli** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 82, Textfig. 15, 16.
Bukowina, Ladinisch.
- D. peciensis** Toulou, Geol. Beob. i. Westbosnien, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 646, Textfig. 19.
Dinariden, Ladinisch.
- D. phaseolina** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 33, Textfig. 3.
Nordalpen, Anisisch.
- D. Pichleri** v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 16, Taf. II. fig. 3. — Kittl, Geol. v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 607. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 79, Taf. IV. fig. 5—8, Textfig. 13, 14 [D. obliqua v. Mojsisovics, l. c. p. 21, Taf. II. fig. 5, 6, Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 57 inclus.].
Nordalpen, Südalpen, Bakony, Dinariden, Bukowina, Ladinisch.
- D. proboscidea** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 34, Taf. I. fig. 33—35.
Nordalpen, Karnisch.
- D. radiosa** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 66, Taf. II. fig. 6—8.
Bakony, Südalpen, Ladinisch.
- D. reticulata** v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 15, Taf. II. fig. 1, 2. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 78, Taf. III. fig. 17, IV. fig. 3.— v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Öst. XXVII. 1915, p. 191.
Bakony, Anatolien, Ladinisch.
- D. Richthofeni** v. Mojsisovics (1874), Bittner (1895) vide Halobia Richthofeni.
- D. rufis** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 84, Taf. V. fig. 6.
Bakony, Anisisch an Ladinisch?
- D. Sakawana** v. Mojsisovics, Über ein. japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 174, Taf. II. fig. 4, 5. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 74. — Diener, Japan. Triassfaunen, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XCII. 1915, p. 25, Taf. IV. fig. 3, 4.
Japan (Shikoku). Ladinisch.
- D. spitiensis** Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 38, Taf. VII. fig. 3. — Kittl, Halobiidae etc. 1912, p. 52.
Himalaya, ?
- D. styriaca** v. Mojsisovics (1874), Gemmellaro (1882), De Lorenzo (1897), v. Arthaber (1906), Renz (1906), Wanner (1907) vide Halobia styriaca.
- D. Sturi** Benecke, Über ein. Muschelkalk-Ablag. d. Südalpen, Benecke's Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 55, Taf. IV. fig. 9—11. — v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 17, Taf. II. fig. 7, 8. — Tommasi, Fauna calc. conch. di Lombardia, 1894, p. 97, Tav. I. fig. 14. — Bittner, Lamellibr. d. Trias d. Bakonywaldes, Pal. Bal. 1901, p. 94, Taf. VII. fig. 33. — Kittl, Halobiidae etc. ibidem, 1912, p. 61, Taf. II. fig. 1—4, Textfig. 12. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 8 (Halobia). — Tommasi, Faunetta anisica di Valesecca, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, 1913, ser. 2. Vol. XLVI. p. 772.
Südalpen, Bakony, Anisisch.

- D. cf. Sturi (Benn.) Kittl, Halobiidae l. c. 1912, p. 64, Taf. II. fig. 5.
Bakony, Anisisch.
- D. subtenuis Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 76, Taf. IV.
fig. 12—14. Bakony, Anisisch.
- D. sumatrensis Volz, Beitr. z. geol. Kenntn. v. Nordsumatra, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 30, Taf. I. fig. 2, 3. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 42, 84. Indonesien, Karnisch.
- D. Taramellii v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 18, Taf. II. fig. 10—12. — Tornquist, Recaro, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 674, Taf. XXII. fig. 5, 6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXVII. fig. 16. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 53, Textfig. 11. — v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Öst. XXVII. 1915, p. 191, Taf. XVIII. fig. 3. Südalpen, Bakony, Biharer Geb., Anatolien, Ladinisch.
- D. cf. Taramellii (Mojs.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten, Pal. Bal. 1907, p. 56. Bakony, Latinisch.
- D. teltschenensis Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 33, Taf. I. fig. 18, 19 [Posidonomya obliqua v. Hauser, Palaeontol. Notizen, Sitzgber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 153, Taf. II. fig. 8 (non 9) inclus.]. Nordalpen. Karnisch.
- D. tenuis v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 16, Taf. II. fig. 18. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 75. Südalpen, Anisisch.
- D. cf. tenuis (Mojs.) Kittl, l. c. p. 75. Nordalpen, Anisisch.
- D. Tommasii Philipp, Geol. Pal. Unters. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. D. G. LVI. 1904, p. 61, Taf. III. fig. 16—20. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 37, Textfig. 5. Südalpen, Ladinisch.
- D. tripartita Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 52, Taf. III. fig. 15, 16. — v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Öst. XXVII. 1915, p. 191. Bakony, Anatolien, Ladinisch.
- D. tyrolensis v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 14, Taf. I. fig. 8, 10. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 45, Textfig. 6, 7. — v. Arthaber, Fossilführ. d. anis. Stufe v. Trient, Jahrb. G. R. A. LXV. 1915, p. 260. Nordalpen, Südalpen, Ladinisch — Südalpen, Anisisch.
- D. cf. tyrolensis (Mojs.) Kittl, l. c. p. 46, Textfig. 8. Biharer Geb. (Ungarn), Ladinisch.
- D. udvariensis Kittl, Halobiidae etc. 1912, p. 41, Taf. III. fig. 14. Bakony, Ladinisch.
- D. Vaceki Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 77, Taf. II. fig. 18. Südalpen, Anisisch.
- D. Wichmanni Wanner (1907) vide Halobia Wichmanni.
- D. zellensis Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 76, Taf. V. fig. 5. Nordalpen, Anisisch.

Gen. **Dipleurites** Kittl.

Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 164.

Typ. Halobia Bergeri v. Seebach (1866).

- D. Bergeri v. Seebach, Triasfoss., Prot. D. G. G. 1866, p. 7 (Halobia). — v. Schäuroth, Verhandl. G. R. A. 1868, p. 403 (Halobia). — v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 12, Taf. I. fig. 1

(*Daonella*). — **Tornquist**, *Daonellen d. deutsch. Muschelkalks*, Neues Jahrb. 1903, II. p. 83, Taf. I. fig. 3, 4 (*Daonella*). — **Kittl**, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 164.
Deutschland (Thüringen), Muschelkalk.

Gen. **Enteropleura** Kittl.

Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 162.

Typ. *Daonella Guembeli v. Mojsisovics* (1874).

E. Bittneri Kittl, l. c. p. 163 = Nom. nov. pr. *Posidonomya* nov. sp. v. *Arthaber*, Cephal. d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Oest. X. 1896, p. 194, Textfig. 12.

Nordalpen, Anisisch.

E. Guembeli v. Mojsisovics, Üb. *Daonella u. Halobia*, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 8, Taf. III. fig. 12, 13 (*Daonella*). — *Tommasi*, Fauna d. calcare conch. d. Lombardia, 1894, p. 96 (*Daonella*). — **Kittl**, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 162, Taf. I. fig. 16, 17.

Bakony, Südalpen, Anisisch.

E. cf. Guembeli Tommasi, l. c. p. 96.

Südalpen, Anisisch.

Gen. **Halobia** Brönn.

Über d. Muschelverst. d. süddeutsch. Salzgeb. etc., Leonhard u. Brönn's Jahrb. f. Min. I. 1830, p. 284. — v. Mojsisovics, Üb. *Daonella u. Halobia*, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 23. — Neu m a y r, Beitr. zu einer morphol. Einteilg. d. Bivalvonen, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 738. — R o t h p e l z, Perm-Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Paleontogr. XXXIX. 1892, p. 91. — **Bittner**, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 37. — **Kittl**, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 85.

Typ. *H. salinarum* Brönn (1830).

H. amoena v. Mojsisovics, Üb. *Daonella u. Halobia*, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 26, Taf. V. fig. 4. — **Kittl**, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 123.

Nordalpen, Norisch.

H. areata Kittl, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 95, Taf. VI. fig. 8, 9.

Nordalpen, Karnisch.

H. Arthaber Kittl, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 97, Taf. V. fig. 11, Textfig. 19.

Nordalpen, Karnisch.

H. cf. Arthaber Kittl, l. c. p. 98.

Bakony, Karnisch.

H. auriculata Kittl, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 140, Taf. IX. fig. 28.

Nordalpen, Norisch.

H. austriaca v. Mojsisovics, Üb. *Daonella u. Halobia*, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 28, Taf. IV. fig. 1—3, V. fig. 14. — R e n z, Halobien etc. aus Griechenld., Neues Jahrb. f. Min. 1906, I. p. 34. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. 1/3, 1906, Taf. XLV. fig. 2. — P i r o u t e t, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 325. — **Kittl**, *Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912*, p. 101, Taf. VI. fig. 12-14.

Non *H. austriaca* Frech, Compte rendu Congrès géol. internat. Mexico, 1907, p. 331, Taf. I. fig. 1 = *H. sp. ind. aff. Charlynae Mojs.*

Nordalpen, Griechenland. — Karnisch, Neu-Caledonien — Obertrias.

H. cf. austriaca (Mojs.) Bittner, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LIII. 1902, p. 633. — M a n s u y, Mission Zeill dans le Laos etc. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 48, Pl. IX. fig. 11. — T r e c h m a n n, Trias of New-

- ealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London LXXIII. 1917, . 200, Pl. XXI. fig. 4.
Dinariden, Indochnina (Laos). Neusceland, Karnisch.
- H. Bassanii** De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 137, Tav. XIX. fig. 1—6. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 112.
Basilicata (Italia), Karnisch.
- H. battakensis** Volz, Beitr. z. geol. Kenntn. v. Nordsumatra, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 31, Taf. I. fig. 4, 5. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 89.
Indonesien, Karnisch.
- H. Beneckeii** Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 460, Tav. III. fig. 4, 5. — Scalia, Fauna Trias sup. di Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5. Vol. III. 1910, p. 47, Tav. III. fig. 45. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 127.
Sizilien, Karnisch.
- H. Bergeri** v. Seebach (1866), v. Schauroth (1868) vide Diplorites Bergeri.
- H. Beyrichi** v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 11, Taf. I. fig. 7 (Daonella). — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 96, Taf. I. fig. 30, 31, VI. fig. 10. Nordalpen, Karnisch.
- H. Bittneri** Kittl, Halobiidae, l. c. p. 108, Textfig. 23, 24.
H. bosniaca Kittl, Halobiidae, l. c. p. 98, Taf. V. fig. 9.
Nordalpen, Karnisch.
- H. brachyotis** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 735. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 130, Taf. VII. fig. 1, 2.
Dinariden, Karnisch.
- H. Breuningiana** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 139, Taf. IX. fig. 25—26. Textfig. 29, 30.
Nordalpen Norisch.
- H. bukowinensis** Kittl Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912 p. 103, Textfig. 20—22.
Bukowina (Karpathen), Ladinisch.
- H. Bukowskii** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 121, Taf. VIII. fig. 13.
Dinariden, Norisch.
- H. (an Daonella?) cf. cassiana** Toulou, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 103 Taf. VI. fig. 41a = Gen. ind. sp. ind.
- H. celtica** v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 28, Taf. III. fig. 1, IV. fig. 15. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 137, Taf. IX. fig. 16 [H. lineata v. Mojsisovics, l. c. Taf. III. fig. 3 (caet. exclud.) inclusus].
Nordalpen, Norisch.
- H. cf. celtica** (Mojs.) Renz, Üb. Halobien u. Daonellen aus Griechenland, Neues Jahrb. f. Min. 1906. I. p. 36. — Pironet, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 326.
Peloponnesos, Neu-Caledonien, Obertrias.
- H. Charlyana** v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 27, Taf. IV. fig. 4—6. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 107, Taf. V. fig. 7, VIII. fig. 14—16.
Non *H. Charlyana* Rothpletz (1892) [= *H. moluccana* Wanner.]
Nordalpen, Karnisch.
- H. sp. ind. aff. Charlyanae** (Mojs.) Kittl, l. c. p. 103 [Typ. *H. austriaca* Frech (non v. Mojsisovics), Ayiculiden aus d. Trias v. Zacatecas, C. R. Congrès géol. internat. Mexico, 1907, p. 331, Taf. I. fig. 1.]
Nordalpen, Karnisch.

- H. cinerea** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 109, Taf. IX. fig. 25. Nordalpen, Norisch.
- H. circumsculeata** Kittl, Halobiidae, l. c. 1912, p. 126, Taf. IX. fig. 24 [Typ. Hal. sp. ind. aff. siculae (Gemm.) Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LII. 1903, p. 735.] Dinariden, Karnisch.
- H. comata** Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 46, Pl. VII. fig. 13. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic etc. faunae of Spiti, p. 47, Pl. VII. fig. 2—4. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 160. Himalaya, Karnisch.
- H. cf. comata** Bittner, l. c. p. 47, Pl. VII. fig. 14. — Kittl, l. c. p. 161. Himalaya, Norisch?
- H. cf. comata** (Bittn.) Piroutet, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 326. — Mansuy, Paléontol. du Yunnan orient., Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 130, Pl. XXIV. fig. 6. Neu-Caledonien, Yunnan, Obertrias.
- H. Curionii** Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei. Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 461, Tav. III. fig. 5, 6. — Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5. Vol. III. 1910, p. 49, Tav. III. fig. 53. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 126. Sizilien, Karnisch.
- H. Daltoni** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 143, Taf. IX. fig. 33, 34. Indonesien, Obertrias.
- H. dilatata** Kittl, Halobiidae, l. c. p. 115, Taf. VIII. fig. 9. Nordalpen, Norisch.
- H. disperseinsecta** Kittl, Halobiidae etc. l. c. p. 88, Taf. I. fig. 24—29. Nordalpen, Norisch.
- H. distineta** v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 28, Taf. IV. fig. 11. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 133, Taf. VIII. fig. 17, 18. Nordalpen, Norisch.
- H. dubia* Gabb (1864) vide Daonella dubia.
- H. Eckharti** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 132, Taf. IX. fig. 29, 30. Nordalpen, Karnisch.
- H. esinensis* Salomon (1895) vide Daonella esinensis.
- H. eximia** v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 27, Taf. IV. fig. 16, 17. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 130, Taf. VII. fig. 9. Nordalpen, Dinariden, Karnisch.
- H. fallax** V. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 29, Taf. V. fig. 6, 5. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 151, Taf. VII. fig. 20. Nordalpen, Norisch.
- H. cf. fallax** (Mojs.) Kittl, Halobiidae, l. c. p. 152, Texfig. 32. Südalpen, Karnisch?
- H. fascigera** Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 45, Pl. VII. fig. 15. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1908, Fauna Tropites limestone of Byans, p. 8, Pl. XVII. fig. 9, 10. — Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 157. Himalaya, Karnisch.
- H. sp. ind. aff. fascigerae** (Bittn.) Diener, l. c. Vol. V. No. 3. 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 96, Pl. XVII. fig. 4, 5. Himalaya, Norisch.

H. fluxa v. Mojsisovics, Über Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 16, Taf. I. fig. 14, 15 (Daonella). — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, ibidem, XVIII/1, 1895, p. 79, Taf. IX. fig. 27—29. — Cortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Rivista Ital di Paleontol. VIII. 1902, p. 83. — Kittl, Triasbildungen d. NE. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 484. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 147.

Südalpen, Dobrudscha, Karnisch.

H. gracilis Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 105, Taf. VIII. fig. 10, 11.

Nordalpen, Norisch.

H. Grimmeri Kittl, Halobiidae, Pal. Bal. 1912, p. 155, Taf. IX. fig. 6.

Dinariden, Ladinisch an Karnisch?

H. Haberfellneri Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 149, Taf. VII, fig. 10, 11.

Nordalpen, Ladinisch?

H. halilucensis Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 708. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 100, Taf. VI. fig. 1, 2.

Dinariden, Anisisch.

H. halorica v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 33, Taf. V. fig. 1 (non fig. 2 = H. Partschii). — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 116, Textfig. 25.

Nordalpen, Norisch.

H. Haueri Stur (1865) vide H. rugosa.
H. Hochstetteri v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 32, Taf. III. fig. 7—9 [Nom. nov. pr. H. Lommeli v. Zittel (non Wissmann), Palaeontol. v. Neuseeland, Novara-Expedition, Geol. I/2, 1864, p. 27, Taf. VI. fig. 2]. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 160. — Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London LXXXIII. 1917, p. 199, Pl. XXI. fig. 3.

Neuseeland, Karnisch.

H. cf. Hochstetteri (Mojs.) Pirotet, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 325.

Neu-Caledonien, Obertrias.

H. Hoernesii v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 33, Taf. V. fig. 3. [Nom. nov. pr. H. Lommeli M. Hoernes (non Wissmann) Gastr. u. Acephal. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 52, Taf. II. fig. 17]. — Renz, Halobien u. Daonellen aus Griechenld., Neues Jahrb. f. Min. 1906/I. p. 37. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 118.

Nordalpen, Peloponnesos, Norisch.

H. Hyatti Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 141, Taf. IX. fig. 32.

Nordalpen, Norisch.

H. insignis Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 459, Tav. II. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 137, Tav. XVII. fig. 1—3, 7—9. — Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 735. — Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910 p. 47. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 113, Taf. V. fig. 10.

Sicilien, Basilicata, Dinariden, Karnisch.

H. cf. insignis (Gemm.) Mansuy, Mission Zeil dans le Laos etc. Mem. serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 49, Pl. IX. fig. 13.

Indochina (Laos), Karnisch.

H. intermedia v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 30, Taf. III. fig. 5, 6. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 146, Taf. VII. fig. 14.

Nordalpen, Ladinisch.

- H. cf. intermedia** (Mojs.) Piroute t., Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 325, Neu-Caledonien, Obertrias.
- H. Jagelskyi** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 109, Taf. VIII. fig. 7, 8. Nordalpen, Karnisch.
- H. kvaluana** Volz, Beitr. z. geol. Kenntn. v. Nordsumatra, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 33, Taf. I. fig. 8—10. — Piroute t., Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 325. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 104. Indonesien, Neu-Caledonien, Karnisch.
- H. landlensis** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 95, Textfig. 17. Nordalpen, Karnisch.
- H. (?) lenticularis** Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 466, Tav. I. fig. 3—5 (Daonella). — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1897, p. 138, Tav. XIX. fig. 7. — Sealia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 47, Tav. III. fig. 46. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 91. Basilicata, Sizilien, Nordalpen (?), Karnisch.
- H. (?) Lepsiusii** Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 467, Tav. I. fig. 6 (Daonella). — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 95. Sizilien, Nordalpen, Karnisch.
- H. lineata** Graf zu Münster, in Goldfuss, Petrefacta German. II. 1838, p. 140, Taf. CXXI. fig. 3 (Monotis). — v. Moysi sovič, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 29, Taf. III. fig. 2, 4 (non 3 = H. celtica, teste Kittl, l. e. p. 136). — Rothpletz, Perm-, Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 94, Taf. XII. fig. 4. — Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLVII. fig. 6. — Renz, Hal. u. Daon. aus Griechenld., Neues Jahrb. f. Min. 1906, I. p. 37. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 135. Nordalpen, Peloponnesos, Indonesien, Norisch.
- H. cf. lineata** (Mstr.) Kittl, l. e. p. 137, Textfig. 28. Nordalpen, Obertrias.
- H. Lommeli** Wissmann (1841), v. Eichwald (1851), Lepsius (1878), Rothpletz (1892), Salomon (1895) vide Daonella Lommeli, M. Hoernes (1855) vide H. Hoernes, v. Zittel (1864) vide H. Hochstetter, Linström (1874), Taf. II. fig. 9, Öberg (1877) vide Daonella Lindströmi.
- H. Loveni** Boehm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1902, p. 30, Taf. III. fig. 22, 25, 31 (non 30 = H. Zittelii). — Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arctic exped. No. 7, 1907, p. 21. Bäreninsel, Karnisch.
- H. lucana** De Lorenzo, Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 136, Tav. XVII. fig. 4—6. — Neilli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1889, p. 216, Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 128. Basilicata, Ladinisch.
- H. mangalanensis** Volz, Beitr. z. geol. Kenntn. v. Nordsumatra, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 33, Taf. I. fig. 6, 7. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 89. Indonesien, Karnisch.
- H. marmorea** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 97, Textfig. 18. Nordalpen, Karnisch.
- H. Maximiliani** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 153, Taf. VII. fig. 19. Nordalpen, Norisch.
- H. mediterranea** Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 462, Tav. III. fig. 7—9. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 109.

- Non *H. mediterranea* Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica,
Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910
p. 46, Tav. III. fig. 43, teste Kittl, l. c. p. 110.
Sizilien, Karnisch.
- H. miesenbachensis* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 154,
Taf. IX. fig. 18—22, Textfig. 34. Nordalpen, Karnisch.
- H. Mojsisovicsi* Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia,
Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3. Vol. XII. 1882, p. 462, Tav. III.
fig. 10—12. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 138.
Sizilien, Obertrias.
- H. cf. Mojsisovicsi* (Gemm.) Renz, Hal. u. Daonell. aus Griechenland.
Neues Jahrb. f. Min. 1906 I. p. 36. — Pirouette, Trias de la
Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908,
p. 325. Peleponnesos, Neu-Caledonien, Obertrias.
- H. moluccana* Wanner, Triaspref. d. Molukken, Neues Jahrb.
f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 206, Taf. X. fig. 8, 9, XI. fig. 1
[Hal. Charlyana Rothpletz, Perm-, Trias- u. Juraform. auf
Timor etc. Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 94, Taf. XIV. fig.
13—15, H. norica Rothpletz, l. c. p. 95, Taf. XIV. fig. 8
(non 7) inclus.]. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 111.
Indonesien, Obertrias.
- H. Moussonii* (Leptius (1878), Simionescu (1910) vide
Daonella Moussonii. Indonesia, Obertrias.
- H. namadaleensis* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912 p. 121 =
Nom. nov. pr. Hal. Lommeli Rothpletz (non Wissm.),
Perm-, Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Palaeontogr. XXXIX.
1892, p. 94, Taf. XIV. fig. 6 (nec fig. 10, 11, nec Textfig.).
Indonesien, Obertrias.
- H. Neumayri* Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A.
XLI. 1891, p. 99, Textfig. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal.
1912, p. 156. Anatolien, Norisch.
- H. cf. Neumayri* Böhm (1903) vide H. Zitteli.
- H. nov. sp. aff. Neumayri* Bittner, Neue Brach. etc. d. Trias v.
Balia, Jahrb. G. R. A. XLV. 1895, p. 249, Taf. XI. fig. 10, 11. —
Kittl, l. c. p. 156. Anatolien, Norisch.
- H. norica* v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl.
G. R. A. VII/2, 1874, p. 25, Taf. V. fig. 7. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 124, Taf. IX. fig. 7—9.
Non *H. norica* Rothpletz, Perm-, Trias- u. Juraform. auf
Timor, Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 95, Taf. XIV. fig. 7
(H. talauana Waner), fig. 8 (= *H. moluccana* Waner).
Nordalpen, Dinariden, Norisch.
- H. occidentalis* Whiteaves, Contrib. Canad. Pal. I. Geol. Surv.
Canada, Pt. 2, 1889, p. 135, Pl. XVII. fig. 5, 6.
Brit. Columbia, Karnisch.
- H. očevjana* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 158, Taf. VII.
fig. 22, Textfig. 36. Dinariden, Karnisch.
- H. paraceltica* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 138, Taf. IX.
fig. 17. Nordalpen, Norisch.
- H. paralineata* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 143, Taf. IX.
fig. 31. Nordalpen, Norisch.
- H. paraplieosa* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 123, Textfig.
26. Nordalpen, Norisch.
- H. parasicula* Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 125, Taf. IX.
fig. 10. Nordalpen, Norisch.
- H. parthanensis* Leptius (1878), Salomon (1893) vide Daonella parthanensis.

- H. Partschi Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 119, Taf. VIII, fig. 3, 12 [H. norica v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 33, Taf. V. fig. 2 (non 1) inclus.].
Nordalpen, Norisch.
- H. cf. Partschi Kittl**, l. c. p. 120, Taf. VIII. fig. 5.
Nordalpen, Norisch.
- H. pectinoides Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 128, Taf. V. fig. 13.
Nordalpen, Norisch.
- H. plicosa v. Mojsisovics**, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 25, Taf. V. fig. 9. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 122, Taf. IX. fig. 12—15.
Nordalpen, Südälpen, Dinariden, Norisch.
- H. cf. plicosa (Mojs.) Marianii**, Note pal. sul Trias d. Carnia occ. Ann. Ist. Teor. Udine, ser. 2, Vol. XI. 1893, p. 30, Tav. II. fig. 6.
Südalpen, Ladinisch.
- H. praesuperba Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 150, Taf. VII fig. 15, 16.
Nordalpen, Karnisch.
- H. radiata Gemmellaro**, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lineei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 465, Tav. I. fig. 9—12. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 142.
Sizilien, Karnisch.
- H. rarestriata v. Mojsisovics**, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 24, Taf. V. fig. 10, 11. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 90.
Nordalpen, Norisch.
- H. raschbergensis Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 138, Taf. IX. fig. 4, 5.
Nordalpen, Norisch.
- H. remansa Kittl**, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 128, Taf. V. fig. 8.
Nordalpen, Norisch.
- H. (?) Richthofeni v. Mojsisovics**, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 10, fig. 11, 12. (Daonella). — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 99.
Südalpen, Karnisch.
- H. rugosa Guembel**, Bayr. Alpengeb. 1861, p. 275. — v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 31, Taf. IV. fig. 7, 8 [Posidonomya semiradiata Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 368, Taf. LXIXa, fig. 9, H. Haueri Stur, Verhandl. G. R. A. 1865, p. 44 inclus.], v. Woehrmann, Fauna d. Cardita-Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 207, Taf. VII. fig. 13—15. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, ibidem, XLIII. 1893, p. 660 [H. rugosa Skuphos, Stratigr. d. Partnach-Schichten, Geogr. Jahreshefte, IV. 1892, p. 48 exclus.]. — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 28. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLII. fig. 1, 2. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 149.
Nordalpen, Südälpen, Bakony, Karpathen, Karnisch.
- H. sp. ind. aff. rugosae (Gümb.) Kittl**, Halobiidae, l. c. p. 158 [Typ. H. rugosa Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 736].
Dinariden, Karnisch.
- H. salinarum Brönn**, Pectinites salinarius etc., Leonhardi. Brönn's Jahrb. f. Min. I. 1830, p. 280, Taf. IV. fig. 3. — v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 28, Taf. IV. fig. 12—14. — v. Arthaber, Alp. Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLVII. fig. 4, 5. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 135.
Nordalpen, Norisch.

H. salisburgensis Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 134,
Textfig. 27.

Nordalpen, Karnisch.

H. siciliana Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 104, Taf. VIII,
fig. 1, 2.

Sizilien, Karnisch.

H. sicula Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem.
Acad. Lincei, Roma, 1882, ser. 3, Vol. XII. p. 464, Tav. IV.
fig. 2, 3. — Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol.
Ital. XVIII. 1899, p. 216. — De Lorenzo, Sul Trias dei
dintorni di Lagonegro, Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli, ser.
2. Vol. V. No. 8, p. 14, Textfig. 6. — De Lorenzo, Foss.
Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 135, Tav. VII.
fig. 8, 10. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan.
Napoli, XXXVIII, 1908, p. 36, Tav. I. fig. 1. — Scalia,
Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat.
Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 48, Tav. III. fig. 48—50. —
Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 124.

Sizilien, Basilicata, Karnisch.

H. sp. ind. aff. siculae (Gemm.) Kittl (1903) vide *H. circum-
sulcata*.

H. Simonyi Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 119, Taf. VIII.
fig. 6.

Nordalpen, Norisch.

H. simplex Gemmellaro, Sul Trias reg. occ. d. Sicilia, Mem.
Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 466, Tav. I. fig. 7,
8. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 89.

Sizilien, Karnisch.

H. Sirii Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 125, Taf. VI. fig. 17.
Nordalpen, Norisch.

H. Stapli Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 119, Taf. VIII.
fig. 4.

Nordalpen, Norisch.

H. striatissima Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 140, Taf. VI.
fig. 19, 20.

Ungarn (Biharer Geb.), Obertrias.

H. styriaca v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl.
G. R. A. VII/2, 1874, p. 10, Taf. I. fig. 4, 5 (Daonella). — Gem-
mellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei,
Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 467, Tav. I. fig. 1, 2 (Daonella). —
Volz, Beitr. z. geol. Kenntn. v. Nordsumatra, Zeitschr. D. G. G.
LI. 1899, p. 27, Taf. I. fig. 1 (Daonella). — Kittl, Sarajevo,
Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 733. — v. Arthaber, Alpine
Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLV. fig. 1 (Daonella). —
Renz, Üb. Halobien u. Daon. aus Griechenld., Neues Jahrb.
f. Min. 1906 I. p. 30, Taf. III. fig. 1, 2 (non 3) [Daonella]. — Üb.
d. mesoz. Form. d. südwestl. Balkanhalbinsel, Neues Jahrb. f.
Min. Beil. Bd. XXI. 1906, p. 221, Taf. X. fig. 1 (Daonella). —
Wanner, Triaspotref. d. Molukken, Neues Jahrb. f. Min.
Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 196, Taf. IX. fig. 6 (Daonella). —
Renz, Die Trias v. Rotti u. Timor, Zentralbl. f. Min. 1909,
Textfig. 1, 2. — Renz, Stratigr. Unters. im griech. Mesozoikum,
Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 555, Textfig. 20, 22 (Daonella). —
Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 91, Taf. VI.
fig. 3—7 [Daon. cassiana v. Mojsisovics, l. c. Taf. I. fig. 2, 3
(non 13), D. Mousson De Lorenzo, Trias dintorni di Lago-
negro, Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli, ser. 2. Vol. V. No. 8
1902, p. 9, Textfig. 3 inclus.]

Nordalpen, Dinariden, Griechenland, Sizilien, Indonesien,
Karnisch.

H. cf. styriaca (Mejs.) De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro,
Pal. Ital. II. 1897, p. 139, Tav. XVI. fig. 22 (Daonella).

Basilicata, Karnisch.

H. sp. ind. aff. styriacae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV.
Himal. Foss. Vol. V. No. 3, Ladinie, carnic etc. faunae of Spiti,
1908, p. 95, Pl. XVI. fig. 8 (Daonella).

Himalaya, Karnisch.

- H. subaustriaca** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 101, Taf. VI. fig. 15, 16. Nordalpen, Karnisch.
- H. subcomata** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 181, Taf. V. fig. 1, 2. Südalpen, Ladinisch.
- H. subreticulata** Gommellaro, Sul Trias reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 463, Tav. III. fig. 13, IV. fig. 7. — Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 734. — Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 3, Vol. III. 1910, p. 46, Tav. III. fig. 44. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 106. Sizilien, Dinariden, Karnisch.
- H. Suessii v. Mojsisovics**, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 26, Taf. V, fig. 12, 13. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 107. Nordalpen, Karnisch.
- H. cf. Suessii (Mojs.) Piroutet**, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 326. Neu-Caledonien, Obertrias.
- H. sumatrana** Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontogr. Suppl. IV. 1914, p. 227, Taf. XVI. fig. 15. Sumatra, Norisch.
- H. superba** v. Mojsisovics. Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 30, Taf. IV. fig. 9, 10. — Smith, Pelecyopodenzenen i. d. Trias Nordamerikas, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 694. — Renz, Hal. u. Daonellen aus Griechenld., Neues Jahrb. 1906, I. p. 35, Taf. III. fig. 5. — Piroutet, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 326. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 151, Taf. VII. fig. 17, 18. Nordalpen, Dinariden, Peloponnesos, Californien, Karnisch.
- H. sp. ind. aff. superbae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic etc. faunae of Spiti, p. 94, Pl. XVI. fig. 7. Himalaya, Karnisch.
- H. superbescens** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 153, Taf. VII. fig. 21, Textfig. 33. Nordalpen, Norisch.
- H. Szontaghi** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 141, Taf. VI. fig. 18. Biharer Geb. (Ungarn), Obertrias.
- H. talauana** Wanner, Triaspref. d. Molukken, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 207, Taf. X. fig. 10, 11 [H. norica Rothpletz (non Mojs.) Perm-, Trias- u. Juraform. auf Timor, Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 95, Taf. XIV. fig. 7 (non 8) inclus.]. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 112. Indonesien, Obertrias.
- H. Telleri** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 115, Taf. IX. fig. 35. Südalpen, Obertrias.
- H. Thisbitis** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 159 [deest imago]. Nordalpen, Karnisch.
- H. Tommasii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 8, Textfig. Südalpen, Anisich.
- H. transversa** Gommellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilis, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 465, Tav. III. fig. 1, 2. — Scalia, Fauna Trias, sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5. III. 1910, p. 48, Tav. III. fig. 52. — Kittl. Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 132, Taf. VII. fig. 3, 4. Sizilien, Nordalpen, Karnisch.

- H. tropitum** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 131, Taf. VII.
fig. 5—8. Nordalpen, Karnisch.
- H. cf. tropitum** Kittl, l. c. p. 131. Nordalpen, Karnisch.
- H. varesensis** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 105, Taf. IX.
fig. 1—3. Dinariden, Karnisch.
- H. Verbeekii** Wanner, Triaspotref. d. Molukken, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 208, Taf. X. fig. 5—7. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 142. Indonesien, Obertrias.
- H. vixaurita** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 145, Taf. VI.
fig. 12, 13, Textfig. 31. Nordalpen, Bakony, Ladinisch.
- H. Wallbrunnensis** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 155,
Textfig. 35. Nordalpen, Karnisch.
- H. Wichmanni** Rothpletz, Perm-, Trias- u. Juraform. auf Timor etc. Palaeontogr. XXXIX. 1892, p. 95, Taf. XII. fig. 3, XIV. fig. 9, 10, 16, 17, 19. — Wanner, Triaspotref. d. Molukken, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 198, Taf. IX. fig. 7 (Daonella). — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 110 [H. cassiana Rothpletz, l. c. p. 95, Taf. XIV. fig. 18 inclusus.]. Indonesien, Obertrias.
- H. Wiereri** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 127, Taf. IX.
fig. 11. Nordalpen, Norisch.
- H. Zitteli** Lindström, Trias- och Jura verst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. VI/6, Stockholm, 1865, p. 6, Taf. I. fig. 6—12, II. fig. 11. — v. Mojsisovics, Üb. Daonella u. Halobia, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 32, Taf. III. fig. 10, 11. — Öberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. IV/14, Stockholm, 1877, p. 6, Taf. V. fig. 3, 4. — Lundgren, Bem. üb. d. in Spitzbergen 1862 ges. Jura- u. Triasfoss. Bihang Svenska Vet. Akad. Handl. VIII/12, Stockholm, 1883, p. 19, Taf. II. fig. 13. — Böhm, Obertriad. Fauna d.-Bäreninsel, ibidem, XXXVII. No. 3, 1903, p. 30, Taf. III. fig. 27. — Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Acrtic exped. No. 7, 1907, p. 14, Taf. 1. fig. 7—11 [H. cf. Neumayri Böhm, l. c. p. 32, Taf. III. Fig. 29, Daonella Loveni Böhm, l. c. p. 33, Taf. III. fig. 30 (caet. exclus.) inclusus.]. — Pirotet, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 325. — v. Wittenburg, Triasfoss. v. Fluss Dulgalach, Trav. Mus. Pierre-le-Grand, Acad. sci. St. Pétersbourg, T. IV. 1910, p. 70, Taf. V. fig. 12—16, Textfig. 2. — Kittl, Halobiidae etc. 1912, Pal. Bal. p. 157. Spitzbergen, Bäreninsel, NE. Sibirien, Ins. Kotelnij, Ellesmereland Neu-Caledonien, Karnisch.
- H. Zitteli** var. **zealandica** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London LXXIII. 1917, p. 197, Pl. XX. fig. 6, XXI. fig. 1, 2. Neuseeland, Karnisch.
- H. sp. ind. aff. Zitteli** (Lindstr.) Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. Stockholm, 1903, p. 32, Taf. III. fig. 32. Bäreninsel, Karnisch.
- H. nov. sp. ind.** Tommasi, Fauna calc. bianco Latemar, Atti Acad. Agiati, Rovereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 82, Tav. I. fig. 5. Südalpen, Ladinisch.
- H. sp. ind.** Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 47, Pl. VII. fig. 16. Nimalaya, Karnisch.
- H. sp. ind.** Dienner, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 3, Pl. VIII. fig. 1. Himalaya, Karnisch.

H. (an Daonella?) sp. ind. **Toula**, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc.
Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 102, Taf. VI. fig. 41.
Nordalpen, Karnisch.

Gen. **Posidonia** Brönn.

Leonhards Taschenbuch f. Min. I. 1828, p. 268. — Brönn, Leth.
geogn. I. 1837, p. 89 (Posidonomya). — Kittl, Halobiidae etc.
Pal. Bal. 1912, p. 13.

P. abbatiensis Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A.
XVI/4, 1913, p. 27, Taf. VI. fig. 13.
Südalpen, Karnisch.

P. affinis Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem.
Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 468, Tav. IV.
fig. 6. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal.
Ital. II. 1896, p. 131. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912,
p. 27.

Non **P. affinis** Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem.
Acad. sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 49, Tav. III.
fig. 47 (= Halobia sp. ind.)
Sizilien, Basilicata, Karnisch.

P. Albertii Voltz, Notice sur le grès bigarré de la grande carrière
de Soultz-les-Bains, Mém. Soc. d'hist. nat. Strasbourg, II. 1837,
p. 7 (deest imago) [= sp. ind., teste Kittl, Halobiidae etc.
Pal. Bal. 1912, p. 16.].
Süddeutschland, Buntsandstein.

P. alta v. Mojsisovics, Üb. ein. Triasverst. aus d. Südalpen,
Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 438, Taf. XIV. fig. 6. [= ?
P. pannonica juv., teste Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal.
1912, p. 23, Taf. I. fig. 2.]
Bakony — Anisisch, Ladinisch, Südalpen — Ladinisch.

P. cf. alta (Mojs.) Kittl, Triasbild. d. NE. Dobrudscha, Denkschr.
Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 483.
Dobrudscha, Ladinisch.

P. aurita v. Hauer. Üb. d. v. Bergr. Fuchsi i. d. Venet. Alpen
ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 12, Taf. III.
fig. 5, 7 vide Pseudomonotis (Claraia) aurita, fig. 6, 9 vide Ps.
(Claraia) intermedia.

P. Backlundii v. Wittenburg, Triasfoss. v. Spitzbergen, Trav.
Mus. Pierre-le-Grand, Acad. sci. St. Petersbourg, IV. 1910, p. 38,
Taf. I. fig. 4, 5. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 29.
Spitzbergen, Karnisch.

P. Bittneri De Lorenzo, Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal.
Ital. II. 1896, p. 133, Tav. XVI. fig. 19—21. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 28.
Basilicata, Karnisch.

P. bosniaca Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus d. Trias v. Bosnien,
Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 595, Textfig. 10.
Dinariden, Anisisch.

P. cf. bosniaca (Bittn.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss.
Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 7, Pl. I. fig. 8, 9.
Himalaya, Anisisch.

P. Clarai Emmrich (1844), v. Hauer (1850), v. Eichwald
(1851), Brönn (1856), v. Schaueroth (1859), v. Alberti
(1864) vide Pseudomonotis (Claraia) Clarai.

P. daytonensis Gabb, Palaeontol. of California, I. 1864, p. 32,
Pl. VI. fig. 32.
Nevada, ?

P. (?) dubiosa Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes,
Pal. Bal. 1901, p. 89, Taf. IX. fig. 46 (Pseudomonotis). —
French, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc., ibidem, 1907, p. 9.
Bakony, Skythisch.

P. elegans Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem.
Acad. Lincei, Roma, ser. 3. Vol. XII. 1882, p. 469, Tav. IV.

- fig. 11, 12. — *Scalia*, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III 1910, p. 50. — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 27. Sizilien, Karnisch.
- P. fasciata* Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 2, Vol. XII. 1882, p. 468, Tav. IV. fig. 7, 8. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 132. — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 26. Sizilien, Basilicata, Karnisch.
- P. cf. fasciata* (Gemm.) *Kittl*, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 733. — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 25. Dinariden, Obertrias.
- P. Gemmellaro* De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 133, Tav. XVI. fig. 13—18. — *Kittl*, Halobiidae etc. 1912, p. 28. Basilicata, Karnisch.
- P. Germari* Beyrich, Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 377 (deest imago) ? syn c. *P. Albertii* Voltz, teste v. Alberti, Überblick üb. d. Trias, 1864, p. 192.
- P. gibbosa* Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 470, Tav. V. fig. 11, 12. — De Lorenzo, Sul Trias dei dintorni di Lagonegro, Atti Acad. sci. fis. e nat. Napol., ser. 2, Vol. V. 1892, p. 13, Textfig. 5. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 131. — *Scalia*, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 49, Tav. III. fig. 54 [= *Halobia* sp. ind. juv., teste *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 28].
- P. Haueri* Tommasi (1895) vide *Pseudomonotis* (*Claraia*) aurita.
- P. Idriana* v. Mojsisovics, Üb. ein. Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 437, Taf. XIV. fig. 4. — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 21, Taf. I. fig. 13, 14. Südalpen, Ladinisch.
- P. lineolata* Gemmellaro, Sul Trias d. reg. occ. d. Sicilia, Mem. Acad. Lincei, Roma, ser. 3, Vol. XII. 1882, p. 2, Tav. IV. fig. 9, 10. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 132. — *Scalia*, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Mem. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 5, Vol. III. 1910, p. 50. — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 27. Sizilien, Basilicata, Karnisch.
- P. Lommeli* Stoppani (1859) vide *Daonella Lommeli*.
- P. Mimer* Öberg, Om Trias-och Jura foerst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. XIV/14, 1877, p. 15, Taf. V. fig. 9—14. Spitzbergen, Anisisch.
- P. minuta* v. Ziethen, Verst. Würtembergs, 1830, p. 72, Taf. LIV. fig. 5. — Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 118 [= *Estheria minuta*, teste R. Jones, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XII. 1856, p. 376, *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 16.]
- P. Moussonii* Merian (1853) vide *Daonella Moussonii*, Stoppani, Pétref. d'Esino, Pal. Lomb. I. 1859. p. 94, Pl. XIX. fig. 7—11 = *Daonella* sp. ind. aff. *tenuis* Mojs., teste v. Mojsisovics, Üb. *Daonella* u. *Halobia*, Abhandl. G. R. A. VII/2, 1874, p. 16.
- P. multicostata* Emmons, Geol. Rep. of the Midland counties of N. Carolina, 1856, p. 337, Textfig. 10. Nord-Carolina, Keuper.
- P. nodosocostata* Giebel, Pal. Unters. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, X. 1857, p. 309, Taf. II. fig. 7 [= gen. ind. sp. ind., teste *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 17.]
- P. obliqua* v. Haueur, Palaeont. Notizen, Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 153, Taf. II. fig. 9 (non fig. 8 = *Halobia juv.*). — Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 94, Taf. VI. fig. 23, 24. — *Kittl*, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 24. Südalpen, Ladinisch.

- P. obsolete-striata** Tommasi, Fauna calc. conch. di Lombardia, 1894, p. 92, Tav. I fig. 13. — Philippi, Grignageb. Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 727. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 176. Südalpen, Anisisch.
- P. orbicularis** v. Richthofen (1860) vide Pseudomonotis (Claraia) orbicularis.
- P. pannonica** v. Mojsisovics, Üb. ein. Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 437, Taf. XIV. fig. 4. — Kittl, Halobiidae etc., Pal. Bal. 1912, p. 22, Taf. I. fig. 1. Bakony, Nordalpen, Anisisch, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. pannonicae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. fig. 7. Himalaya, Anisisch.
- P. parthanensis** Schafhäutl (1863) vide Daonella parthensis.
- P. (?) pergamenta** Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 104, 112, Taf. II. fig. 14. Anatolien, Norisch.
- P. plana** Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 94, Taf. V. fig. 26. Südalpen, Ladinisch.
- P. praealpina** Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 25, Textfig. 1,2. Nordalpen, Karnisch.
- P. semiradiata* Schafhäutl (1863) vide Halobia rugosa.
- P. stella** Gabb, Palaeont. of California, I. 1864, p. 32, Pl. VI. fig. 31. — v. Wittenburg, Triasfoss. v. Fluss Dulgolach, Trav. Mus. Pierre-le-Grand Acad. sci. St. Pétersbourg, T. IV. 1910, p. 67, Taf. V. fig. 8. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 18. Nevada, Californien — Mittelrias, NE Sibirien — Norisch.
- P. tenuissima** Böhm, Triasverst. v. Bellsunde, Arkif. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 8, Taf. I. fig. 11, 12. Spitzbergen, Skythisch.
- P. triangularis** Emmons, Geol. Rep. Midland counties of N. Carolina, p. 337, Textfig. 5 = sp. incert., teste Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 18. N. Carolina, Keuper.
- P. Wengensis** Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. etc. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 23, Taf. XVI. fig. 12. — Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1856, p. 95, Pl. XIX. fig. 12. — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 76, Taf. XVI. fig. 12. — De Lorenzo, Sul Trias dei dintorni di Lagonegro, Atti Acad. sci. e nat. Napoli ser. 2, Vol. V. 1892, p. 8, Textfig. 2. — Mariani, Note pal. sul Trias d. Carnia occ. Annali Ist. tecn. Udine, ser. 2, Vol. XI. 1893, p. 29, Tav. II. fig. 4. — Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/I, 1895, p. 221. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 9. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 18, Taf. I. fig. 7—11 (var. cycloidalis, p. 20, Taf. I. fig. 6, et var. robusta, Taf. I. fig. 12 inclus.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 177. Non *P. Wengensis* Giebel, Palaeont. Unters. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, X. 1857, p. 308, Taf. II. fig. 6, teste v. Alberti, Überblick üb. d. Trias, 1864, p. 192. Nordalpen, Südalpen, Bakony, Ladinisch, Karnisch.
- P. Wengensis* (Wissm.) var. *alta* Frech (1904) vide *P. Wengensis* var. altior.
- P. Wengensis** (Wissm.) var. altior Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 8 [Nom. nov. pr. *P. Wengensis* var. *alta* Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, I. c. 1904, p. 16, Textfig. 15]. — Kittl, Halobiidae etc. ibidem, 1912, p. 24. Bakony, Anisisch.

- P. cf. Wengensis* (Wissm.) v. Mojsisovics, Üb. ein. Triasverst. aus d. Südalen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 435, Taf. XIV. fig. 2, 3. — Kitl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 21. Nordalpen, Südalen, Ladinisch, Karnisch.
- P. cf. Wengensis* (Wissm.) Parona, Stud. monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 106, Tav. VIII. fig. 10. Südalen, Karnisch.
- P. nov. sp.* Parona, Stud. monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 106, Tav. VIII. fig. 9 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 660.
- P. nov. sp. ind.* v. Arthaber (1896) vide Enteropleura Bittneri.
- P. sp. ind.* Mansuy, Contribut. à la carte géol. Indochine, Paléontol. 1908, p. 62, Pl. XVI. fig. 6. Tonkin, Skythisch.

Fam. Peectinidae Lam.

Gen. **Pecten** Klein.

[Subgen.: **Aequipecten** Fischer, **Amussium** Klein,
Amphijanira Bittner]

(Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 49,
Typ. *P. janirula* Bittner, 1895),

Antijanira Bittner

(ibidem, p. 49, Typ. *P. hungaricus* Bittner, 1901),

Chlamys Bolten, **Entolium** Meek, **Synclonema** Meek,
Variamussium Phil., **Velopecten** Philippi

(Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 600, syn. *Leptochondria* Bittner (Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 103, teste Tornquist, Recoaro, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 136, Salomon, Üb. Pseudomonotis u. Pleuronectites, ibidem, p. 356) inclus.)

P. (Chlamys) acuteauritus Schafhäutl, Neue Petref. d. südbayr. Vorgeb. Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 416, Taf. VII. fig. 10. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 156. — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 105. Nordalpen, Bakony, Rhaetisch.

P. (Velopecten) aeoliensis Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 101, Taf. II. fig. 3, Textfig. Anatolien, Norisch.

P. (Amphijanira) aerophilus Bittner, Brach. u. Lam. aus Bosnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 608, Taf. XXVI. fig. 24. Dinariden, Anisisch.

P. (Velopecten) Albertii Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 138, Taf. CXX. fig. 6 (Monotis) [P. inaequistriatus (Mstr.) l. c. p. 42, Taf. LXXXIX. fig. 1 inclus.]. — Quenstedt, Petrefaktenkunde, 1852, p. 506. — v. Schauroth, Geogn. Verh. v. Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 510 (Avicula). — Bornemann, Verst. im span. Muschelkalk, Zeitschr. D. G. G. VIII. 1856, p. 165. — Giebel, Muschelkalk v. Lieskau, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, VII. 1856, p. 22, Taf. II. fig. 16, 19. — v. Schauroth, Kritisches Verzeichn. d. Verst. d. Trias im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 309. — Berger, Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 169, Taf. III. fig. 1. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 573. — v. Alberti, Überblick üb. d. Trias, 1864, p. 70. — v. Eck, Üb. d. Form. d. bunt. Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 54 (Monotis). — Nöting, Entwickl. d. Trias in

Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 323, Taf. XIV. fig. 1—4 (Monotis.) — Schmid, Das ostthüring. Röth, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1881, p. 142. — Tommasi, Fauna calc. conch. di Lombardia, 1894, p. 94. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 608. — Tornquist, Recoaro, IV., ibidem, LII. 1900, p. 135 (Pleuronectites?). — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 84, Taf. VIII. fig. 34. — v. Linストow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 138, 152. — Philippi, Kontinentale Trias, Leth. Mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 8. — Walther, Zwölftaf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. v. Jena, 1906, p. 23, Taf. IV. fig. 4 (Monotis). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. II. fig. 7, VIII. fig. 35. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 67. — Simeonescu, Fauna trias. inf. Dobrogea, Acad. Romana, V. Bouearest, 1911, p. 65, Textfig. 1. — Kittl, Halobiidae etc. Pal. Bal. 1912, p. 167 (Monotis). — Wurm, Neue Funde aus d. Muschelk. v. Heidelberg, Zeitschr. D. G. G. LXVI. 1914, p. 448, Textfig. 4. — Asmann, Brach. u. Lamellibr. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 598, Taf. XXXI. fig. 16.

Deutschland — Röth bis Grenzdolomit, Spanien — Muschelkalk, Bakony, Dobrudscha — Skythisch, Südalpen — Skythisch, Anisisch.

P. Albertii (G d f.) var. **fassaensis** Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 110, Taf. IV. fig. 34.
Südalpen, Ladinisch.

P. Alberti (G d f.) var. **obliterata** v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 98, Taf. VI. fig. 9.

Deutschland, Lettenkohle.

P. Albertii (G d f.) var. **virgalensis** v. Wittenburg, Lamellibr. d. Salt Rge., Neues Jahrb. f. Min. 1909, I. p. 8, Taf. III. fig. 4 [P. cf. Albertii Waggon, Werfener Schichten i. d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 286 inclus.].
Salt Range Skythisch.

P. Albertii (G d f.) var. **Weissenbachensis** Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 388, Taf. XII. fig. 4.

Nordalpen, Karnisch.

P. (Velopecten) cf. Albertii (G d f.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 34, Taf. IV. fig. 8.
Bakony, Skythisch.

P. sp. ind. aff. Albertii (G d f.) Bittner, Verst. d. Süd-Ussuri-Geb. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VI/1, 1899, p. 6, Taf. II. fig. 1-10. — Bittner, Lamellibr. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 90, Taf. IX. fig. 42.
Ussuribucht, Bakony, Skythisch.

P. sp. ind. aff. Albertii (G d f.) Dienner, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triassic faunae of Kashmir, 1913, p. 93, Pl. XII. fig. 14.
Himalaya, Anisisch.

P. alternans Goldfuss (1838), Münster (1841) vide P. subalternans.

P. Ambrosinii Mariani, Contr. allo stud. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 246, Tav. IX. fig. 10, 11. [P. cassianus Stoppa (non d'Orbigny), ex parte, Pal. Lomb. I. Pétr. d'Esino, 1859, p. 100, Pl. XXI. fig. 2 inclus.].
Südalpen, Ladinisch.

P. amphidoxus Bittner, Brach. u. Lamellibr. aus Besnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 594, Taf. XXVI. fig. 23.

Dinariden, Anisisch.

P. amuricus Bittner, Verst. d. Süd-Ussur-Geb. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 5, Taf. II. fig. 23—28.
Ussuribucht, Skythisch.

- P. anceps* Tommasi, Foss. di Ghogna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 17, Tav. II. fig. 2. Südalpen, Karnisch.
- P. Andraei* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. R. G. A. XVIII/1, p. 156, Taf. XXIV. fig. 16. Südalpen, Karnisch.
- P. (Antijanira) arpadieus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 50, Taf. VI. fig. 4. Südalpen, Karnisch.
- P. (Velopecten) Arthaber* Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 105, Taf. XXXIV. fig. 28. Bakony, Karnisch.
- P. asperulatus* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 156, Taf. XVIII. fig. 26. Südalpen, Karnisch.
- P. (Antijanira) auristriatus* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. etc. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 73, Taf. VI. fig. 35. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. 1895, p. 165. Südalpen, Karnisch.
- P. (Antijanira) cf. auristriatus* (Mstr.) Bittner, l. c. p. 165, Taf. XIX. fig. 23—26. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 47, Taf. VI. fig. 1. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 173, Taf. XIX. fig. 22. Südalpen, Karnisch.
- P. nov. sp. ind. aff. auristriato* (Mstr.) Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 29, Textfig. 42. Bakony, Kardisch.
- P. (Antijanira) avaricus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 49, Taf. VI. fig. 3. Bakony, Karnisch.
- P. (?) aviculoides* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 77, Pl. XIV. fig. 7. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 158. — Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 70, Tav. V. fig. 20—23. Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
- P. Azzarolae* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 77, Pl. XV. fig. 1. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 159. Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.
- P. badiotius* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 163, Taf. XIX. fig. 31. Südalpen, Karnisch.
- P. balatonicus* Bittner, Lam. a. d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 37, Taf. V. fig. 9—11. Bakony, Karnisch.
- P. barnensis* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1862, p. 78, Pl. XV. fig. 2. Südalpen, Rhaetisch.
- P. bavaricus* Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 469, Taf. V. fig. 12. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Nat. Ges. Bern, 1869, p. 81, Taf. III. fig. 11. Nordalpen, Schweiz, Rhaetisch.
- P. (Aequipecten) Bayzandi Healey*, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 48, Pl. VII. fig. 12. Burma, Rhaetisch.
- P. Bereiglii Martelli*, Il livello di Wengen nel Montenegro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 347, Tav. XI. fig. 40, 41. Dinariden, Ladinisch.
- P. biformatus* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 59, Pl. X. fig. 23, 24. Himalaya, Norisch.

- P. (Velopeeten) cf. *Braumsii* (Kronecker) Goetel, Rhaet. Stute d. subtatr. Zone d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A., 1916, p. 139. Karpathen, Rhaetisch.
- P. *Breislakii* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 137, Pl. XXXI. fig. 16. Südalpen, Rhaetisch.
- 66 P. *Broili* Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 90, Taf. VI. fig. 8—12 [P. sp. ind. Broili, Pachycardi entuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 174, Taf. XIX. fig. 25 inclusus.]. Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
- P. *Brugnatellii* Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 18, Tav. II. fig. 3—5. Südalpen, Karnisch.
- P. (Aequipeeten) *buriticus* Krumbeek, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontogr. Suppl. IV. 1913, p. 121, Taf. II. fig. 13—15. Indonesien, Norisch.
- P. *Cainallii* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 102, Pl. XXIV. fig. 10. Südalpen, Ladinisch.
- P. *cancellans* Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 712, Textfig. 41, — Kittl, Triasbild. d. NE. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 517. Dobrudscha, — Anisisch, Dinariden — Anisisch, Karnisch.
- P. cassianus* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1858, p. 100, Pl. XXI. fig. 2 [non *P. cassianus* d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 201 = *P. multiradiatus* v. Klipstein] vide P. Portai Marianii et P. Ambrosinii Marianii.
- P. *Chabrangensis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 137, Pl. XXIV. fig. 10, 11. Himalaya, Norisch an? Rhaetisch.
- P. *Ciampini* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 99, Pl. XX. fig. 10, 11. — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. p. 112. Südalpen, Ladinisch.
- P. *cisloneensis* Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlerndol. Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 603, Taf. VIII. fig. 11. — Bittner, Lam. v. St. Cassian Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 155 [P. cf. subalternans (d'Orb.) Polifka, l. c. p. 603, Taf. VIII. fig. 10 inclusus.]. — Wilekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, 1909, p. 141, Taf. VI. fig. 10. Südalpen, Ladinisch.
- P. *Cismonis* (Meneghini) Del Campana, Foss. dol. princ. d. valle del Brenta, Boll. Soc. geol. Ital. XXVI. 1907, p. 469, Tav. XV. fig. 1—4. Südalpen, Lias, auch Hauptdolomit.
- P. (Aequipeeten) *Clignetti* Krumbeek, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontogr. Suppl. IV. 1913, p. 36, Taf. II. fig. 1—8, IV. fig. 29, XI. fig. 1. [P. sp. aff. monilifero Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 98, Pl. XVIII. fig. 4 inclusus.]. Himalaya, Indonesien, Norisch.
- P. Clignetti var. glabra* Krumbeek (1913) vide P. Krumbeekii.
P. cloacinus Quenstedt (1856) vde P. (Chlamys) Valoniensis.
- P. *Codenii* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 99, Pl. XX. fig. 12, 13. Südalpen, Ladinisch.
- P. compressus* Stoppani (1860) vide Pleuronectites compressus.
- P. (Chlamys) *concentrico-striatus* M. Hoernes, Gastr. u. Aceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 54, Taf. II. fig. 22. — Marianii, Note pal. sul Trias sup. d. Carnia occ. Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, Vol. XI. 1893, p. 18,

- Tav. II. fig. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 184, Tav. XV. fig. 5. Nordalpen — Norisch, Südälpen — Ladinisch.
- P. (Chlamys) cf. concentric-striatus (Hoern.) Kittl, Triasbild. d. NE. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 485. Dobrudscha, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. concentric-striato (Hoern.) Simionescu, Fauna trias. Desli-Caira, Acad. Romana, IV. Boucarest, 1910, p. 482, Textfig. 24. Dobrudscha, Ladinisch.
- P. constrictus Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 163, Taf. XIX. fig. 27. Südälpen, Karnisch.
- P. contemptipilis Stoppiani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 102, Pl. XXI. fig. 11, 12. Südälpen, Ladinisch.
- P. (Aequipecten) coronatus Schafhäutl, Neue Petref. d. südbayr. Vorgeb., Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 419 (Lima). — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 470, Taf. VI. fig. 3. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 157. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 96. Nordalpen, Rhaetisch.
- P. (Velopeceten) Csapakensis Frech, Nachträge z. Ceph. u. Zweischal. d. Bak. Trias, Pal. Bal. 1905, p. 4, Textfig. 5. Bakony, Skythisch.
- P. eutiformis M. Hoernes, Gastr. u. Acephal. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 53, Taf. II. fig. 20. Nordalpen, Hallstätter Kalk.
- P. Damesi Böhm, Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 22, Taf. II. fig. 22. Bäreninsel, Karnisch.
- P. (Chlamys) decoratus v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 250, Taf. XVI. fig. 9. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, p. 159. — Waggen, Lam. d. Pachycardientuffe etc., ibidem, XVIII/2, 1907, p. 107, Taf. XXXIV. fig. 29. Südälpen, Karnisch.
- P. (Entolium) Deecke Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 92, Taf. VI. fig. 8. — v. Wehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 172, Taf. IX. fig. 1, 2. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lam., ibidem, LII. 1900, p. 82. Südälpen, Karnisch.
- P. deformis Gabb, Palaeontol. of California I. 1864, p. 33, Pl. VI. fig. 34. Californien, Norisch.
- P. deformis (Gabb) var. polaris v. Wittenburg, Üb. Triasfoss. vom Fl. Dulgolach, Trav. Mus. géol. Pierre-le-Grand, Acad. sci. St. Petersbourg, IV. 1910, p. 64, Taf. V. fig. 4—6, Textfig. 1. NE. Sibirien, Norisch.
- P. Desiderii Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 33, Taf. VI. fig. 12, 13. Bakony, Karnisch.
- P. (Entolium) discites v. Schlotheim, Petrefaktenkde. 1820, p. 218, Nachträge, II. 1822, p. 111, Taf. XXXV. fig. 3 (Ostracites Pleuronectites) — Brönn in Leonhard u. Brönn's Jahrb. f. Min. I. 1829, p. 76. — v. Zieten, Versteinerungen Württembergs, 1833, Taf. LII. fig. 5, LXIX. fig. 5. — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1868, p. 73, Taf. XC VIII. fig. 10. — Dunker, Programm Gewerbeschule Cassel, 1849, p. 7. — Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes in NW. v. Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes in NW. Deutschl. Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 138, — v. Hauser,

Üb. d. v. Bergr. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss., Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 12. — Dunker, Üb. d. im Muschelk. Oberschlesiens ges. Mollusken, Palaeontogr. I. 1851, p. 290. — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkde., 1852, Taf. XL. fig. 40. — v. Schaueroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 508. — Giebel, Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 18, Taf. II. fig. 3, 8. — Bronn, Lethaea geogn. 3/III. 1856, Taf. XI fig. 12. — v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform., Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 96. — v. Seebaach, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 575 (Craniolites Schroeteri v. Schlotheim, Petrefaktenkde., 1820 p. 247, Taf. XXVIII. fig. 5b [nec 5a nec 6] inclus.). — v. Alberti, Überblick üb. d. Trias, 1864, p. 73. — Nöetling, Entwicklg. d. Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 322. — Tommasi, Fauna calc. conch. di Lombardia, 1894, p. 88. — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 109, 145, Taf. IV. fig. 20—26. — Philippi, Grignageb., Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 725. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 140. — Salomon, Üb. Pseudomonotis u. Pleuronectites, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 352. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr., ibidem LII. 1900, p. 79, Textfig. 3. — Waagen, Werfener Schichten i. d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 286. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 97, Taf. VIII. fig. 25. — Philippi, Kontinent. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 9. — Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 88, Taf. VI. fig. 1. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsdst. etc. v. Jena, 1906, Taf. V. fig. 23. — Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. L. 1906, p. 58. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias Taf. VIII. fig. 37, IX. fig. 3. — Schmidt, Wellengeb. v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. d.stat. Landesamtes, Stuttgart, No. 3, 1907, p. 75, Taf. I. fig. 2, Textfig. 3. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 68. — Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 144. — Simionescu, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. IV. Bouarest, 1910, p. 511, Textfig. 19. — Tommasi, Fauna anisica di Valsecca, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XLVI. Milano, 1913, p. 776. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, p. 599, Taf. XXXI. fig. 22, 23. — Wurm, Trias v. Catalonien, Zeitschr. D. G. G. LXXIX. 1919, Monatsber. p. 157.

Deutschland — Röth bis Grenzdolomit, Südalpen — Skythisch bis Ladinisch, Bakony — Anisisch, Basilicata — Ladinisch, Dobrudscha — Karnisch (?), Catalonien — Obertrias, Salt Range — Skythisch.

P. discites v. Schaueroth (1850), Stoppiani (1859) vide *P. pseudodiscites*, Törnquist, Recoaro, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 134, Taf. III. fig. 7 vide *P. liscaviensis*.

P. discites var. *inornata* Philipp (1904) vide *P. H. Philippi*.

P. (Entolium) discites var. *microtis* Bittner, Verst. d. Süd-Ussuri-Geb. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 2, Taf. I. fig. 12—18. — Waagen, Werfener Schichten i. d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 286. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 90, Taf. IX. fig. 43—45. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 34, Taf. I. fig. 4. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 24 (272), Taf. II (XXXVII), fig. 10, 11 (*P. microtis*). — v. Wittenburg, Ein. neue Foss. aus d. Werfener Schichten Südtirols, Neues Jahrb. f. Min. 1908 I, p. 20, Taf. II. fig. 9—11. (*P. microtis*)' — Wilckens, Pal.

Unters. triad. Faunen v. Predazzo, l. c. 1909, p. 145. — B ö h m ,
Triasverst. v. Bellsunde, Arkiv. f. Zool. Svenska Vet. Akad.
VIII/2, Stockholm, 1912, p. 4.

Ussuribucht, Salt Range, Südalpen, Bakony, Spitzbergen,
Skythisch.

P. (*Entolium*) *discites* var. *tenuistriata* Graf zu Münster, in
Goldfuss, Petref. Germaniae, II. 1838, p. 42, Taf. LXXXVIII.
fig. 12 (P. *tenuistriatus*). — Schmidt et Schleiden,
Geogn. Verh. Thüringens etc. 1846, Taf. IV. fig. 4 (P. *tenui-*
striatus). — v. Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschel-
kalkes im NW. Deutschld., Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 139
(P. *tenuistriatus*). — Giebel, Lieskau, 1856, p. 16, Taf. II.
fig. 20a, b (P. *tenuistriatus*) — v. Schauroth, Schaltierreste
d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 97. —
v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin,
1859, p. 307, Taf. II. fig. 7. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias,
1864, p. 74. — v. Linストow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß.
Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 139 (? = P. *Albertii*). — Kittl,
Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 730.

Deutschland — Muschelkalk, Südalpen — Anisisch,
Dinariden — Karnisch.

P. sp. ind. aff. *discites* (Schloth.) Tommasi, Fauna Trias
infer. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 48, Tav. III. fig. 5.
Südalpen, Skythisch.

P. sp. ind. ex aff. *discites* (Schloth.) W n r m , Trias v. Aragonien,
Zeitsch. D. G. G. LXIII. 1911, p. 101, Taf. VI. fig. 7.
Aragonien, Muschelkalk.

P. *versus* Stoppa n i, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 101,
Pl. XXI. fig. 3.
Südalpen, Ladinisch.

P. *dolomiticus* Benecke, Üb. ein. Muschelkalk-Ablagerungen d.
Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868. p. 11, Taf. I. fig. 18.
Südalpen, Skythisch.

P. *duronicus* v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols,
Koken's Geol. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 20 (268),
Taf. I. (XXXVI), fig. 7, 8.
Südalpen, Skythisch.

P. Egidii Venantii Tommasi, Revisione fauna dolomia princ.
Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 96, Tav. XVI. fig. 3. — Di
Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912,
p. 66, Tav. VIII. fig. 18, 19.
Südalpen, Sizilien, Hauptdolomit.

P. esinensis Stoppa n i, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 99,
Pl. XX. fig. 8, 9.
Südalpen, Ladinisch.

P. *eurasiaticus* v. Wittenburg, Neue Beitr. z. Geol. etc. d.
Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 72,
Textfig. 2. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols,
Konken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908,
p. 22 (270), Taf. I (XXXVI) fig. 5.
Südalpen, Skythisch.

P. (*Aequipecten*) *Falgeri* Merian, in Escher v. d. Linth,
Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, Nouv. Mém. Soc. helvét.
sci. nat. Zurich, XIII. 1853, p. 19, Taf. III. fig. 17, 18. — v.
Dittmar, Contortazone, 1864, p. 159 [? P. Zanichellii
Stoppa n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863,
p. 138, Pl. XXXII. fig. 1 inclus.]. — Martin, Etage Rhétien,
1865, p. 245. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf.
Ges. Bern, 1869, p. 79, Taf. III. fig. 6. — Philipp, Morphol.
u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 96. —
Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad.
sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 150.

Nec P. *Falgeri* Stoppa n i, l. c. 1861, p. 78, Pl. XIV. fig. 3, nec
Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. Ist.
Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 69, Tav. V. fig. 14—19 = P. Foi-

- piani Stopp p., teste v. Dittmar, Contortatone, 1864, p. 158.
Schweiz, Nordalpen, Savoyen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- P. fassaensis** Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 91, Taf. VI. fig. 16, 17. — Südalpen, Ladinisch.
- P. (Chlamys) Favrii** Stoppaani, Pal. Lomb. III. Couches à A. contorta, 1863, p. 209, Pl. XXXVI. fig. 6. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 146.
Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- P. Favrii (Stoppa)** var. **tatren** Goetel, l. c. p. 148, Taf. VIII. fig. 11. — Karpathen, Rhaetisch.
- P. Ferrerii** Tommasi, Rev. fauna dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 96, Tav. XVI. fig. 2.
Südalpen, Hauptdolomit.
- P. (Entolium) filosus** v. Haauer, Beitr. z. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 561, Taf. VI. fig. 13—16. — Parona, Studio monograph. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 87, Tav. VI. fig. 1—5. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, VIII. 1890, p. 17. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 653. — Fiedler, Verst. d. Arlbergschichten bei Bludenz, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, Briefl. Mitt. p. 10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. Mes. I/3, 1906, Taf. XLI. fig. 3.
non **P. filosus** v. Woehrmann, Fauna d. Cardita Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 204, Taf. VII. fig. 3, 4 [= **P. inconditus** Bittn.] — Nordalpen, Südalpen, Karnisch.
- P. limbriatus** Mansuy, Paléontol. du Yunnan orient. Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 129, Pl. XXIV. fig. 4.
Yunnan, Obertrias ?.
- P. flagellum** Stoppaani (1860) vide Pleuronectites flagellum.
- P. (Aequipeeten) Foipiani** Stoppaani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 75, Pl. XIV. fig. 1, 2. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 158 [P. Falgeri Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 7, Stoppaani, l. c. p. 76, Pl. XIV. fig. 3 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 246. — Di Stefano, Rhaet. Foss. d. Apuanischen Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 98 [P. Falgeri Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, V. 1866, p. 69, Tav. V. fig. 14—19, P. janiriformis Capellini (non Stoppaani), ibidem, p. 70, Tav. VI. fig. 1—3 inclus.]. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 96.
Nordalpen, Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
- P. forojuiliensis** Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 83, Tav. VIII. fig. 13 [Nom. nov. pr. sp. P. ind. Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, VIII. p. 19, Tav. I. fig. 5.].
Südalpen, Karnisch.
- P. Fuchsii** v. Haauer (1850) vide Pseudomonotis (Eumorphotis) Fuchsii.
- P. granulocostatus** v. Klipstein, Östl. Alped, 1843, p. 213, Taf. I. fig. 13. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 161.
Südalpen, Karnisch.
- P. Guembeli** v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 158 [Nom. nov. pr. P. striatocostatus v. Guembel (non Goldfuss), Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 404 (deest imago)].
Nordalpen, Rhaetisch.
- P. (Entolium) Hallensis** v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 203, Taf. VI. fig. 12, 13. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, ibidem. XLIII. 1893, p. 654 [P. Tommasii Parona, Studio mon. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 90, Tav. VI. fig. 6 inclus.]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLII. fig. 6.
Nordalpen, Südalpen, Karnisch.

- P. (*Entolium*) *Hallensis* var. *Weissenbachensis* Touloua, Schichten m. Gerv. Bouei etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 386, Taf. XII, fig. 3. Nordalpen, Karnisch.
- P. (*Entolium*) *Hehlii* (D'Orbigny, 1850) Stoppiani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. concorta, Append. 1865, p. 209, Pl. XXXVI. fig. 7. — Martin, Zone à Av. contorta de la Côte d'Or, Mém. Acad. Dijon, XI. 1863, p. 38. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 80, Taf. III. fig. 7. — Principi, Studio geol. d. Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 197. — Goetzel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 157. Schweiz, Frankreich, Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen — Rhaetisch, sonst Lias.
- P. *Hellii* Emmerich (non Hehlii d'Orbigny), Geogn. Beobacht. aus d. östl. bayr. etc. Alpen, Jahrb. G. R. A. IV. 1853, pr. 367. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 158. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 105, Taf. VIII. fig. 36, 37 [P. filosus aut. im Rhaet inclus.]. Nordalpen, Bakony, Rhaetisch.
- P. *hiemalis* Teller, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arkt. Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Petersbourg, sér. 7, XXXIV. No. 6, 1886, p. 135, Taf. XIX. fig. 11—13. Nordsibirien, Norisch.
- P. (*Aequipeeten*) H. Philippi Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 146 [Nom. nov. pr. P. discites var. inornata Philipp., Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 54, Taf. II fig. 6, 7 et P. tirolicus v. Wittenburg (nom. praecoccup.), Ein. neue Foss. auf d. Werfener Schichten Südtirols, Neues Jahrb. f. Min. 1908, I. p. 17, Taf. II. fig. 2, 6, Textfig. 2—4, Neue Beitr. z. Geol. etc. d. Werfener Schichten Südtirols, Centralbl. f. Min. 1908, p. 73 Textfig. 3, 4, Werfener Schichten Südtirols, Kokons Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 23 (271), Taf. I. (XXXVI. fig. 10—13, II. (XXXVII), fig. 1—3.). Südalpen, Skythisch.
- P. (*Antijanira*) *hungaricus* Bittner, Lam. d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 48, Taf. VI. fig. 2. Bakony, Karnisch.
- P. *Imaniae* Tommasi, Revis. fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 96, Tav. XVI. fig. 1. Südalpen, Hauptdolomit.
- P. *imparieostatus* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 162, Taf. XIX. fig. 7. Südalpen, Karnisch.
- P. (*Chlamys*) *inaequialternans* Parona, Studio mon. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 89, Tav. VI. fig. 7. [Syn. cf. P. *subalternans*.] Nordalpen, Südalpen, Karnisch.
- P. (*Velepeeten*) *inaequistriatus* Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 42, Taf. LXXXIX. fig. 1. — Geinitz, Versteinerungskunde, 1846, p. 458, Taf. XX. fig. 2. — Bronn, Leth. geogn. III/3, 1856, p. 65, Taf. XIII. fig. 7. — Giebel, Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 21, Taf. II. fig. 18. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. 1861, p. 574, 577. — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 43, Taf. I. fig. 6. — v. Linstow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuss. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 152. — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 102, Taf. VI. fig. 8—10. Non P. *inaequistriatus* Stoppiani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 100, Pl. XXI. fig. 1, teste Bittner, Lam. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 45. Deutschland — Muschelkalk, Lettenkohle, Aragonien — Muschelkalk, Bogdo (Südrussland) — Skythisch.

- P. (*Amussium*) *inconditus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 35. [Nom nov. pr. P. *filosus* Woehrmann, Fauna d. Cardita Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 204, Taf. VII. fig. 3, 4].
Nordalpen, Südalpen, Bakony, Karnisch.
- P. *Ineonspicuus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 43, Taf. V. fig. 20, 21.
Bakony, Karnisch.
- P. *induplicatus* v. Guembel, Bayr. Alpengeb. 1861, p. 404. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 158. [deest imago].
Nordalpen, Rhaetisch.
- P. *inornatus* Stoppa, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 102, Pl. XXI. fig. 7—9. — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 147, Taf. IV. fig. 19.
Südalpen, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. *inornatus* (Stoppa) Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 111, Taf. II. fig. 18.
Anatolien, Norisch.
- P. *intercedens* Bittner, Lamellibr. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 160, Taf. XIX. fig. 5.
Südalpen. Karnisch.
- P. *interruptus* Bittner, Pal. Ind. ser. IV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lamellibr. p. 60, Pl. X. fig. 22.
Himalaya, Norisch.
- P. *interstriatus* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 72, Taf. VI. fig. 32. — D'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 202. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 159, Taf. XIX. fig. 1—4 [P. Nerei Laubé (non Mstr.), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 70, Taf. XX. fig. 5 (non 3) inclus.]. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LIII. 1900, p. 96. — Philipp, Pal. Unters. Predazzo, ibidem, LVI. 1904, p. 92, Taf. VI. fig. 5. — Toulou, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 107, Taf. VI. fig. 51.
Südalpen — Ladinisch, Karnisch, Nordalpen — Karnisch.
- P. (*Chlamys*) *janiriformis* Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 76, Pl. XIV. fig. 4—6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 457 [P. squamuliger v. Guembel, Bayr. Alpengeb. 1861, p. 404 inclus.]. — Non *P. janiriformis* Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, V. 1866, p. 70, Tav. VI. fig. 1—3, teste De Stefanii, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 98.
Südalpen, Südalpen, Rhaetisch.
- P. (*Amphijanira*) *janirula* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 160, Taf. XIX. fig. 17, 18 [Typ. P. Protei Laubé (non Mstr.) Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 71, Taf. XX. fig. 6.].
Südalpen, Karnisch.
- P. (*Amphijanira*) *janirulaeformis* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 45, Taf. VI. fig. 10.
Bakony, Karnisch.
- P. (*Entolium*) *Kellneri* Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 709, Textfig. 36.
Dinariden, Anisisch.
- P. *Kokeni* v. Wittgenburg, Lam. d. Salt Range, Neues Jahrb. f. Min. 1909 I. p. 7, Taf. II. fig. 3, 4.
Salt Range, Skythisch.
- P. *Krumbecki* Jaworski, Nucula-Mergel v. Misol, Pal. v. Timor, II/5, 1915, p. 100, Taf. XLIV. fig. 2 [Nom. nov. pr. Peeten Cignetti var. *glabra* Krumbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontogr. Suppl. IV. 1913, p. 43, 145, Taf. II. fig. 9—12].
Indonesien, Norisch.
- P. lacvistriatus* v. Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb., 1861, p. 275 deest imago = Nom. non valid.

- P. landranus* Bittner, Fam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 166, Taf. XIX, fig. 21. Südalpen, Karnisch.
- P. cf. landranus* (Bittn.) Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 173, Taf. XIX, fig. 26. Südalpen, Karnisch.
- P. sp. ind. aff. landrano* (Bittn.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 138, Pl. XXIV, fig. 7. Himalaya, Norisch an? Rhaetisch.
- P. (Entolium) lavaredanus* Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 46, Textfig. 65. Südalpen, Karnisch.
- P. (Entolium) cf. lissianus* (Nystr.) Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 158. Karpathen, Rhaetisch.
- P. Liebigii* Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 468, Taf. VI, fig. 1. Nordalpen, Rhaetisch.
- P. hennensis* Mariani, Contrib. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 245, Textfig. Südalpen, Ladinisch.
- P. limoides* v. Guembel, Bayr. Alpengeb. 1861, p. 275 = sp. non valida.
- P. (Entolium) liscaviensis* Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 20, Taf. II, fig. 1. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 76. — Tornquist, Recoaro etc., Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 134, Taf. III, fig. 7 (P. discites). — Schmidt, Wellengob. v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. d. Stat. Landesamtes, Stuttgart, No. 3, 1907, p. 75, Textfig. 2.
- Non *P. liscaviensis* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 102, Pl. XXI, fig. 6 [= *P. discites* Schlotheim, teste Mariani, Contrib. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano XLVI. 1907, p. 254.] Deutschland — Muschelkalk, Südalpen, — Anisisch.
- P. longauris* v. Wittenburg, Ein. neue Foss. aus d. Werfener Schichten Südtirols Neues Jahrb. f. Min. 1908 I. p. 19, Taf. II, fig. 8. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols. Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1913, p. 24 (272), Taf. II (XXXVII) fig. 7. Südalpen, Skythisch.
- P. Luani* Renevier (1865) vide *P. (Chlamys) Winkleri*.
- P. lugdunensis* Merian (1853) vide *P. (Chlamys) Valoniensis*.
- P. magneauritus* Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 711, Textfig. 39. Dinariden, Anisisch.
- P. (Variamussium) margariticostatus* Diener, Himal. Foss., Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 97, 131, Pl. XVIII, fig. 1—3. Himalaya, Norisch.
- P. margaritiferus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 34, Taf. VI, fig. 11. Bakony, Karnisch.
- P. (?) Margheritae* v. Haauer, Über d. v. Bergr. Fuchsi d. Venet. Alpen ges. Foss., Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 14, Taf. IV, fig. 13. — Benecke, Üb. ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen, Beneckes Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 22. Südalpen?
- P. marginiplicatus* Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 711, Textfig. 38. Dinariden, Anisisch.
- P. Massalongi* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1864, p. 208, Pl. XXXVI, fig. 1 [non 1861, p. 77, Pl. XIV, fig. 8—12 = *P. Schafhäutli*, teste v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 157.]. Französ. Alpen, Rhaetisch.

- P. sp. ind. aff. Massalongi** (Stoppe), Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnian a. noric faunae of Spiti, p. 131, Pl. XXII. fig. 10. Himalaya, Norisch.
- P. (Chlamys) Mayeri** Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 469, Taf. VI. fig. 2. — v. Dittmar, Contortazone, 1861, p. 157. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 245. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 149. Nordalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- P. Mentzeliae** Bittner, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 610, Taf. XXVI. fig. 26—28. Dinariden, Anisisch.
- P. Meriani Stabile**, Foss. des environs du Lac de Lugano, Atti Soc. Elvet. sci. nat. Lugano, 1861, p. 29. — Mariaani, Foss. Trias med. Portovaltravaglia, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 44, Textfig. Südalpen, Anisisch.
- P. (Aequipeeten) microglyptus** Böttger, Tertiärform. v. Sumatra, Palacontogr. Suppl. III. 1880, p. 50, Taf. IV. fig. 5 (caet. exclus.). Krumbeek, Ob. Trias v. Sumatra, ibidem, Suppl. IV. Beitr. Pal. Niederl. Indien, II/3, 1914, p. 237, Taf. XV. fig. 7—14. Sumatra, Norisch.
- P. (Aequipeeten) sp. ind. aff. microglypti** (Böttger) Krumbeek, l. c. p. 239, Taf. XV. fig. 15 [Typ. P. microglyptus Böttger, l. e. p. 50, Taf. IV. fig. 2, caet. exclus.]. Sumatra, Norisch.
- P. microtis* v. Wittenburg (1908) vide P. discites var. microtis.
- P. (Chlamys) Middlemissii** Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 111, Pl. XIII. fig. 20. Himalaya, Karnisch.
- P. misolensis** Wanner, Neues üb. d. Perm-, Trias- u. Juraform. d. indoaustral. Archipels, Zentralbl. f. Min. 1910, p. 738. — Jaworski, Nucula-Mergel v. Misol, Palaeontol. v. Timor, II/5, 1915, p. 96, Taf. XLIII. fig. 21—23, XLIV. fig. 1, 4, 6 (var. glabra, l. c. p. 100, Taf. XLIV. fig. 3, 5 inclus.). Indonesien, Norisch.
- P. (Aequipeeten) moniliferus** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 72, Taf. VII. fig. 4. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 157, Taf. XVIII, fig. 29, 30. — Philipp, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 96. Südalpen, Karnisch.
- P. (Aequipeeten) sp. ind. aff. monilifero** Diener (1908) vide P. (Aequipeeten) Clignetti.
- P. Morrisi** Giebel, Lieskau, 1856, p. 18, Taf. II. fig. 15. [= P. discites Schlotheim, teste v. Seebach, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 576.]
- P. (Chlamys) Mortilleti** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 208, Pl. XXXVI. fig. 3. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 149, Taf. IX. fig. 1. Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- P. multiradiatus** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 250, Taf. XVI. fig. 10, 14 [= Daonella cf. cassiana Mojs., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 164].
- P. mysieus** Bittner, Triaspotref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 110, Taf. II. fig. 7, 8. Anatolien, Norisch.
- P. Nerei** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 72, Taf. VI. fig. 27. — D'Orbigny, Prodrome. I. 1849, p. 202.
- Non **P. Nerei Laubé**, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 70, Taf. XX. fig. 3 (= P. subaequicostatus Bittn.), fig. 5 (= P. interstriatus Mstr.). Südalpen, Karnisch.

- P. nodulifer* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 163, Taf. XIX. fig. 31. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 173, Taf. XIX. fig. 24. Südalpen, Karnisch.
- P. Nordenskioeldi* Böhm, Triasverst. v. Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 4, Taf. I. fig. 5, 6. Spitzbergen, Norisch.
- P. octoplectus* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 72, Taf. VI. fig. 26 = Gen. ind. teste Bittner, Lam. v. St. Cassian Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 161.
- P. octoplicatus* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 162, Taf. XIX. fig. 19. Südalpen, Karnisch.
- P. (Entolium) Oebergi* Lundgren, Jura- u. Triasfoss. v. Spitzbergen, Bihang Svenska Vet. Akad. Handl. VIII/12, Stockholm, 1883, p. 19, Taf. II. fig. 15. — Böhm, Obertriad. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 21, Taf. II. fig. 14, 20. — Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d, Norweg. Arct. Exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 27. Spitzbergen, Bäreninsel, Ellesmereland, Karnisch.
- P. (Entolium) cf. Oebergi* (Lundgr.) Kittl, l. c. p. 26, Taf. II. fig. 8. Ellesmereland, Karnisch.
- P. (Chlamys) Oscar Kittl*, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. Exped. 1907, p. 27, Taf. II. fig. 9, 10. Ellesmereland, Karnisch.
- P. Paronai Tommasi*, Foss di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 20, Tav. II. fig. 10, 11. Südalpen, Karnisch.
- P. (Antijanira) Peisonis* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 51, Taf. VI. fig. 6. Barkony, Karnisch.
- P. perglaber* v. Guembel, Bayr. Alpengeb. 1861, p. 275 = Sp. non valid.
- P. (Entolium) pervulgatus* Bittner, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 609, Taf. XXVI. fig. 25. Dinariden, Anisisch.
- P. Porschel Toula*, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 107, Taf. VII. fig. 52. Nordalpen, Karnisch.
- P. Portai Mariani*, Contrib. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 246, Tav. X. fig. 2 [P. cassianus Stoppanni (non D'Orbigny) ex parte, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 100, Pl. XXX. fig. 2 inclus.]. Südalpen, Ladinisch.
- P. praemissus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 38, Taf. V. fig. 12—14. 1901, p. 38, Taf. V. fig. 12—14. Bakony, Karnisch.
- P. cf. praemissus* Bittner, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien etc. Jahrb. G. R. A. LII, 1902, p. 594. Dinariden, Anisisch.
- P. predazzensis* Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 92, Taf. VI. fig. 13—15. Südalpen, Ladinisch.
- P. Protei* Graf zu Münster (1841) vide Lima Protei, Laubé (1885) vide P. janirula.
- P. pseudodiscites* v. Guembel, Geogn. Beschreibung d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 403, v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 160 (deest imago) = Sp. non val.

- P. *pseudodiscites* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 38. [Nom. nov. pr. P. discites v. Schaueroth (non Schloth.) Krit. Verzeichn. d. Verst. d. Trias im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 307, Taf. II. fig. 6, Stoppanni, Pal. Lomb. I. Petrif. d'Esino, 1859, p. 101, Pl. XXIV. fig. 1].
Südalpen, Anisisch, Ladinisch.
- P. (*Amussium*) sp. ind. aff. *pumilo* (L m.) v. Loezy, Wissenschaftl. Ergebni. d. Reise d. Grafen B. Szechenyi etc. III. 1899, p. 142, Taf. X. fig. 6, 7.
Yunnan, Karnisch (?)
- P. *pusillus* Berger, Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 169, Taf. III. fig. 2, 3.
Thüringen, Röth.
- P. (*Synelonema*) *quotidianus* Healey, Fauna of the Napeng beds of Burma, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 46, Pl. VII. fig. 4—11.—Mansuy, Mission Zeil dans le Laos, Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 50.
Burma, Laos (Indochina), Rhaetisch.
- P. (*Entolium*) sp. ind. aff. *quotidiano* (Heal.) Krumbeek, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontogr. Suppl. IV. 1914, p. 241, Taf. XV. fig. 16, 17.
Sumatra, Norisch.
- P. *rariostatus* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols. IV. 1841, p. 72, Taf. VI. fig. 28.
Südalpen, Karnisch.
- P. *Reposii* Mariani, Contrib. allo studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 15, Tav. IX. fig. 12. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 17, Tav. II. fig. 2.
Südalpen, Karnisch.
- P. (*Velopecten*) *reticulatus* v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkde., 1823, p. 43, Taf. XLV. fig. 2. — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 43, Taf. LXXXIX. fig. 2. — Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 23. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 572. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 72. — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 112. — v. Linstow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 138. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. VIII. fig. 30. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, ibidem, XXXVI/1, 1915, p. 598, Taf. XXXI, fig. 17—21 [P. Arthaber Waagen (1907) inclus.].
Deutschland, Muschelkalk.
- P. *rhaeticus* v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 401 (deest imago). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 158.
Nordalpen, Rhaetisch.
- P. *Rombergi* v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 21 (269), Taf. I (XXXVI), fig. 4.
Südalpen, Skythisch.
- P. *Rosaliae* Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 109, Taf. IV. fig. 27.
Südalpen, Ladinisch.
- P. *Rotai* Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 20, Tav. II, fig. 9.
Südalpen, Karnisch.
- P. *Saccol Parona*, Studio mon. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 90, Taf. VI. fig. 9—11. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 654.
Südalpen, Karnisch.
- P. cf. *Saccol* (Par.) Gortani, Nouvi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 83, Tav. VII. fig. 15.
Südalpen, Karnisch.

- P. sp. ind. aff. *Saccoi* (Par.) *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 167, Taf. XIX. fig. 22. — *Bittner*, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 40. Südalpen, Bakony, Karnisch.
- P. salinarius* v. *Schlotheim*, Petrefaktenkde., 1820, p. 120. = *Halobia salinarum* *Bronn* et *Monotis salinaria* *Bronn*.
- P. *Salomoni Tommasi*, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 19, Tav. II. fig. 6—8. Südalpen, Karnisch.
- P. (*Aequipeeten*) *Sandbergeri* v. *Klipstein*, Östl. Alpen, 1843, p. 251, Taf. XVI. fig. 12. — *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 157, Taf. XVIII. fig. 31, 32. — *Toula*, Kalke v. Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 136, Taf. VI. fig. 49. Südalpen, Nordalpen, Karnisch.
- P. sarajeensis* *Kittl*, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 713, Textfig. 42. Dinariden, Anisisch.
- P. (*Variamussium*) *Schafhäutli Winkler*, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 8, Taf. I. fig. 4. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 157 [P. *Massalongi Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 77, Pl. XIV. fig. 8—12 inclus.]. — *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 245. — *Ooster*, Rhaetische Stufe v. Thun, Mitt. Natf. Ges. Bern, 1869, p. 80, Taf. III. fig. 10. — *Göttel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 156. Schweiz (?), Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- P. *Schlosseri*. v. *Wohrmann*, Fauna d. Cardita-Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 203, Taf. VII. fig. 1, 2. Nordalpen, Karnisch.
- P. Schlotheimi Giebel*, Lieskau, 1856, p. 17, Taf. II. fig. 20c = P. *discites* *Schloth.*, teste v. *Seebach*, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XI. I. 1861, p. 576. *P. Schmiederi Giebel* (1856), v. *Seebach* (1861), v. *Alberti* (1864) vide *Pleuronectites Schmiederi*, *Stoppani* (1860) vide *Pleuronectites* sp. ind. aff. *Schmiederi*.
- P. *Schroeteri Giebel*, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 23, Taf. II. fig. 12. — v. *Seebach*, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 573. — v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 72. — v. *Eck*, Üb. d. Form. d. Bunten Sandst. etc. 1865, p. 96. — *Salomon*, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 113. — *Beumann*, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, p. 599. Deutschland, Muschelkalk.
- P. cf. *Schroeteri* (Giebel) *Frech*, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 56. Bakony, Anisisch.
- P. *scutella* *M. Hoernes*, Gastr. u. Acephal. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 54, Taf. II. fig. 23. Nordalpen, Karnisch.
- P. *securis Dumortier*, Dépôts jur. bassin du Rhône, I. Infralias, 1864, Pl. VIII. fig. 9—11. — *Ooster*, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 79, Taf. III. fig. 9.
- P. *Seebachi Salomon*, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 111, Taf. IV. fig. 28, 29. Südalpen, Ladinisch.
- P. *semipunctatus* v. *Gembel*, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 403 (deest imago). — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 139. Nordalpen, Rhaetisch.
- P. *setinus Gortani*, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII, 1902, p. 84, Tav. VIII. fig. 14. Südalpen, Karnisch.
- P. *sichoticus* *Bittner*, Verst. d. Südussurigebr., Mém. Com. géol. S. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 5, Taf. I. fig. 10. Ussuribucht, Skythisch.

- P. (Chlamys) Simkoviesi** Goetzel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 151, Taf. VIII, fig. 10. Karpathen, Rhaetisch.
- P. simplex** Winkler (1861) vide P. (Chlamys) Winkleri.
- P. sojalis** v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/1, 1908, p. 21 (269), Taf. I (XXXVI), fig. 6.
- 78 **P. stenodictyus** Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 111, Taf. IV. fig. 30—33. — De Lorenzo, Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 140. — Mariani, Appunti di Paleontol. Lomb. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XXXVI. 1896, p. 15, Tav. I. fig. 9. — Simonescu, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 512, Textfig. 20. — Vinassa de Regny, Foss. del Montenegro, I. Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, X. 1903, p. 224 (465). Südalpen, Skythisch.
- P. subaequicostatus** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 156, Taf. XVIII. fig. 27, 28 [Nom. nov. pr. P. Nerei Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 70, Taf. XX. fig. 3, non 5]. — Mariani, Contrib. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 243, Tav. IX. fig. 7. Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
- P. (Veloepeten) subalternans** d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 202 [Nom. nov. pr. P. alternans Graf zu Münster, in Goldfuß, Petref. Germ. II. 1838, p. 12, Taf. LXXXVIII. fig. 11 et Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols IV. 1841, p. 71, Taf. VI. fig. 25]. — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 69 (ex parte, Taf. XX. fig. 4 exclus.). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 154, Taf. XVIII. fig. 25. — De Lorenzo, Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 140. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 613. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 171, Taf. XIX. fig. 12, 13. — Mariani, Contrib. allo studio d. bivalvi di Esino, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 7, 22. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 16, Tav. I. fig. 37. Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
- Non **P. (Chlamys) subalternans** v. Woehrmann, Fauna d. Cardita-Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 204, Taf. VII. fig. 5, 6 (P. formosus Pichler, Neues Jahrb. f. Min. 1875, p. 694 inclus.), Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. tecn. Zannon, Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 18; v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 655 [= P. inaequalternans Parona]. Südalpen, Basilicata, Karnisch.
- P. cf. subalternans** Polifka (1886) vide P. ciscensis.
- P. nov. sp. ind. aff. subalternans** (Orb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. Pt. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus limest. p. 31, Pl. V. fig. 16. Himalaya, Karnisch.
- P. subalterneostatus** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonywaldes, Pal. Bal. 1901, p. 44, Taf. V. fig. 22—24. Bakony, Karnisch.
- P. subconcentricus** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 712, Textfig. 40. — Kittl, Triabsild. d. NE. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 517. Dinariden, Dobrudscha, Anisisea.
- P. subcylindromorphus** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 713, Textfig. 43. Dinariden, Anisisch.

- P. (*Amussium*) *subdemicissus* G r a f z u M ü n s t e r , Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 73, Taf. VII. fig. 6. — d' O r b i g n y , Prodrome, I. 1849, p. 201. — L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 72. — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 164, Taf. XIX. fig. 29. — B r o i l i , Fauna d. Pachycaardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 172, Taf. XIX. fig. 23. — G a l d i e r i , Trias di Giffoni Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 54, Tav. I. fig. 15. — S i m o n e s c u , Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 512. — T o u l a , Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 108, Taf. VII. fig. 55.
Südalpen, Nordalpen, Apennin, Dobrudscha, Karnisch.
- P. (*Amussium*) cf. *subdemicissus* (M s t r.) B i t t n e r , l. c. p. 195, Taf. XIX. fig. 28. — D i e n e r , Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunæ of Spiti, p. 138, Pl. XXIV. fig. 12.
Südalpen — Karnisch, Himalaya — Norisch an ? Rhaetisch.
- P. *subdivisus* B i t t n e r , Lam. auf d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 40, Taf. V. fig. 15—17.
Bakony, Karnisch.
- P. *subtilis* v. W i t t e n b u r g , Ein. neue Foss. aus d. Werfener Schichten Südtirols, Neues Jahrb. f. Min. 1908, I. p. 18, Taf. II. fig. 7. — v. W i t t e n b u r g , Werfener Schichten Südtirols, K o k e n s Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 23, Taf. II (XXXVII), fig. 6.
Südalpen, Skythisch.
- P. (?) *subvelatus* G r a f z u M ü n s t e r , Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 74, Taf. VI. lig. 33 (Spondylus). — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 167.
Südalpen, Nordalpen (?). Karnisch.
- P. (*Chlamys*) *Tellinii* T o m m a s i , Fauna Trias infer. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 48, Tav. III. fig. 4.
Südalpen, Skythisch.
- P. *tenuicostatus* M. H o e r n e s , Gastr. u. Aceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 53, Taf. II. fig. 21. — M a r i a n i , Note pal. Trias sup. d. Carnia occ., Annali Ist. teen. Udine, ser. 2, XI. 1893, p. 29, Tav. II. fig. 3. — M a r i a n i , Appunti di paleont. Lomb. Atti, Soc. Ital. sci. nat. XXXVI. Milano 1896, p. 15, Tav. I. fig. 8. — D e L o r e n z o , Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 140.
Nordalpen, Hallstätter Kalk — Südalpen, Basilicata, Ladinisch.
- P. *tenuistriatus* G o l d f u s s (1838), S c h m i d et S c h l e i d e n (1846), v. S t r o m b e e k (1849), G i e b e l (1856), v. L i n - s t o w (1903) vide P. discites var. tenuistriata.
- P. *terebratuloides* v. K l i p s t e i n , Östl. Alpen, 1843, p. 251, Taf. XVI. fig. 11. — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 161. [non L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 72, Taf. XX. fig. 11 = P. sp. ind.].
Südalpen, Karnisch.
- P. cf. *texturatus* (G o l d f.) O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 80, Taf. III. fig. 9.
Schweiz, Rhaetisch.
- P. (*Velopecetus*) *tirolicus* B i t t n e r , Lam. v. St. Casilan, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 167, Taf. XXIV. fig. 15. — D e L o r e n z o , Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 139.
Südalpen, Basilicata, Karnisch.
- P. *tirolicus* v. W i t t e n b u r g (non B i t t n e r) 1908 vide P. H. Philippi.
- P. *Tommassii* P a r o n a (1889) vide P. (Entolium), hallensis.
- P. (*Synclonema*) *tonkinensis* M a n s u y , Contrib. étude d. faunes paléoz. et trias. Tonkin, Mém. Serv. géol. Indochine, II/5, 1913, p. 28, Pl. IV, fig. 11.
Tonkin, Karnisch.

- P. transdanubialis** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 42, Taf. V. fig. 18, 19.
Bakony, Karnisch.
- P. trebevianus** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 710, Textfig. 37.
Dinariden, Anisisch.
- P. trettensis** Tornquist, Recoaro u. Schio, III. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 364, Taf. XX. fig. 7, 8.
80 Südalpen, Ladinisch.
- P. tridentini** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwihdes, Pal. Bal. 1901, p. 101, Taf. VIII. fig. 26.
Bakony, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. tridentini** (Bittn.) Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 22, Taf. II. fig. 4, 5.
Bäreninsel, Karnisch.
- P. (Chlamys) tubulifer** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 72, Taf. VI. fig. 31. — v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 251, Taf. XVI. fig. 15. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1856, p. 70. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A., XVIII/1, 1895, p. 158, Taf. XIX. fig. 13—15. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 141. — Philippi, Morph. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 86. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontogr. L. 1904, p. 171, Taf. XIX. fig. 14—17. — Mariani, Contr. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907, p. 244, Tav. IX. fig. 8.
Südalpen, Basilicata, Ladinisch, Karnisch.
- P. tubulifer var. Seisana** Bittner, l. c. p. 159, Taf. XIX. fig. 16.
Südalpen, Karnisch.
- P. cf. tubulifer** (Mstr.) Mansuy, Contrib. carte géol. Indochine, Paléontol. 1908, p. 67, Pl. XVII. fig. 10.
Tonkin, Ladinisch ?.
- P. (Aequipeeten) undiferus** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 184, Taf. XIX. fig. 20. — Philippi, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 96. — Broili, Faune d. Pachycardientuffe, Palaeontogr. L. 1904, p. 172, Taf. XIX. fig. 18.
Südalpen, Karnisch.
- P. (Aequipeeten) sp. ind. aff. undifero** (Bittn.) Troula, Kalk vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 103, Taf. VII. fig. 53.
Nordalpen, Karnisch.
- P. ussuricus** Bittner, Verst. d. Süd-Ussurigeb. Mémi. Com. géol. St. Pétersbourg, VI/4, 1899, p. 4, Taf. I. fig. 11.
Ussuribucht, Skythisch.
- P. sp. ind. aff. ussurico** (Bittn.) L. Waagen, Werfener Schichten i. d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 287.
Salt Range, Skythisch.
- P. vajolettensis** v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 22, Taf. I (XXXVI) fig. 9.
Südalpen, Skythisch.
- P. valdecostatus** Mariani, Contr. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 244, Tav. IX. fig. 9.
Südalpen, Ladinisch.
- P. (Chlamys) Valoniensis** Defrance in De Caumont's „Sur quelques terrains de la Normandie occidentale“, Mémi. Soc. Linnaïenne de Calvados (Caen), Vol. II. 1825, p. 507, Pl. XXII. fig. 6 [deest descriptio]. — Leymerie, Mémi. sur la partie infér. du système second. du dép. du Rhône, Mémi. Soc. géol. France, Paris, III. 1838, p. 346, Pl. XXIV. fig. 6. — Portlock, Geol. Rep. Londonderry, 1843, p. 127, Pl. XXVa, fig. 14, 15. — Oppel et Suess, Aequival. d. Koëssener Schichten, Sitzber.

Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, p. 548, Taf. II. fig. 8. — Moore, Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. XVII. 1861, p. 501, Pl. XVI. fig. 6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 156 [P. lugdunensis Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, p. 19, Taf. III. fig. 23, 24, P. cloacinus Quenstedt, Jura, 1856, p. 31, Taf. I. fig. 33, 34 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 244 [Monotis barbata Schäf - häutl, Beitr. z. Kenntn. d. bayr. Voarpen, I. Neues Jahrb. f. Min. 1853, p. 310, Taf. VI. fig. 6 inclus.]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Natf. Ges. Bern, 1869, p. 78, Taf. I. fig. 23, III. fig. 5. — Newton, On marine triass. Lamellibr. Malay Pennins. Proceed. Malacol. Soc. London, VI/3, 1900, p. 131, Pl. XII. fig. 1. — Vaughan, in Reynolds et V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. LX. 1904, p. 202. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLIX. fig. 7. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. 1916, p. 141. England, Frankreich, Süddeutschland, Schweiz, Nordalpen, Karpathen — Rhaetisch, sonst Lias.

P. (*Velopecten*) *venustulus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 55, Taf. VI. fig. 9.

Bakony, Karnisch.

P. (*Aequipeeten*) *Verbeekii* Böttger, Tertiärform. v. Sumatra, Palaeontogr. Suppl. III. 1880, p. 49, Taf. III. fig. 7, 8, IV. fig. I, 6. — Krumbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. Pal. Niederl. Ind. II/3, Palaeontogr. Suppl. IV. 1914, p. 235, Taf. XV. fig. 1—6. Sumatra, Norisch.

P. (*Velopecten*) *verrucosus* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes Pal. Bal. 1901, p. 55 [deest imago].

Bakony, Karnisch.

P. versinodis v. Guembel, Geogn. Beschr. d. bayer. Alpengeb. 1861, p. 404. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 157 = sp. ind. [deest imago].

P. (*Velopecten*) *veszprimiensis* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 51, Taf. VI. fig. 7. — Bittner, Lam. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 633, Taf. XVII. fig. 33.

Bakony, Dinariden, Karnisch.

P. (*Velopecten*) *vetus* Bittner, Lem. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 54, Taf. VI. fig. 8.

Bakony, Karnisch.

P. *Viezzensis* Wilckens, Pal. Unters, triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 147, Taf. V. fig. 25.

Südalpen, Ladinisch.

P. *Vinassai Gortani*, Nuovi foss. Raibl. Carnia, Riv. Ital. Pal. VIII. 1902, p. 84, Tav. III. fig. 16.

Südalpen, Karnisch.

P. *voelseckhofensis* v. Wittenburg, Neue Beitr. z. Geol. etc. d. Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 72, Textfig. 1. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 20 (268), Taf. I (XXXVI) fig. 1—3.

Südalpen, Skythisch.

P. *volaris* Bittner, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 634, Taf. XXVII. fig. 32.

Dinariden, Karnisch.

P. *Wimani Böhm*, Triasverst. v. Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 5, Taf. I. fig. 7.

Spitzbergen, Norisch.

P. (*Chlamys*) *Winkleri Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1862, p. 78, Pl. XV. fig. 4. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 159 [P. simplex Winkler (non Philips), Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 470, Taf. VI. fig. 4 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 246 [P.

Luani Renevier, Not. géol. etc. sur les Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 74 inclus.]. — *Ooster*, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Natf. Ges. Bern, 1869, p. 49, Taf. III. fig. 8. — *Goetel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 143 [= ? *P. disparilis* *Quenstedt*].

Westschweiz, Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.

- P. (Chlamys) Winkleri** (Stoppani) var. *Swinicensis* Goetel, l. c. p. 145, Taf. VIII. fig. 9. Karpathen, Rhaetisch.

P. Zanichellii Stoppani (1863) vide P. Falgeri.

- P. (Velopecten) Zejsneri** Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 140, Taf. VIII. fig. 11. Karpathen, Rhaetisch.

- P. (Entolium) Zittelii** v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 173, Taf. VIII. fig. 12—15. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 654. — *Philippi*, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 82. — *Broili*, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontogr. L. 1904, p. 172, Taf. XIX. fig. 19—21. — *L. Waagen*, Lamellibr. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 105.

Südalpen, Karnisch.

P. sp. ind. v. Hauer, Über d. v. Bergr. Fuchs i. d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 4, Taf. I. fig. 6 = Gen. ind. sp. ind.

- P. sp. ind.** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 79, Pl. XV. fig. 7. Südalpen, Rhaetisch.

- P. sp. ind. (II)** Stoppani, l. c. p. 79, Pl. XV. fig. 8. Südalpen, Rhaetisch.

- P. sp. ind. (III)** Stoppani, l. c. p. 129, Pl. XXXII. fig. 2, 3. Südalpen, Rhaetisch.

- P. sp. ind. (IV)** Stoppani, l. c. p. 138, Pl. XXXII. fig. 4, 5. Südalpen, Rhaetisch.

- P. sp. ind.** Lindström, Om Trias- och Juraförst. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. VI/6, Stockholm, 1865, p. 8, Taf. I. fig. 16. Spitzbergen, ?.

- P. sp. ind.** Teller, in v. Mojsisoviss, Üb. ein. japan. Triassfoss. Beitr. Pal. Oest. VII. 188, p. 176, Taf. II. fig. 9. Japan, Norisch.

P. nov. sp. ind. Tommasi, Riv. fauna Rabl. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, VIII. 1890, p. 19, Tav. I. fig. 5 [= sp. ind., testo v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 655] vide P. forojuiliensis.

P. sp. ind. Broili, Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 174, Taf. XIX. fig. 25 vide P. Broili.

- P. sp. ind.** Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 29, Taf. II. fig. 3. Ellesmereland, Karnisch.

- P. sp. ind.** v. Wittenburg, Triasfoss. v. Fl. Dulgolach, Trav. Mus. géol. Pierre-le-Grand, Acad. sci. St. Pétersbourg, IV. 1910, p. 67, Taf. V. fig. 7. NE. Sibirien, Norisch.

- P. sp. ind.** Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 22, Tav. II. fig. 12, 13. Südalpen, Karnisch.

- P. (Velopecten) sp. ind.** Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 120, Taf. VII. fig. 1. Aragonien (Hispania), Muschelkalk.

- P. nov. sp. ind.** Tonla, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 108, Taf. VII. fig. 54. Nordalpen, Karnisch.

- P. (*Velopeeten*) sp. ind. Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. VI/1, 1913, p. 111.
Himalaya, Karnisch.
- P. nov. sp. ind. K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeontogr. Suppl. IV. 1913, p. 44 Taf. II. fig. 16.
Indonesien, Norisch.
- P. (*Chlamys*) sp. ind. G o e t e l , Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cravovie, sér. A. Nov. dec. 1916, p. 155.
Karpathen, Rhaetisch.
- P. sp. ind. T r e c h m a n n , Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London LXXIII. 1917, p. 206, Pl. XXI. fig. 19.
Neuseeland, Karnisch.

Gen. **Pleuronectites** Schlotheim.

Philippi, Beitr. z. Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 613. — Salomon, Über Pseudomonotis u. Pleuronectites, ibidem, LII. 1900, p. 349. — Philippi, Zur Stammesgesch. d. Pectiniden, ibidem, LII. 1900, p. 74, 77. — Bittner, Über Pseudomonotis Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 564. — Salomon, Die Familienzugehörigkeit der Pleuronectiten, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 21. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 16.

- P. Beyrichii Tornquist, Recoaro u. Schio, III. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 365, Taf. XIX. fig. 1—3.
Südalpen, Ladinisch.
- P. compressus Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 103, Pl. XXI. fig. 13, 14. (Pecten). — Tornquist, Recoaro u. Schio, III. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 367.
Südalpen, Ladinisch.
- P. flagellum Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 100, Pl. XXIV. fig. 15 (Pecten). — Tornquist, Recoaro u. Schio, IV. Zeitschr. D. G. G. LII. 1890, p. 136.
Südalpen, Ladinisch.

- P. laevigatus Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 217, Nachtr. II. 1822, p. 111, Taf. XXXV. fig. 2. — v. Zieten, Verst. Würt. 1833, Taf. LIX. fig. 4 (Pecten). — v. Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalks im NW. Deutschland. Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 137 (Pecten). — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkde. 1852, Taf. XL. fig. 38 (Pecten). — Brönn, Leth. geogn. III/3, 1856, p. 55, Taf. XI. fig. 11 (Pecten). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 578 (Pecten) [P. vestitus Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 72, Taf. XCIV. fig. 9 inclus.]. — Petr. Germ. II. 1838, p. 72, Taf. XCIV. fig. 9 inclus.]. — v. Alberti, Überblick üb. d. Trias, 1864, p. 75, Taf. I. fig. 2 (Pecten). — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, (Pecten). — Salomon, Über Pseudomonotis u. Pleuronectites, p. 149. — Salomon, Familienzugehörigkeit d. Pleuronectiten, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 20, Textfig. — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 10 (Pecten). — Walther, Zwölftaf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. u. Muschelk. v. Jena, 1906, Taf. V. fig. 22. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Muschelk. etc. am Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abh. N. F. XII/2, 1913, p. 224 (52). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 600, Taf. XXXI. fig. 24, 25.
Deutschland, insb. Muschelkalk, auch Kouper.

- P. Schmiederi Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 20, Taf. II. fig. 7, VI. fig. 1 (Pecten). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 577 (Pecten). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 76

(Pecten). — Salomon, Üb. Pseudomonotis u. Pleuronectites, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 355. — Altburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 58. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1 Heft 3, p. 600, Deutschland. Muschelkalk.

P. sp. ind. aff. Schmiederi (Giebel) Tornquist, Recoaro u. Schio, III. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 367 [Typ. Pecten Schmiederi Stoppani, Pal. Lomb. I. Petrif. f. d'Esino, 1860, p. 101, Pl. XXI. fig. 5.]

P. (an Tirolidia?) sp. ind. Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 89, Taf. VI. fig. 3. Südalpen, Ladinisch.

Südalpen, Ladinisch.

Gen. **Streblopteria** McCoy.

S. laterestriata Philipp, Neue Zweischaler von palaeozoischem Habitus etc. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 65, Textfig. 3—6, Deutschland, Muschelkalk.

Gen. **Hinnites** Defrance.

(nach Philipp in der Trias und im Jura noch nicht vertreten).

H. comatus Giebel (1856), v. Seebach (1861), Noetling (1883) vide Prospondylus comptus.

H. comptus aut. — Prospondylus comptus, teste Philipp, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 618.

H. comptus Tommasi, Fauna Trias inf. ver. mer. Alpi, Ital. I. 1895, p. 46, Tav. III. fig. 3 = Pseudomonotis sp. ind. aff. aequicostatae Ben., teste Bittner, Üb. Pseudomonotis Telleri etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 569.

H. denticostatus Laube (1865), Gortani (1902) vide Terquemia denticostata, Parona (1889) vide T. cf. denticostata.

H. granulosus Laube (1865) vide Mysisdiptera (?) dubiosa Bittn.

H. montis-prisis Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, II. 1891, p. 239, Tav. I. fig. 11, 12. Apennin, Rhaetisch.

H. obliquus Laube (1865) vide Terquemia obliqua.

H. Ombonii Parona (1889), v. Woehrmann (1893) vide Prospondylus Ombonii.

H. Schlotheimii Merian, Geogn. Übers. d. Schwarzwaldes, 1832, p. 19 (Spondylus), v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 77 vide Prospondylus comptus.

H. (?) sepsidicus Bittner, Triasprefakten v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 110, Taf. II. fig. 9. Anatolien, Norisch.

H. Sismondae Stoppani (1858), Parona (1889) vide Prospondylus Sismondae.

H. spondyloides (Schloth.) Tommasi, Fauna Trias inf. etc. Pal. Ital. I. 1895, p. 46, Tav. III. fig. 2 = Pseudomonotis (Eumorphotis) sp. ind. aff. Telleri Bittn., teste Bittner, Über Ps. Telleri, Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 569.

Fam. **Pinnidae** Meek.

Gen. **Pinna** L.

P. Blanfordi Böttger, Tertiärform. auf Sumatra etc. Palaeontogr. Suppl. III. No. 8, 9, 1880, p. 48, Taf. III. fig. 4—6. — Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, ibid. Suppl. IV. 1914, p. 228, Taf. XVI. fig. 1, XVII. fig. 1.

Sumatra, Norisch.

- P. cf. *Blanfordi* (Böttg.) Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 14, Pl. I. fig. 24—26. Burma, Rhaetisch.
- P. *Del-Lagoi Tommasi*, Una Lima nuova etc. di Recoaro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 304, Tav. VIII. fig. 3. Südalpen, Anisisch.
- P. *Doetzkirchneri* v. Guembel (1861) vide P. Meriani.
- P. *Ecki Picard*, Die Gattung Pinna i. d. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XIV. 1903, p. 335, Textfig. Deutschland, Muschelkalk.
- P. cf. *Ecki* (Pic.) Schmidt, Wellengeb. v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. d. Stat. Landesamtes, Stuttgart, No. 3, 1907, p. 79, Taf. I. fig. 6, 7. Süddeutschland, Muschelkalk.
- P. *Escheri Stefanini*, Rhaet. Fess. d. Apuan. Alpen, Verhandl. G. R. A. 1882, p. 99 [Phyllites spediensis Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. Ist. Bologna, ser. 2, V. 1866, p. 92, Tav. X. fig. 1 inclus.]. Apennin, Rhaetisch.
- P. *Hartmanni Schafhäutl* (1854), *Stoppani* (1861) vide P. Meriani.
- P. *Heeri Böhm*, Obertriad, Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 38, Taf. V. fig. 4—6. Bäreninsel, Karnisch.
- P. *Lima Böhm*, Obertriad. Faun. d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 38, Taf. V. fig. 12—14. Bäreninsel, Karnisch.
- P. *Meriani Winkler*, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 14. — Winkler, Der Oberkeuper etc. Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 472, Taf. VII. fig. 1. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166 [P. prisca Schafhäutl (non Mstr.) Beitr. z. Kenntn. d. bayer. Voralpen, I. Neues Jahrb. f. Mn. 1853, p. 318, P. Hartmanni Schafhäutl, ibidem, II. l. c. 1854, p. 452, Stoppani, Pal. Lomb. III. Couch à Av. contorta, 1861, p. 64, Pl. IX. fig. 9, P. Doetzkirchneri v. Guembel, Geogn. Beschr. v. Bayern, 1861, p. 406 inclus.]. Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.
- P. *miliaria Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta (Foss. Azzarola,) 1861, p. 63, Pl. VIII. fig. 3—6, IX. fig. 1—3. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Natf. Ges. Bern, 1869, p. 72, Taf. IV. fig. 11. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, Nov. Dec. 1916, p. 128. Südalpen, Westschweiz, Karpathen, Rhaetisch.
- P. *papyracea Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta (Schistes noirs), 1863, p. 133, Pl. XXXI. fig. 2, 3. — v. Dittmar, Contortazone, 1884, p. 167. Südalpen, Rhaetisch.
- P. *Paronai Tommasi* (1890) vide P. raibiana.
- P. *prisca Schafhäutl* (1853) vide P. Meriani.
- P. *raibiana Parona*, Studio monogr. fauna Rabl. Lomb. 1889, p. 105, Tav. VIII. fig. 11. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 178 [P. Paronai Tommasi, Rivista Fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, VIII. 1890, p. 32, Tav. II. fig. 10, III. fig. 1 inclus.]. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontogr. L. 1904, p. 193, Taf. XXIII. fig. 5. Südalpen, Karnisch.
- P. *reticularis Benecke*, Trias u. Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1866, p. 159, Taf. II. fig. 9, 10. — Bassani, Foss. nella dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, V. 1893, p. 8, Tav. I. fig. 10—12. Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

- P. *similis* (Chapuis et Dewalque) De Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verhandl. G. R. A. 1882, p. 99. Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- P. *Tommasii* v. Wöhrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. 8. XLIV. 1892, p. 177, Taf. X. fig. 1, 2. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontogr. L. 1904, p. 193, Taf. XXIII. fig. 5. Südalpen, Karnisch.
- P. cf. *Tommasii* (Wöhrm. et Kock.) Mariani, Contrib. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 240, Tav. IX. fig. 3, 4. Südalpen, Ladinisch.
- P. *vetusta* Costa, Note geol. e. pal. sui Mti. Picentini. Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, I. 1864, p. 238, Tav. V. fig. 22. Apennin, Rhaetisch.
- P. *vomis* Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166. [Deest imago]. Nordalpen, Rhaetisch.
- P. sp. ind. Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LXXIII. 1917, p. 206, Pl. XXII. fig. 11. Neuseeland, Karnisch.
- P. sp. ind. Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 49, Taf. V. fig. 15, 16. Südalpen, Karnisch.
- P. sp. ind. Schütze, Die Gattung Pinna im schwäb. Muschelkalk, Zentralbl. f. Min. 1906, p. 114. Süddeutschland, Muschelkalk.
- P. sp. ind. Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1908, p. 23, Tav. III. fig. 16. Südalpen, Karnisch.
- P. sp. ind. I. Krumbeek, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontogr. Suppl. IV. 1913, p. 32, Taf. III. fig. 2, Textfig. 2. — II, Krumbeek, l. c. Taf. III. fig. 3. Indonesien, Norisch.

Fam. Pernidae Zittel.

Gen. **Gervilleia** Defrance.

— Subgen. **Angustella** Waagen,
Pteroperna Morr. et Lyc. inclus.

Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld etc. Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkde. Württembergs, 1898, p. 153. — Waagen, Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 266. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 10.

Gervillella Waagen, l. c. p. 171 [sect. G. aviculoides et G. Hartmanni] = Gen. non val., teste Frech, l. c. p. 10.

Odontoperna Frech = Subgen. non val., teste Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 31, Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 172.

G. *alata* Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresb. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 157, Taf. IV. fig. 10. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

G. *Albertii* Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 127, Taf. CXVI. fig. 9 (Avicula). — Credner, Gervillien d. Triasform. i. Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 654, Taf. VI. fig. 7. — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1856, p. 312.

[Non G. *Albertii* v. Schaueroth, Recoaro, ibidem, XVII. 1855, p. 509, Taf. II. fig. 1 = Modiola hirundiniformis]. Deutschland, Buntsandstein — Südalpen, Anisisch.

- G. Alloucheryi** Mansuy, Contrib. à la géol. du Tonkin, Paléont. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 55, Pl. X. fig. 1. — Tonkin, Obertrias.
- G. areuata** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 87, Taf. IX. fig. 6. — Südalpen, Karnisch.
- G. Bennetti** Böh m., Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 36, Taf. IV. fig. 13, 17. — Bäreninsel, Karnisch.
- G. bipartita* Merian (1853) vide Hoernesia bipartita.
- G. bosniaca** Kttl., Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 709, Taf. XXIII. fig. 8. — Dinariden, Anisisch.
- G. Bouei** v. Ha u e r, Beitr. z. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI.V 1857, p. 565, Taf. V. fig. 1—3 (Perna). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166 [Perna aviculaeformis Emmerich, Jahrb. G. R. A. 1853, p. 375 inclus.]. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 207, Taf. VII. fig. 16—18 [Perna quadrata Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1868, p. 366, Taf. XLV. fig. 11 inclus.]. — Tommasi, Rivista fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, VIII. 1890, p. 23, Tav. II. fig. 2. — Frech, Devon. Aviculiden Deutschlands, Abhandl. Geol. Spezialk. v. Preußen, 1891, p. 215 (Odontoperna). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 657 [Perna aviculaeformis Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lomb. 1889, p. 97 incl s.]. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 30, Taf. V. fig. 7, 8. — Frech, Üb. Gervilleia, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 617, Textfig. (Odontoperna). — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLI. fig. 2. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 28, Taf. III. fig. 8. — Südalpen, Bakony, Karnisch — Nordalpen, Karnisch-Rhaetisch.
- G. Bouei** (Ha u.) var. **Weissenbachensis** Toul a, Schichten mit G. Bouei vom Gaumannmüllerkogel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 390, Textfig. 3, 4. — Nordalpen, Karnisch.
- G. cf. Bouei** (Ha u.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontogr. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/3. 1914, p. 232, Taf. XVI. fig. 11. — Sumatra, Norisch.
- G. Capellinii** Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Rivista Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 85, Tav. VIII. fig. 19. — Südalpen, Karnisch.
- G. caudata** Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 472, Taf. VI. fig. 9. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166. — [Non *G. caudata* Berger, Verst. d. Schaumkalkes in Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 203, Taf. II. fig. 16 = *G. costata*.] — Nordalpen, Rhaetisch.
- G. sp. ind. aff. caudatae** (Winkl.) Goetel, Rhaet. Stufe d. sub-tatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 131. — Karpathen, Rhaetisch.
- G. constricta** Stoppani, Studii geol. e pal. sulla Lombardia, 1857, p. 273, 295. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. d. Lomb. 1889, p. 101, Tav. VII. fig. 6. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 659. — Südalpen, Karnisch.
- G. costata** v. Schlotheim, Petrefaktenkde., 1820, p. 298, Nachträge, II. 1822, p. 113, Taf. XXXVII. fig. 2 (Mytilites). — Quenstedt, Neues Jahrb. f. Min. 1842, p. 306. — v. Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes im NW.

Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 192. — Credner, Gervillien d. Triasform. i. Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 647, Taf. VI. fig. 3. — v. Schaueroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 509. — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent, ibidem, XXXIV. 1858, p. 312. — Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 32, Taf. IV. fig. 5. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimarischen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 591 [Avicula Bronni v. Alberti, Trias, 1834, p. 55, v. Zieten, Verst. Würt. 1833, p. 73, Taf. LV. fig. 3, Goldfuss, Petref. Germaniae, II. 1838, p. 129, Taf. CXVII. fig. 3, Bronn, Leth. geogn. III/3, 1856, p. 64, Taf. XI. fig. 3, Giebel, Lieskau, l. c. p. 33, Taf. VII. fig. 11, Bakewellia costata v. Schaueroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 104—106, Taf. V. fig. 1, 3, 4, 5, Bakewellia lineata var. hybrida v. Schaueroth, ibidem, p. 108, Taf. V. fig. 8, 9 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 84 [? Avicula laevigata Klöden, Verst. d. Mark Brandenburg, 1834, Taf. III. fig. 2, Gerv. caudata Berger, (non Winkler), Verst. d. Schaumkalkes etc. Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 203, Taf. II. fig. 16. inclus.]. — Schmidt, Das ostthüringische Röth, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1885, p. 141. — Frantzen, Über G. Goldfussi, ibidem, f. 1885, p. 313, Taf. X. fig. 6. — Tommasi, Fauna calc. conch. di Lombardia, 1894, p. 89 (Avicula Bronni). — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 54, Tav. III. fig. 12. — Tornquist, Recoaro u. Schio, IV. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 138. — Philippi, Kontin. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 3. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. u. Muschelk. v. Jena, 1906, p. 25, Taf. IV. fig. 19. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. VIII. fig. 23. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 109 [var. acuta Schaur., crispata Schaur., contracta Schaur. inclus.]. — Frech, Leitfoss d. Wurfener Schichten, Pal. Bal. 1907, p. 12, Taf. I. fig. 9, 10. — Hohenstein, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes am östl. Schwalzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XI. 1913, p. 51, (223), Taf. I. (XII) fig. 39—41, Textfig. 3. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 604, Taf. XXXII. fig. 16, 17.

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit — Südalpen, Skythisch, Anisisch.

G. costata (Schloth.) var. **contracta** v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 105, Taf. V. fig. 3. — Wurm, Trias v. Aragonien, ibidem, LXIII. 1911, p. 111, Taf. VI. fig. 17, 18.

Thüringen, Lettenkohle — Aragonien, Muschelkalk.

G. sp. ind. aff. costatae (Schloth.) Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 35, Taf. III. fig. 23, 24.

Bäreninsel, Karnisch. **G. De Lorenzoi Galdieri**, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 86, Tav. II. fig. 18.

Salerno (Apennin), Obertrias.

G. De-Stefanii Tommasi, Nuovi foss. trias. di Sardegna, Boll. Soc. geol. Ital. XV. 1896, p. 499, Tav. XI. fig. 3.

Sardinien, Karnisch.

G. elegans Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 606, Taf. XXXII. fig. 21.

Schlesien, Muschelkalk.

G. elongata Mansuy, Faunes de Na Cham, Mém. Sen. géol. Indochine, VI/1, 1919.

Tonkin, Karnisch.

G. exilis (Stopp.) Tommasi (1903), v. Arthaber (1906), Galdieri (1905, 1908), Del Campana (1907), Di Stefano (1912) vide Perna exilis.

- G. exorreeta** *Lepsius*, Das westl. Südtirol, 1878, p. 352, Taf. I, fig. 6. — *Frech*, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 13, Taf. I. fig. 5 [G. cf. Meneghini *Frech*, Nachtr. zu Cephal. u. Zweischaltern d. Bakonyer Trias, ibidem, 1905. p. 6, Textfig. 8 inclus']. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, *Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5*, 1908, p. 31 (279), Taf. IV. (XXXIX) fig. 10, — v. Wittenburg, Lamellibr. d. Salt Range, N. Jahrb. f. Min. 1909/1, p. 12, Taf. II. fig. 2.
Südalpen, Bakony, Salt Range, Ussuribucht, Skythisch.
- G. cf. exorreeta** (*Lepsius*) *Bittner*, Verst. d. Süd-Ussurigebl. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 16, Taf. III. fig. 1—16. — *Wagen*, Werfener Schichten in d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 287.
Ussuribucht, Salt Range, Skythisch.
- G. Faberi* *Winkler* (1859), v. *Dittmar* (1864) vige *G. ornata*.
- G. Fraasi** *Philippi*, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 157, Taf. IV. fig. 9.
Süddeutschland, Muschelkalk.
- G. Galeazzi Stoppani* (1863), v. *Dittmar* (1864) vide *Avicula Galeazzi*.
- G. Gemmellaroi** *Tommasi*, Revisione fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 99, Tav. XVI. fig. 15, 16.
Südalpen, Hauptdolomit.
- G. gibba** *Tommasi* Note pal. Boll. Soc. geol. Ital. IV. 1885, p. 15, Tav. II. fig. 17. — *Tommasi*, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 54, Tav. III. fig. 13.
Südalpen, Skythisch.
- G. Goldfussi** v. *Strombeck*, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelk. im NW. Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 189 (Pterinea). — v. *Schauroth* Schaltierreste d. Lettenkohlenform. ibidem, IX. 1857, p. 106, Taf. V. fig. 5 (Bakewellia costata var. *Goldfussi*). — *Franzen*, Über G. *Goldfussi*, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1885, p. 307, Taf. X. fig. 1—5. — *Philippi*, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 156, Taf. IV. fig. 6, 7. — *Assmann*, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 605, Taf. XXXII. fig. 18.
Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.
- G. cf. Goldfussi** (*Strb.*) *Wurm*, Trias v. Arragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 110, Taf. VI. fig. 16.
Aragonien, Muschelkalk.
- G. sp. ind. ex aff. Goldfussi** (*Strb.*) *Diener*, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 108.
Himalaya, Karnisch.
- G. hirundiniformis* v. *Schauroth*, Verst. d. Trias im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 509, Taf. II. fig 2 = sp. inval., teste *Giebel*, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 31.
- G. haloënsis** *Mansuy*, Contrib. à la géol. du Tonkin. Paléont. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 56, Pl. X. fig. 2.
Tonkin, Obertrias.
- G. immatura** *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 87, Taf. IX. fig. 1—5.
Südalpen, Karnisch.
- G. incurvata** *Lepsius*, Das westl. Südtirol, 1878, p. 353, Taf. I. fig. 3. — *Tommasi*, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 55. — *Frech*, Neue Zweischalter etc. d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 8, Textfig. 5. — *Frech*, Nachtr. zu Ceph. u. Zweischaltern d. Bakonyer Trias, ibidem, 1905, p. 6, Textfig. 7. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, *Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. VIII/5*, 1908, p. 31 (279), Taf. IV (XXXIX), fig. 7.
Südalpen, Bakony, Skythisch.

- G. inflata** Schafhäutl, Geogn. Unters. d. südbayer. Alpengeb., 1851, p. 134, Taf. XXII, fig. 30. — Schafhäutl, Beitr. z. näh. Kenntn. d. bayer. Veralpen, I. Neues Jahrb. f. Min. 1853, p. 306, Taf. VI, fig. 2. — Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 71, Pl. XI, fig. 2, XII, fig. 1—5. — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 504. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 165. — Renevier, Not. géol. et pal. Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 243. — Pfückery Rieo, Rhaet v. Göttingen, Zeitsehr. D. G. G. XX. 1868, p. 410, Taf. VII, fig. 3. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 78, Taf. IV, fig. 15. — Newton, On marine triass. lamellibr. fr. Malay Pennins. Proc. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 132, Pl. XII, fig. 6. — Frech, Neue Zwei-schaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 44, Textfig. 62. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLIX, fig. 3. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV, fig. 17—20. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 129.
Frankreich, Schweiz, Deutschland, Nordalpen, Südalpen, Bakony, Karpathen, Malakka — Rhaetisch, sonst auch Lias u. Dogger.
- G. intermedia** Münster (1841) vide G. angulata.
- G. (?) intermedia** Mansuy (non Münster), Etude géol. du Yunnan oriental, Paléontol. Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 120, Pl. XXI, fig. 11, XXII, fig. 1.
Yunnan, Karnisch.
- G. jenensis** Passarge, Das Roeth im östl. Thüringen, 1891, p. 18 (deest imago).
Thüringen, Roeth.
- G. Joannis Austriae** v. Klipstein (1843) vide Hoernesia Joannis Austriae.
- G. lata** v. Hauer, Über d. von Berg. Fuchs i. d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 10, Taf. III, fig. 8.
Südalpen, Skythisch.
- G. latealata** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 192, Taf. XXIII, fig. 1.
Südalpen, Skythisch.
- G. latobica** Bittner, Lam. v. Hudiklanec. Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 228, Taf. VII, fig. 3.
Südalpen, Ladinisch.
- G. (an Hoernesia?) leptopleura** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 116, Taf. V, fig. 11—13. — Mariani, Contrib. allo studio d. Bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 32. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 22.
Südalpen, Ladinisch.
- G. lineata** Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 122, Taf. CXVII, fig. 6 (Avicula). — v. Schauroth, Schaltiere d. Letten-kohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 109, Taf. V, fig. 10 (Bakewellia). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 90 [Bakewellia lineata var. oblita v. Schauroth, l. c. p. 107, Taf. V, fig. 7 inclus.].
Deutschland, Muschelkalk, Keuper.
- G. Loewenighi** Böhm, Obertrias. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 36, Taf. III, fig. 4—7, 9—11, Textfig. 5.
Bäreninsel, Karnisch.
- G. cf. Loewenighi** (Böhm) Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7. Kristiania, 1907, p. 22.
Ellesmereland, Karnisch.
- G. Marianii** Tommasi, Revis. fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 100, Tav. XVI, fig. 17, 18.
Südalpen, Hauptdolomit.

- G. Meneghinii** Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 55, Tav. III. fig. 14 [G. sp. ind. Tommasi, Note pal. Boll. Soc. geol. Ital. IV. 1885, p. 16, Tav. III. fig. 19 inclus.].
Südalpen, Skythisch.
- G. cf. Meneghinii** (Tommasi) Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 83, Taf. VIII. fig. 31.
Bakony, Skythisch.
- G. cf. Meneghinii* (Tommasi) Frech (1905) vide G. exorrecta.
- G. Meriani** Stoppani, Studii geol. e pal. sulla Lombardia, 1857, p. 273, 394. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 99, Tav VII. fig. 2 [Avicula sp. ind. Merian, in Escher, Geol. Bem üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, Taf. IV. fig. 29 inclus.].
Südalpen, Karnisch.
- G. modiola** Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 9, Textfig. 6. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibid. 1907, p. 10, Taf. I. fig. 7. — Assmann, Brach u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 605, Taf. XXII. fig. 15, 19, 20. Deutschland, Muschelkalk — Galizien, Roeth — Bakony, Skythisch.
- G. modiolaeformis* Giebel (1856), Auerbach (1871) vide G. mytiloides.
- G. Murchisoni** Geinitz, Dyas, 1861, I. p. 79, Taf. XIV. fig. 26. — Ebert, Vorkommen u. Verbreitung v. G. Murchisoni, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1880, p. 237, Textfig. . — Kolesch, Verst. aus d. mittl. Buntsandst. v. Ostthüringen, Zentralbl. f. Min. 1903, p. 660. — Eck, Zentralbl. f. Min. 1904, p. 506. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Verst. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 24, Taf. IV. fig. 15. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. II. fig. 5. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 11, Textfig. 2.
Deutschland, Buntsandstein.
- G. musculosa** Stoppani, Stud. geol. e. pal. sulla Lombardia, 1857, p. 273, 294. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 100, Tav. VII. fig. 1 [Avicula sp. ind. Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, Taf. IV. fig. 33 inclus.].
Südalpen, Karnisch.
- G. cf. musculosa** (Stoppa) Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 227, Tav. VII. fig. 10.
Apennin-Umbria), Rhaetisch.
- G. sp. ind. aff. musculosae** (Stoppa) Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontograph. L. 1904, p. 160, Taf. XXII. fig. 22.
Südalpen, Karnisch.
- G. mytiloides** v. Schlotheim, Petrefaktenkde. 1820, p. 181 (deest imago). [Selenites]. — Bornemann, Verst. im span. Muschelkalk, Zeitschr. D. G. G. VIII. 1856, p. 165 (G. polyodonta). — v. Seebach, Conchylien fauna d. Weimarischen Trias, ibidem, XIII. 1861, p. 594 [Avicula Albertii Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 127, Taf. CXXVI. fig. 9, Pterinea polyodonta v. Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelk. im NW. Deutschl. Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 185, Gervilleia polyodonta Credner, Gervillien d. Triasform. i. Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 652, Taf. VI. fig. 6, Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 30, Gerv. Albertii, Credner, l. c. p. 654, Taf. VI. fig. 7, Giebel, l. c. p. 31, Gerv. modiolaeformis Giebel, l. c. p. 31, Taf. IV. fig. 11 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 85. — Benecke, Üb. ein. Muschelkalkablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 34, Taf. II. fig. 10, 11. — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 45, Taf. I. fig. 9 (Avicula Albertii). — Tommasi, II Trias inf. d. nostre Alpi, 1882, p. 59, Tav. I. fig. 4 (G. polyodonta). — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 53, Tav. III. fig. 11. — Philippi,

- (Grignageb. Zeitschr. D. G. G. XLVI. 1895, p. 727. — *Philippi*, Kontin. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 2. — *Frech*, Neue Zweischaliger etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 15, Textfig. 14 (= *G. Albertii Credn.*). — *Walther*, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906 p. 24, Taf. IV. fig. 16. — *Frech*, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 13, Taf. I. fig. 8 (var. *Albertii Credn.*), Taf. I. fig. 1, 3 (var. *Polyodonta Cr.*), p. 12, Taf. I. fig. 2 (var. *palaeotriadicus*). — v. *Wittenburg*, Werfener Schichten v. Spitzbergen, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1912, p. 947, (*G. polyodonta*). — *Assmann*, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVII/1, Heft 3, p. 604, Taf. XXII. fig. 12—14.
- Deutschland, Roeth, Muschelkalk — Spanien, Muschelkalk — Südalpen, Bakony, Skythisch, Anisisch. — Bogdo (Astrachan), Skythisch. — Spitzbergen, Skythisch.
- G. mytiloides** (Schloth.) var. *bogdoana* *Frech*, Nachtr. zu Ceph. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1905, p. 5, Textfig. 6 [Typ. *G. modiolaeformis Auerbach*, Gora Bogdo, 1871, p. 44, Taf. I. fig. 8 (non 9)].
Bogdo (Astrachan), Skythisch.
- G. sp. ind. aff. mytiloides** (Schloth.) *Teller*, Pelecypodenfauna v. Werchojansk, in E. v. Mojsisovics, Arktische Triassfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIV, No. 6, 1886, p. 135, Taf. XX. fig. 1.
Nordsibirien, Norisch.
- G. Napengensis** *Healey*, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 23, Pl. III. fig. 22—25.
Burma, Rhaetisch.
- G. Nordenskiöldi** *Böhm*, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 35, Taf. III. fig. 8.
Bäreninsel, Karnisch.
- G. Ogilviae** *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 88, Taf. VIII. fig. 29.
Südalpen, Karnisch.
- G. obliqua** v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 89, Taf. I. fig. 5.
Deutschland, Lettenkohle, Unterkeuper.
- G. ornata** *Moore*, Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 500, Pl. XV. fig. 8. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 163 [= *G. Faberi Winkler*, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 10].
England, Nordalpen, Rhaetisch.
- G. pallium** *Stoppani*, Stud. geol. e pal. s. Lombardia, 1857, p. 273, 394. — *Parona*, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 98, Tav. VII. fig. 3 [Avicula sp. ind. *Merian*, in *Escher*, Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, Taf. IV. fig. 32 inclus.].
Südalpen, Karnisch.
- G. pannonica** *Bittner*, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 90, Taf. IX. fig. 18—24. — *Frech*, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc., ibidem, 1907, p. 11, Textfig. 11 (*G. Murchisoni* var. *pannonica*).
Bakony, Skythisch.
- G. Paronai** *Broili*, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 190, Taf. XXII. fig. 26. — *Waagen*, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 98, Taf. XXXIV. fig. 19.
Südalpen, Karnisch.
- G. planata* *Broili* (1904) vide *Edentula planata*.
G. polyodonta *Credner* (1851), *Giebel* (1856) vide *G. mytiloides* var. *Polyodonta*, *Lepsius*, Das westl. Südtirol, 1878, Taf. I. fig. 6 =? *G. Meneghinii Tommasi*, teste *Bittner*, Verst. d. Süd-Ussuriegeb. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 17.

- G. *praecursor* Quenstedt, Der Jura, 1856, p. 29, Taf. I. fig. 9—11 (non 8). — Oppel et Suess, Über d. mutmaßl. Aequivalente d. Kössener Schichten in Schwaben, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, Taf. II. fig. 3, 4. — Winkler, Der Oberkeuper etc. Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 471, Taf. VI. fig. 7. — Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 500, Pl. XV. fig. 6 (non 7). — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 207, Pl. XXXIV. fig. 13. — v. Alberti Überbl. üb. d. Trias. 1861, p. 89, Taf. I. fig. 6 — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 165. — Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 159. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 78, Taf. IV. fig. 16. — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, Vol. II. 1892, p. 237, Pl. I. fig. 6. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 43, Textfig. 61. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 16. — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 18, Pl. II. fig. 2—15. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 131.

England, Deutschland, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen, Burma — Rhaetisch.

- G. cf. *praecursor* (Quenst.) Krumbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/3, 1914, p. 231, Taf. XVI. fig. 10 [Avicula sp. ind. Böttger, Tertiärform. v. Sumatra, ibidem, Suppl. III. 1880, p. 49, Taf. II. fig. 7 inclus.]. — Sumatra, Norisch.
- G. nov. sp. ind. aff. *praecursor* (Quenst.) Frech, Neue Zweischaler etc., aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 43, Textfig. 60. — Bakony, Hauptdolomit.
- G. *predazzensis* v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 32 (280) [deest imago]. — Südalpen, Skythisch.

- G. *Rothpletzi* Broili, Fauna d. Pachycardiontuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 191, Taf. XXIII. fig. 2, 3. — Südalpen, Karnisch.

- G. *salvata* Brunner, Apercu géol. des environs du Lac de Lugano, Denkschr. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwissensch. XII. 1852, p. 5 (Avicula). — Stabile, Foss. terreno trias. nei dintorni d. Lago di Lugano, 1854, p. 8 (Avicula). — v. Haue r, Foss. aus d. Dol. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad. Wiss. Wien. XV. 1855, p. 413, Taf. I. fig. 7—9. — Benecke, Trias u. Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 160. — Tommasi, Revis. fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 98, Tav. XVI. fig. 10—14.

Südalpen, Hauptdolomit.

- G. *Saneti Galli* Stoppani, Stud. geol. e. pal. sulla Lombardia, 1857, p. 273, 395. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 97. Tav. VI. fig. 4, 5. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 659 [? Avicula modiolaris (Mstr.) Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 372, Taf. LXV f. fig. 12 inclus.]. — Merciai, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 226, Tav. VII. fig. 9.

Südalpen, Nordalpen (?) Karnisch — Apennin (Umbria), Rhaetisch.

- G. *Shaniorum* Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 16, Pl. II. fig. 1—9, III. fig. 27. — Burma, Rhaetisch.

- G. *socialis* v. Strombeck (1849), Credner (1851), Quenstedt (1852), Bronn (1856), Giebel (1856), v. Seebach (1861), v. Alberti (1864), Zeller (1908) vide Hoernesia socialis.

- G. *spitzbergensis* v. Wittenburg, Triasfoss. v. Spitzbergen, Trav. Mus. géol. Pierre-le-Grand, Acad. sci. St. Pétersbourg, IV. 1910, p. 36, Taf. I. fig. 6. Spitzbergen, Karnisch.
- G. *Stoppanii* Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 102, Tav. VIII. fig. 2. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 660. — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. Pal. VIII. 1902, p. 85. Südalpen, Karnisch.
- G. striocurva* Quenstedt (1856) vide Avicula contorta.
- G. *subcostata* Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 129, Taf. CXVII. fig. 5 (Avicula). — Credner, Gervillien d. Triasform. i. Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 650, Taf. VI. fig. 4. — v. Schauroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 108, Taf. V. fig. 12 (Bakewellia). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 89 [G. pernata Quenstedt, Petrefaktenkde. p. 515, Taf. XLII. fig. 3, Bakewellia costata var. Goldfussi v. Schauroth, l. c. p. 106, Taf. V. fig. 5 inclus.]. — Philipp, Fauna d. Trigondusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 158, Taf. IV. fig. 8 [Bakewellia lineata var. paucisulcata v. Schauroth, l. c. Taf. V. fig. 13, inclus, G. substriata v. Alberti, l. c. p. 90 exclus.]. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover. v. Koken-Festschr., 1907, p. 111. — Hohenstein, Mittl. Muschelkalk vom östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 224 (52). Deutschland, Muschelkalk bis Grenzdolomit.
- G. *subcostata* (Gdf.) var. *falcata* Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 72. — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 108, Taf. VI. fig. 14, 15. Deutschland, Lettenkohle. — Aragonien, Muschelkalk.
- G. subglobosa* Credner (1851), v. Seebach (1861), v. Alberti (1864) vide Hoernesia subglobosa, Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 29, Taf. IV. fig. 9 = Hoernesia socialis, teste v. Seebach, l. c. p. 590.
- G. *substriata* Credner, Gervillien d. Triasform. in Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 651, Taf. VI. fig. 5 [Avicula alata Klöden, Verst. d. Mark Brandenburg, 1834, p. 198, Taf. III. fig. 3 inclus.]. — v. Schauroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 110, Taf. V. fig. 11 (Bakewellia). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimarschen Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 593. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 90. — Philipp, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 4. — v. Linstow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 139. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper i. Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 73, Taf. I. fig. 3 (var. lineata Gdf.), fig. 4 (var. tenuistriata).
- Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.
- G. *Taramelli* Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pla. VIII. 1902, p. 86, Tav. VIII. fig. 20. Südalpen, Karnisch.
- G. *ursina* Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 34, Taf. III. fig. 12, 15, 18. (Bakewellia). Bäreninsel, Karnisch.
- G. *Wagneri* Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 471, Taf. VI. fig. 6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166. Nordalpen, Rhaetisch.
- G. sp. ind. Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 8, Pl. I. fig. 6, 7. Himalaya, Skythisch.
- G. sp. ind. I. Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 20, Pl. III. fig. 17.

- G. sp. ind. II. Healey, l. c. p. 21, Pl. III. fig. 16.
 G. sp. ind. III. Healey, l. c. p. 24, Pl. III. fig. 26. Burma, Rhaetisch.
 G. sp. ind. Merciai, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 227, Tav. VII. fig. 11. Apennin (Umbria) Rhaetisch.
 G. sp. ind. Zeller, Lettenkohle u. Keuper i. Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 78, Taf. I. fig. 2. Schweiz (Aargau), Keuper.
 G. sp. ind. (?) Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 129. Taf. V. fig. 16. Südalpen, Ladinisch.

Subgen. **Angustella** Waagen.

Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 170.

Typ. *Gervilleia angusta* Münnster (1838).

- A. *angulata* Graf zu Münnster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 49, Taf. VII. fig. 24. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 55 [Gerv. intermedia Münnster, l. c. p. 79, Taf. VII. fig. 25 inclus. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. VIII/1, 1895, p. 87, Taf. IX. fig. 11, 13, 14, 15, 17. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 190, Taf. XXII. fig. 25. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 98, Taf. XXXIV. fig. 20. Südalpen, Karnisch.]
 A. sp. ind. aff. *angulatae* (Mstr.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/3, p. 231, Taf. XV. fig. 12, 13. [Teredo sp. ind. Boettger, Tertiärform. v. Sumatra, ibidem, 1880, Suppl. III. p. 32, Taf. I. fig. 11—13. inclus.]. Sumatra, Norisch.
 A. *angusta* Graf zu Münnster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 122, Taf. CXV. fig. 6. — Catullo, Mem. geogn. pal. Alpi Venete, 1848, p. 239, Taf. IV. fig. 1. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiess. Wien, XXV. 1862, p. 54. —omboni, Foss. Trias d. Veneto, Atti Ist. Veneto sci. etc. VIII. ser. 5, 1882, p. 9. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 208, Taf. VII. fig. 19. — Frech, Devon. Avicul. Deutschlands, Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, 1891, p. 214. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 659. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 85, Taf. IX. fig. 7—10 (var. major Bittner, l. c. p. 86, Taf. IX. fig. 12, 16, 18 inclus.). — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 32, Taf. IV. fig. 18. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 67, Taf. VIII. fig. 3. Südalpen, Bakony, Karnisch.
 A. cf. *angusta* (Mstr.) Philipp, Paleont. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 95, Taf. VI. fig. 7. Südalpen, Ladinisch.
 A. sp. ind. aff. *angustae* (Mstr.) Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 86, Taf. IX. fig. 9. Nordalpen, Karnisch.
 A. *ensis* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 32, Taf. IV. fig. 19—22. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 67. Bakony, , Karnisch.
 A. *rugosa* Healey. Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new. ser. II/4, 1908, p. 21, Pl. III. fig. 18—21. Burma, Rhaetisch.
 A. sp. ind. aff. *rugosae* (Healey) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, Beitr. Geol. Niederl. Ind. II/3, p. 230, Taf. XVI. fig. 14. Sumatra, Norisch.

Subgen. **Pteroperna** Morris et Lycett.

P. malayensis Newton, On marine triass. Lymellibr. Malay Pennins., Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 132, Pl. XII, fig. 7. Malacea, Obertrias.

Bakewellia King, nom. non val., teste *Philippi*, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 153. — *Frech*, Über Gervilleia, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 620.

B. costata v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia costata.

B. costata var. *crispata* v. Schaueroth (1857) vide Avicula crispata.

B. costata var. *Goldfussi* v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia subcostata.

B. laevigata Fraas (1862) vide Avicula cf. gansingensis.

B. lineata v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia lineata.

B. lineata var. *hybrida* v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia costata.

B. lineata var. *paucicostata* v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia subcostata.

B. lineata var. *oblata* v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia lineata.

B. lineata var. *subcostata* v. Schaueroth (1857) vide Gervilleia subcostata.

B. ursina (Böhm) 1903 vide Gervilleia ursina.

Gen. **Edentula** Waagen.

Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 168.

Typ. *E. lateplanata* Waagen (1907).

E. castellii v. Wittensburg, Neue Beitr. z. Geol. etc. d. Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 78, Textfig. 11. — v. Wittensburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 32 (280), Taf. IV (XXXIX), fig. 11—13.

Südalpen, Skythisch.

E. lateplanata Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 97, Taf. XXXIV. fig. 16, 17.

Südalpen, Karnisch.

E. planata Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 191, Taf. XII. fig. 23, 24 (Gervilleia).

Südalpen, Karnisch.

E. cf. planata (Broili) Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2 1907, p. 96 Taf. XXXIV. fig. 15.

Südalpen, Karnisch.

Gen. **Hoernesia** Laube.

Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 52. — *Frech*, Devon. Aviculiden Deutschlands, Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, Berlin, 1891, p. 214. — *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 81. — *Philippi*, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 153. — *Frech*, Über Gervilleia, Zentralbl. f. Min. 1902, p. 613.

Typ. *Gervilleia Joannis Austriae* v. Klipstein (1843).

H. alata Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. VIII. fig. 30. Deutschland, Muschelkalk.

H. angusta Mansuy, Faunes de Na Chami, Mém. Soc. géol. Indochine, VI/11, 1919.

Tonkin, Karnisch.

H. Bhavani Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 107, Pl. XIII. fig. 15—17.

Himalaya, Karnisch.

H. bipartita Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, Nouv. Mém. Soc. helvét. sci. nat. Zurich, XIII. 1853, p. 96, Taf. IV. fig. 25—28 (Gervilleia). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 563 (Gervilleia). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 83, Taf. X. fig. 6—9 [Hoernesia Joannis Austriae Parona (non v. Klipstein), Fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 103, Tav. VII. fig. 3, 4, Frech, Devon. Aviculiden etc. Abhandl. Geol. Spezialk. v. Peuß, 1891, p. 75, Taf. VI. fig. 7, v. Woehrmann et Koken, Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 176 inclus.]. — Broili, Fauna d. Pachycardituffe, Palaeontograph. L. 1904, p. 192, Taf. XXII. fig. 4. — Galderi, Trias d. Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVII. Napoli, 1908, p. 56, Tav. I. fig. 16. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLII. fig. 4. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 28.

Nordalpen, Südalpen, Apennin (Salerno), Karnisch.

H. curvata Mansuy, Foss. terr. més. de Sam Nana, Mém. Sen. géol. Indochine, VII/1.

Indochina, Karnisch.

H. filosa Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 24, Pl. IV. fig. 1—9.

Burma, Rhaetisch.

H. inflata Mansuy, Faunes de Na Cham, Mém. Sen. géol., Indochine, VI/1, 1919.

Tonkin, Karnisch.

H. jenensis Passarge, Das Roeth im östl. Thüringen, 1891, p. 18. — Schmidt, Wellengeb. v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. Stat. Landesamt. Stuttgart, No. 3, 1907, p. 78 (deest imago).

Deutschland, Roeth.

H. Joannis Austriae v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 249, Taf. XVI. fig. 8 (Gervilleia). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 564. — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 53, Taf. XVII. fig. 5 [Syn. Gervilleia bipartita Merian exclus.]. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 208, Taf. VII. fig. 3. — Tommasi, Rivista fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. Teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1898, p. 24, Tav. II. fig. 3—5. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 83, Taf. X. fig. 10—15. — Martelli, Il livello di Wengen, nel Monenegro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 345. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXI fig. 6.

Nec *H. Joannis Austriae Parona* (1889) nec *Frech* (1891), nec *Woehrmann et Koken* (1892) = *H. bipartita*.

Nordalpen, Südalpen — Karnisch — Dinariden, Ladinisch?

H. cf. Joannis Austriae (Klipst.) Mansuy, Contrib. à la géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 68, Pl. XVII. fig. 24, 25.

Tonkin, Karmisch.

H. socialis v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkunde, II. 1823, p. 112, Taf. XXXVII. fig. 1 (Mytilites). — v. Ziehen, Verst. Württembergs, 1833, Tat. LXIX. fig. 7, 8 (Avicula). — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 128, Taf. XCIV. fig. 2 (Avicula). — Geinitz, Grundriß d. Versteinerungskunde, 1846, p. 457, Taf. XX. fig. 4 (Avicula). — Catullo, Mem. geo-pal. Alpi Venete 1848, p. 234 (50) Tav. II. fig. 2 (Avicula). — v. Strombeck, Beitr. z. Kennt. d. Muschelk. im NW. Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 135 (Gervilleia). — v. Hauer, Üb. d. v. Bergr. Fuchs i. d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 10, Taf. IV.

fig. 4 (Gervilleia). — Credner, Gervillien d. Triasform. i. Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 642, Taf. VI. fig. 1, 2 (Gervilleia). — Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkde., 1852, p. 514, Taf. XLII. fig. 7 (Gervilleia). — Brönn, Leth. geogn. III/3, 1856, p. 61, Taf. XI. fig. 2 (Gervilleia). — Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 29 (Gervilleia). — Bornemann, Verst. im span. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. VIII. 1856, p. 165 (Gervilleia). — v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform, ibidem, IX. 1857, p. 114. (Gervilleia). — Berger, Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 168, Taf. III. fig. 13, 14 (Gervilleia). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 589 (Gervilleia). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Tiras, 1864, p. 83 (Gervilleia). — Schmidt, Das ostthüring. Röth, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1881, p. 141. —omboni, Foss. trias. del Veneto, Atti Ist. Ven. sci. etc. Vol. VIII. ser. 5, 1882, p. 8. — Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. vom Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 155, Taf. IV. fig. 1—5. — v. Linストow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 152 (Gervilleia). — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 1. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1110. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. VIII. fig. 27. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 9. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 25, Taf. IV. fig. 17. — v. Wittenburg, Wurfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 32 (280), Taf. IV (XXXIX), fig. 6. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 70 (Gervilleia). — Hohenstein, Mittl. Muschelk. etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 224 (52). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 603, Taf. XXXII. fig. 10.

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit — Sardinien, Spanien, Muschelkalk — Südalpen, Skythisch.

H. socialis (Schloth.) var. **funicularis** Schmidt, Wellengeb. v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. Stat. Landesamt. Stuttgart, No. 3, 1907, p. 76, Taf. I. fig. 3—5.

Süddeutschland, Muschelkalk.

H. cf. socialis (Schloth.) Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. II. fig. 13. — Deutschland, Röth.

H. Sturi v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 206, Taf. VII. fig. 10—12. (Cassianella). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1 1895, p. 84, Taf. X. fig. 1—5 [var. austriaca Bittner, l. c. Taf. X. fig. 5 inclus.]. — Nordalpen, Karnisch.

H. subglobosa Credner, Gervillien d. Triasform. in Thüringen, Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 646, Taf. VI. fig. 2 (Gervilleia). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 590 (Gervilleia). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Tiras, 1864, p. 85 (Gervilleia). — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 25, Taf. IV. fig. 18. — Ahlborg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 24, 61, 84. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 604, Taf. XXXII. fig. 11, Textfig. 2.

Deutschland, Röth, Muschelkalk.

H. sp. ind. Vinassa de Regny, Foss. del Montenegro, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, Vol. X. 1903, p. 284 (466), Tav. II fig. 26. — Dinariden, Ladinisch.

H. sp. ind. Healey, Fauna of the Napeng beds of Burma, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 27, Pl. IV. fig. 11.

Burma, Rhaetisch.

Gen. **Inoceramus** Sow.

- I. (?) **arethus** M. Hoernes, Gastr. u. Aceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 50, Taf. II. fig. 18.
Nordalpen, Hallstätter Kalk.
- I. (?) **Murawiewi** Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 82, Taf. I. fig. 7.
Astrachan (Bogdo), Skythisch.
- I. (?) **priseus** v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 82, Taf. I. fig. 4.
Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

Gen. **Leproconcha** Giebel.

Verst. im Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 15.
Typ. L. paradoxa Giebel (1856).

- L. **paradoxa** Giebel, l. c. p. 15, Taf. II. fig. 10, 13. — v. Alberti,
Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 69.
Thüringen, Muschelkalk.

Gen. **Perna** Brug.

- P. **aviculaeformis** Emmrich (1832), v. Dittmar (1864),
Parona (1889) vide Gervilleia Bouei Haue.
- P. **Bouei** v. Haue (1857), Koken (1913) vide Gervilleia Bouei.
- P. **exilis** Stoppanni, Pal. Lomb. III, Couches à Av. contorta, 1865,
p. 259, Pl. LX. fig. 9—14 (Avicula). — Benecke, Trias u.
Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 159 (Avicula). —
De Lorenzo, Sul Trias dei dintorni di Lagonegro, Atti Acad.
sci. fis. mat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1892, p. 21, Textfig. 8 (Avicula).
— Bassani, Foss. dol. trias. di San Severino (Salerno), ibidem,
1893, p. 7, Tav. I. fig. 4—7 (Avicula) [A. polymorpha Costa,
Note geol. e pal. sui Mti. Picentini Atti Ist. incor. Napoli ser. 2,
T. I. 1864, p. 240, 252, Tav. V. fig. 14, 24, 25 inclus.]. —
Tommasi, Revisione fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital.
IX. 1903, p. 97, Tav. XVI. fig. 4—9. — Galderi, Malaco-
fauna trias. di Giffoni, Atti Acad. sci. fis. e mat. Napoli, XI.
1905, ser. 2, No. 17, p. 24, Textfig. 15, 16 (Gervilleia). — Frech,
Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 81, Text-
fig. 14. — Del Campagna, Foss. dol. princ. valle del Brenta.
Boll. Soc. geol. Ital. XXVI. 1907, p. 469. — Galderi, Trias
di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVII. Napoli, 1908, p. 88 (Ger-
villeia). — Di Stefano, La dolomia princ. di Palermo. Pal.
Ital. XVIII. 1912, p. 64, Tav. VIII. fig. 15—17.
Südalpen, Hauptdolomit, Rhaetisch — Apennin, Bakony
Hauptdolomit.

- P. (?) **keuperiana** Blanckhorn, Die Trias am Nordrand der
Eifel, Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 100,
Taf. III. fig. 6—15.
Deutschland, Keuper.

- P. **locyi** Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal.
1907, p. 91, Textfig. 25.
Bakony, Rhaetisch.

- P. **obruta** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser.,
II/4, 1908, p. 31, Pl. V. fig. 9—13.
Burma, Rhaetisch.

- P. **quadrata** Schafhäutl (1863) vide Gervilleia Bouei.
P. **rhaetica** v. Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861,
p. 405. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166. [Deest
imago].
Nordalpen, Rhaetisch.

- P. **undulata** v. Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861,
p. 405. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 166 [Deest
imago].
Nordalpen, Rhaetisch.

- P. vetusta** Goldfuss, Petref. Germaniae, II. 1838, p. 98, Taf. CVII, fig. 11. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 81. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- P. sp. ind. aff. vetustae** (Gdf.) Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 88, Pl. XII, fig. 5. Himalaya, Anisisch.
- P. sp. ind. Healey**, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 32, Pl. V. fig. 14—16. Burma, Rhaetisch.

Fam. Limidae d'Orbigny.

Gen. **Lima** Brug.

Subgen. **Plagiostoma** Sow., **Mantellum** Bolt. inclus.*)

- L. acuta** Stoppani (1861) vide L. praecursor.
- L. (Plagiostoma) aequilateralis** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 714, Taf. XXIII. fig. 14. Dinariden, Anisisch.
- L. alpina** v. Guenbrel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 404. — v. Dittmar, Contortaozne, 1864, p. 162 [Deest imago]. Nordalpen, Rhaetisch.
- L. alpis sordidae** Winkler, Beitr. z. Geol. d. Bayer. Alpen, Neues Jahrb. f. Min. 1864, p. 299, Taf. VI, fig. 5. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 137, Taf. VIII. fig. 8. Nordalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- L. alternans** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 175, Taf. XXII. fig. 1, 2. — De Lorenzo, Foss. Trias nied. di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 141. — Philipp, Morphol. u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 630 (Mantellum?). Südalpen, Basilicata, Karnisch.
- L. sp. ind. aff. alternans** (Bittn.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 64, Pl. X. fig. 4. Himalaya, Karnisch.
- L. sp. ind. ex aff. alternans** (Bittn.) Troula, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 105, Taf. VI. fig. 45. Nordalpen, Karnisch.
- L. angularis** Pröscholdt, Beitr. z. näh. Kenntn. d. unt. Muschelkalkes i. Franken etc. 1879, p. 11, Taf. I. fig. 12. Thüringen, Muschelkalk.
- L. angulata** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 73, Taf. VI. fig. 30. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 173, Taf. XXII. fig. 3—5. — De Lorenzo Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. I. 1896, p. 141. — Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 714. — Broili, Faun d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 176, Taf. XX. fig. 1—3, 10. — Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 8. — Wilekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturh. med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 132, Taf. V. fig. 15. Südalpen, Karnisch, Ladinisch — Dinariden, Anisisch — Basilicata, Karnisch.

*) Nach Philipp (Zeitschr. D. D. G. LII. 1900, p. 625, 636 kommen die Subgenera Radula Klein und Ctenostreon Eichw. (of. Koken, Leitfossilien. 1896, p. 181, Bittner, Über nachtriad. Verwandte d. Gattg. Mysidoptera, Verhandl. G. R. A. 1900, p. 208) in der Trias noch nicht vor.

- L. areolaris* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 172, Taf. XXII. fig. 7. Südalpen, Karnisch.
- L. cf. areolaris* (Bittn.) Toulas, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 104, Taf. VI. fig. 44. Nordalpen, Karnisch.
- L. asperulata* Guembel (1861) vide *L. inaequicostata*.
- L. austriaca* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 195, Taf. XXII. fig. 18. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 56, Taf. III. fig. 1. — Galdieri, Trias di Giffoni Atti Acad. Pont. XXXVII. Napoli, 1908, p. 55, Tav. I. fig. 17. Nordalpen, Bakony, Apennin (Salerno), Karnisch.
- L. cf. austriaca* (Bittn.) Dierner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 94, Pl. XVI. fig. 6. — Mansuy, Faunes paléoz. et trias. de l'Annam etc. Mém. Serv. géol. Indochine, II/3, 1913, p. 25, Pl. I. fig. 15. Himalaya, Annam, Karnisch.
- L. Azzarolae* Stoppiani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 74, Pl. XIII. fig. 10. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 161. — Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Belogna, ser. 2, T. V. 1866, p. 73, Tav. VI. fig. 9. Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
- L. balatonica* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 58, Taf. V. fig. 3. — v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Österr. XXVI. 1915, p. 192, Taf. XVIII. fig. 5. Bakony, Karnisch — Anatolien, Ladinisch.
- L. Baliana* Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 109, Taf. II. fig. 3. Anatolien, Norisch.
- L. Bassaniana* Parona (1889) vide Mysidioptera incurvostriata.
- L. cf. Bassaniana* (Par.) Gortani (1902) vide Mysidioptera cf. incurvostriata.
- L. sp. ind. aff. Bassanianae* (Par.) Bassani (1893) vide Mysidioptera sp. ind. aff. incurvostriatae.
- L. Beyrichii* v. Eck Form. d. Buntsandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 32, Taf. I. fig. 7. — Wagner, Neuere Versteinerungsfunde im Röth u. Muschelkalk v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XXXVII. 1885, p. 807. — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 86, Tav. I. fig. 11. — Asmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 602, Taf. XXXII. fig. 8 [L. subpunctata Ahlburg (non Orb.), Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 59 inclus.]. Deutschland, Muschelkalk.
- L. (Mantellum) biarata* Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Ak. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 19, Taf. I. fig. 42, 43. Bäreninsel, Karnisch.
- L. Bittneri* Vinassa de Regny, Revue crit. de Paléozool. I. 1897, p. 80 [Nom. nov. pr. L. Pichleri Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 192, Taf. XXII. fig. 21.]. Nordalpen, Karnisch.
- L. cf. Bittneri* Trechmann, Trias of New Zealand, Luart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 206, Pl. XXI. fig. 16. (L. cf. Pichleri). Neuseeland, Karnisch.
- L. Bochardi* Martin, Paléont. stratigraph. de l'Infralias de la Côte d'Or, Mém. Soc. géol. France, ser. 2, T. VII. 1859, p. 89, Pl. VI. fig. 14, 15. — Simonelli, Foss. retici Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5. T. II. 1891, p. 240. Frankreich, Apennin, Rhaetisch.

- L. (an Mysidioptera?) boreas* Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 25, Taf. II. fig. 1, 2.
L. Cainallii Stroppani (1859), Salomon (1895) vide Mysidioptera Cainallii. Ellesmereland, Karnisch.
- L. cancellata* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVII/1, 1895, p. 176, Taf. XXI. fig. 18. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 59, Taf. III. fig. 5. — Toulá, Küklo vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 104, Taf. VI. fig. 43. Südalpen, Nordalpen, Bakony, Karnisch.
- L. chinensis* Loezy, Wissenschaftl. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Szecsenyi in Ostasien, III. 1899, p. 142, Taf. X. fig. 8—11. — Kokon, Über trias. Verst. aus China, Neues Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 190, Anm. (Lima an Velopecten?). Yunnan, Karnisch an Ladinisch?
- L. Cisloneensis* Polifka, Fauna d. Schlerndol. Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 601, Taf. VIII. fig. 7 = *L. sp. ind.*, teste Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 144.
- L. compressa* (Terquem) Martin, Zone à Av. contorta de la Côte d'Or, Mém. Acad. de Dijon, XI. 1863/64, p. 39. Frankreich, Rhaetisch, sonst Lias.
- L. concinna* Dunker (1851) vide Plaeunopsis ostracina.
- L. conocardium* Stroppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 98, Pl. XX. fig. 1—3. Südalpen, Ladinisch.
- L. coronata* Schafhäutl (1851) vide Peeten coronatus.
- L. costata* Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 79, Taf. C. fig. 2. — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 314, Taf. II. fig. 10. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 581. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 81. — v. Eck, Form. d. Buntsandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 98. — Tornquist, Recoaro u. Schio, IV. Zeitsehr. D. G. G. LII. 1900, p. 136, Taf. III. fig. 4. — Philipp, Morphol. u. Phylogenie d. Lam. ibidem, p. 630. — Ahlbürg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. Heft 50, 1906, p. 60. — Assmann, Brach. u. Lam. d. Oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 601, Taf. XXXII. fig. 4, 5.
- Non *L. costata* Dunker, Üb. die im Muschelk. Oberschlesienges. Mollusken, Palaeontograph. I. 1851, p. 291, Taf. XXXI. fig. 25 = *L. silesiaca*.
- L. costatella* Stroppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 93, Pl. XIX. fig. 5 (Avicula). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 194 (Avicula). — Marianni, Contrib. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 249, Tav. IX. fig. 14, 15. Deutschland, Muschelkalk.
- L. crassicosta* Stroppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esno, 1859, p. 96, Pl. XX. fig. 4. Südalpen, Ladinisch.
- L. cumaunica* Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 59, Pl. X. fig. 25. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 137, Pl. XXIV. fig. 8, 9. Südalpen, Ladinisch.
- L. sp. ind. aff. cumaunicae* (Bittn.) Diener, l. c. p. 132, Pl. XXIII. fig. 14. Himalaya, Norisch.
- L. discus* Stroppani (1861), Martin (1865) vide *L. precursor*.
L. distincta Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 98, Taf. VIII. fig. 20. Himalaya, Norisch.
- Bakony, Anisisch.

- L. cf. exaltata* (*Ter que m*) *Ooster*, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern 1869, p. 76, Taf. III, fig. 1. Schweiz, Rhaetisch.
- L. fassaensis* *Salomon* (1895) vide *Mysidioptera fassaensis*.
- L. Finkelsteini* *Salomon* (1895) vide *Mysidioptera Finkelsteini*.
- L. flexicostata* *Winkler*, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 470, Taf. VI, fig. 5. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 161. Nordalpen, Rhaetisch.
- L. gibbosa* *Catullo*, Mem. geogn. pal. s. Alpi Venete, 1847, p. 55, Tav. IV, fig. 1 = ? *Pseudomonotis Schaurothi*, cf. v. *Schauroth*, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 318.
- L. (Plagiostoma) gigantea* (*Sow*) *Goebel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 132. Karpathen, Rhaetisch, sonst Lias.
- L. Hakoni* *Kittl*, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 22, Taf. II, fig. 4 (Plagiostoma). Ellesmereland, Karnisch.
- L. (Plagiostoma) hatensis* *Kittl*, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 24, Taf. II, fig. 5, 6. Ellesmereland, Karnisch.
- L. inaequicostata* *Schafhäutl*, Neue Petref. d. südbayer. Vorgeb. Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 410 (deest imago). — *Stoppani*, Stud. geol. e pal. s. Lombardia, 1858, p. 273, 391. — v. *Dittmar*; Contortazone, 1864, p. 161 [*L. asperluata* v. *Gembel*, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 404, *Pecten* sp. ind (?) *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 78, Pl. XV. fig. 5, 6 inclus.]. — *Parona*, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889 p. 80, Tav. IV, fig. 2. — v. *Woehrmann*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 653. Nordalpen, Südalpen, Karnisch bis Rhaetisch.
- L. (?) incerta* *Stoppani*, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 98, Pl. XX, fig. 5. Südalpen, Ladinisch.
- L. incurvostrriata* v. *Gembel* (1851), v. *Woehrmann* (1889, 1823) vide *Mysidioptera incurvostrriata*.
- L. interpunctata* *Schmid* et *Schleiden* (1846) vide *L. striata* var. radiata *Gdf*.
- L. Lavizzarii* *Stabile*, Foss. terr. trias. nei dintorni d. Lago di Lugano, 1854, p. 7 (deest imago). — v. *Hauer*, Über ein. Foss. aus d. Dol. d. Mte Salvatore, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XV. 1855, p. 414, Taf. I, fig. 10. — *Mariani*, Foss. Trias med. Portovaltravaglia et. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 43. Südalpen, Anisisch?
- L. (Plagiostoma) lineata* (*Schloth*) *Giebel* (1856), v. *Schauroth* (1858), v. *Seebach* (1861), v. *Eck* (1865), *Tommasi* (1894), *Philippi* (1900), *Tornquist* (1904), *Walther* (1906) vide *L. (Plagiostoma) striata* var. *lineata*, v. *Ziethen*, Verst. Würt. 1833, Taf. L, fig. 2 vide *L. striata* var. *lineata*, fig. 3 vide *L. striata* var. *radiata*.
- L. lineato-punctata* *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 137, Pl. XXXI, fig. 14. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 161. — *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 214. — *Ooster*, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 75, Taf. III, fig. 3. — *Goebel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 134. Schweiz, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- L. loczyi* *Bittner*, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes. Pal. Bal. 1901, p. 56, Taf. III, fig. 3, 4. Bakony, Karnisch.

- L. millepunctata** v. G u e m b e l , Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 404. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 161 (deest imago). Nordalpen, Rhaetisch.
- L. (Plagiostoma) mystea** B i t t n e r , Triaspetref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 109, Taf. II. fig. 1. Anatolien, Norisch.
- L. (Plagiostoma) nuda** P a r o n a , Studio monogr. fauna Raibl, Lombardia, 1889, p. 83, Tav. IV. fig. 5 — v. W o e h r m a n n , Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 652. Südalpen, Karnisch?
- L. (?) Oliva S t o p p a n i ,** Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 75, Pl. XIII. fig. 13, 14. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 162. Südalpen, Rhaetisch.
- L. opulenta** B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. VIII/1, 1895, p. 174, Taf. XXII. fig. 6. Südalpen, Karnisch.
- L. Paronai M a r i a n n i ,** Contrib. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 248, Tav. IX. fig. 13. Südalpen, Ladinisch.
- L. paulula** B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 193, Taf. XXIV. fig. 2, 3. — B i t t n e r . Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 56, Taf. III. fig. 2. Nordalpen, Bakony, Karnisch.
- L. cf. paulula** B i t t n e r , l. c. p. 193 [Typ. L. sp. aff. striatae (Schlothe.) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 108, Taf. IV. fig. 5]. Südalpen, Ladinisch.
- L. paupercula** B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 193, Taf. XXIV. fig. 5. Südalpen, Karnisch.
- L. Pichleri* B i t t n e r (1895) [non Zittel] Trechmann (1917) vide L. Bittneri.
- L. (Radula?) praecursor** Q u e n s t e d t , Der Jura, 1856, p. 29, Taf. I. fig. 22. — W i n k l e r , Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 8, Taf. V. fig. 1. — W i n k l e r , Der Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 470. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 160 [L. discus Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 73, Pl. XIII. fig. 7, L. acuta Stoppanni, l. c. p. 74, Pl. XIII. fig. 9, ? Area imperialis Stoppanni (non Roemer). l. c. p. 81, Pl. VI. fig. 17, inclus.]. — C a p e l l i n i , Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 72, Tav. VI. fig. 8. — S i m o n e l l i , Foss. retici di Cetona, ibidem, ser. 5, T. II. 1891, p. 20, Tav. I fig. 13. — V i n a s s a d e R e g n y , Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 834. England, Deutschland, Frankreich, Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch.
- L. cf. praecursor** (Q u e n s t.) O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 76, Taf. III. fig. 4. Schweiz, Rhaetisch.
- L. punctata** (S o w.) S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta 1861, p. 73, Pl. XIII. fig. 1—6. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 160 [Pecten punctatus Stoppanni, l. c. p. 78, Pl. XV. fig. 3 inclus.]. — C a p e l l i n i , Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 71, Tav. VI. fig. 7. — O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 75, Taf. III. fig. 2 (L. Valoniensis). — G o e t e l , Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 133. Nec *L. punctata* G r a f z u M ü n s t e r (1841) nec v. K l i p s t e i n (1843) = *L. subpunctata*.
- Schweiz, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch, sonst Lias.

- L. (Plagiostoma) sp. ind. aff. punctatae** (Sow.) Krumbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, 1913, p. 34, Taf. I. fig. 18. Indonesien, Norisch.
- L. radiata** Goldfuss (1838), v. Alberti (1864), v. Eck (1865), Philipp (1903) vide L. striata var. radiata.
- L. regularis** Klöden, Verst. d. Mark Brandenburg, 1834, p. 195, Taf. III. fig. 1 (Plagiostoma), v. Ziehen, Verst. Würt. 1833. Taf. LXIX. fig. 3, v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 80, Taf. I. fig. 3 = sp. incert. teste v. Seebach, Conchylief. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 581 = Sp. non triad., teste v. Eck, Rüdersdorf, Abhandl. Geol. Spezialk. v. Preußen, I/1, 1872, p. 87.
- L. retifera** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 176, Taf. XXII. fig. 8. Südalpen, Karnisch.
- L. Ripii** Böhm, Obertriad. Faunen d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 21, Taf. II. fig. 6. Bäreninsel, Karnisch.
- L. Salmojraghii** Marianni, Contr. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 249, Tav. X. fig. 4. Südalpen, Ladinisch.
- L. serraticosta** Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 50, Pl. VIII. fig. 12, 13, X. fig. 26. Himalaya, Norisch.
- L. cf. serraticosta** (Bittner) Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic, noric faunae of Spiti, 1908, p. 99, 132, Pl. XVII. fig. 6. Himalaya, Norisch.
- L. (Mantellum) silesiaca** Philipp, Grignageb., Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 725 [Nom. nov. pr. L. costata Dunker (non Mstr.) Über d. im Muschelk. Oberschlesiens ges. Mollusken, Palaeontograph. I. p. 291, Taf. XXXIV. fig. 25.]. — Philipp, ibidem, LII. 1900, p. 630. Norddeutschland, Muschelkalk — Südalpen, Anisisch.
- L. (Radula?) Skuphi** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 108, Taf. IV. fig. 4. Südalpen, Ladinisch.
- L. spinosostriata** v. Gembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 405. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 161 (deest imago). Nordalpen, Rhaetisch.
- L. (Plagiostoma) spitzbergensis** Lundgren, Jura- u. Triasfoss. v. Spitzbergen, Bihang Svenska Vet. Akad. Handl. VIII. Stockholm, 1883, p. 20, Taf. II. fig. 17. — Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 19, Taf. I. fig. 48, II. fig. 2, 3. Spitzbergen, Bäreninsel, Karnisch.
- L. (Plagiostoma) striata** v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkde. II. 1823, Taf. XXXIV. fig. 1 (Chamites). — v. Ziehen, Verst. Würt. 1833, p. 66, Taf. L. fig. 1 (Plagiostoma). — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 78, Taf. C. fig. 1. — v. Hauer, Üb. ein. Foss. aus d. Dol. d. Mts. Salvatore, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XV. 1855, p. 414, Taf. I. fig. 11, 12. — v. Schauroth, Geogn. Verh. v. Recoaro, ibidem, XVII. 1855, p. 508. — v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent. ibidem, XXXIV. 1858, p. 310, Taf. II. fig. 8. — Bronn, Leth. geogn. III. 1856, Taf. XI. fig. 9. — v. Seebach, Conchylief. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 582. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 79. — v. Eck, Form. d. Buntsandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 53 (var. genuina). — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 86. — Philipp, Morph. u. Phylogenie d. Lam. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 624. — Philipp, Kont.

Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 7. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1108, 1111. — Langenhan, Verst. d. Deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 10, 11. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 26, Taf. V. fig. 21. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper i. Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 68. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 601, Taf. XXXII. fig. 1, 2.

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit. — Sardinien, Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

L. (*Plagiostoma*) *striata* var. *lineata* v. Schloth., Nachr. z. Petrefaktenkde. II. 1823, Taf. XXXV, fig. 1 (*Chamites lineatus*). — v. Ziehen, Verst. Würt. 1833, p. 66, Taf. L. fig. 2 (*Plagiostoma*). — Goldfuss, Petref. Germaniae, II. 1838, p. 79, Taf. C. fig. 3c (non a, b). — Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 26, Taf. VI. fig. 11. — v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst. im Vicent., Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 311, Taf. II. fig. 9. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 583. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 77. — v. Eck, Form. d. bunt. Sandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 53. — v. Seebach, Balaniden auf L. *lineata*, Zeitschr. D. G. G. XXIII. 1871, p. 781. — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 85. — Philippi, Morph. u. Phylog. d. Lam. Zeitschr. D. G. G. LIII. 1900, p. 624. — Tornquist, Ausseralp. Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1108. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 8. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 25, Taf. IV. fig. 20. — Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 60. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 601, Taf. XXXII. fig. 3.

Deutschland, Röth, Muschelkalk. — Sardinien, Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

L. (*Plagiostoma*) *striata* var. *radiata* Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 79, Taf. C. fig. 3a, b, 4. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 79 [L. *interpunctata* Schmid et Schleiden, Geogn. Verh. Thüringens, 1876, p. 42, Taf. IV. fig. 6 inclus.]. — v. Eck, Form. d. bunt. Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 53 [Plag. *lineatum* v. Ziehen, Verst. Würt. 1833, p. 65, Taf. L. fig. 2, Pl. *ventricosum* v. Ziehen, l. c. Taf. L. fig. 3, L. *lineata* Bronn, Leth. geogn. III. 1856, Taf. XI. fig. 10 inclus.]. — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 6. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 9.

Deutschland, Muschelkalk.

L. sp. ind. aff. *striatae* (Schloth.) Salomon (1895) vide L. cf. paulula.

L. sp. ind. aff. *striatae* (Schloth.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal Ind. new ser. V/1, 1913, p. 89, Pl. XII. lig. 12.

Himalaya, Anisisch.

L. sp. ind. aff. *striatae* (lineatae) [Schloth.] et praecursoris (Winkl.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II[1], Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 33, Taf. I. fig. 17.

Indonesien, Norisch.

L. *striatoides* Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 18, Taf. II. fig. 1.

Bäreninsel, Karnisch.

L. *strigilis* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 175, Taf. XXII. fig. 9, 10.

Südalpen, Karnisch.

- L. *subeumaunica* K r u m b e c k , Ob. Trias, v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 34, Taf. I. fig. 19, 20. — J a w o r s k i , Nuculamerget v. Misol, Palaeont. v. Timor, II/5, 1915, p. 96, Taf. XLII. fig. 20, 21. Indonesien, Norisch.
- L. (*Mantellum*) *subdupla* S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 74, Pl. XIII. fig. 11, 12. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 162 [L. minuta v. G u e m b e l , Bayer. Alpengeb. 1861, p. 405 inclusus]. — M a r t i n , Etage rhétien, 1865, p. 242. — G o e t e l , Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 135, Taf. VIII. fig. 7.
- 107 Frankreich, Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
L. subglabra v. G u e m b e l , Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 275 = sp. non val.
- L. (*Plagiostoma*) *subpunctata* d' O r b i g n y , Prodrome, I. 1819, p. 200 [Nom. nov. pr. L. punctata G r a f z u M ü n s t e r , Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 73, Taf. VI. fig. 29, v. K l i p s t e i n , Östl. Alpen, 1843, p. 248, Taf. XVI. fig. 6]. — L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien XXV. 1865, p. 72, Taf. XX. fig. 1. — P a r o n a , Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 81, Tav. IV. fig. 3. — v. W o e h r m a n n , Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 652. — S a l o m o n , Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 143, Taf. IV. fig. 9, 14, 15 [fig. 10, 11, 12 exclus = Mysidioptera Reyeri B i t t n , teste B i t t n , l. c. p. 171, 184]. — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 170, Taf. XXI. fig. 19, 20. — P h i l i p p i , Morph. u. Phylog. d. Lam. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 625. — K i t t l , Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 714. Non *L. subpunctata* A h l b u r g (1906) = *L. Byrichii* E c k . Südalpen, Karnisch, Ladinisch. — Dinariden, Anisisch.
- L. (*Plagiostoma*) *subpunctata* (O r b.) var. *incerassata* P h i l i p p i , Grignageb. Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 727. Südalpen, Anisisch.
- L. cf. *subpunctata* (O r b.) W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 108. Südalpen, Karnisch.
- L. cf. *subpunctata* (O r b.) M a n s u y , Contr. à la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 66, Pl. XVII. fig. 4—6. — D i e n e r , Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 109, Pl. XIII. fig. 19. Tonkin, Ladinisch (?). — Himalaya, Karnisch.
- L. (*Plagiostoma*) sp. ind. aff. *subpunctatae* (O r b.) B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 172, Taf. XXI. fig. 21, 22. — B i t t n e r , Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 98, Taf. VIII. fig. 19. Südalpen, Bakony, Anisisch, Ladinisch.
- L. (*Plagiostoma*) sp. ind. aff *subpunctatae* (O r b.) D i e n e r , Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 90, Pl. XII. fig. 9—11. Himalaya, Anisisch.
- L. (*Plagiostoma*) sp. ind. ex aff. *subpunctatae* (O r b.) K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 33. Indonesien, Norisch.
- L. *subquadrata* S t o p p a n i , Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 98, Pl. XX. fig. 7. Südalpen, Ladinisch.
- L. *Svenanderi* B ö h m , Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. Stockholm, 1903, p. 20, Taf. II. fig. 7, 8, 15, 21. Bäreninsel, Karnisch.
- L. *Taramellii* T o m m a s i , Una Lima nuova etc. di Recoaro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 302, Tav. VIII. fig. 1. Südalpen, Anisisch.

- L. *tarnowitzensis* Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 602, Taf. XXXII, fig. 6, 7. Schlesien, Muschelkalk.
- L. *Telleri* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 194, Taf. XXIV, fig. 4. — Tornquist, Recoaro, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 667. — Philip, Geol. Unters. aus d. Geb. v. Predazzo, ibidem, LVI. 1904, p. 68, Taf. VI, fig. 22. — Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 249. — Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano ser. 2, Vol. XXXVIII. 1908, p. 17. — Willekens, Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 130, Taf. V. fig. 14. Südalpen, Ladinisch.
- L. *Tommasii* Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleont. VIII. 1902, p. 85, Tav. VIII. fig. 18. Südalpen, Karnisch.
- L. *Valoniensis* (Defr.) Ooster (1869) vide L. cf. punctata.
- L. (*Plagiostoma*) *ventricosa* v. Ziethen (1833) vide L. strata var. radiata Gdf.
- L. *venusta* Wissmann, Neues Jahrb. f. Min. 1842, p. 311. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 81 (deest imago). Deutschland, Muschelkalk.
- L. *vicentina* Tornquist, Recoaro u. Schio, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 668, Taf. XXII. fig. 2. Südalpen, Ladinisch.
- L. *Victoriae* De Lorenzo, Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. II, 1896, p. 142, Tav. XVIII. fig. 1—6. Basilicata, Karnisch?
- L. *vix-costata* Stoppani (1859) vide Mysidioptera vix-costata.
- L. *vulgarissima* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 97, Pl. XIX. fig. 13—15. Südalpen, Ladinisch.
- L. *Zittelii* Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 177, Taf. XX. fig. 4. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 108. Südalpen, Karnisch.
- L. sp. ind. Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 98, Pl. XIX. fig. 17. Südalpen, Ladinisch.
- L. sp. ind. Stoppani, ibidem. III. Couches à Av. contorta, 1859, p. 74, Pl. XIII. fig. 8. Südalpen, Rhaetisch.
- L. (*Radula?*) nov. sp. ind. Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. Tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 16, Tav. I. fig. 4 vide Mysidioptera incurvostriata.
- L. sp. ind. Troula, Muschelkalkfauna am Golfe v. Ismid, Beitr. Pal. Oest. X. 1896, p. 160, Taf. XVIII. fig. 4. — v. Arthaber, Trias v. Bithynien, ibidem, XXVII. 1915, p. 192. Anatolien, Anisisch.
- L. sp. ind. I. Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 50, Pl. VII. fig. 20. Himalaya, Karnisch.
- L. sp. ind. II. Bittner, l. c. p. 50, Pl. VIII. fig. 21. Himalaya, Norisch.
- L. sp. ind. Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 177, Taf. XX. fig. 5. Südalpen, Karnisch.

Gen. **Limea** Bronn.

- L. *margineplicata* v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 248, Taf. XVI. fig. 7. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 73, Taf. XX. fig. 2. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 169, Taf. XXI. fig. 16. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 55, Taf. V. fig. 1. Südalpen, Bakony, Karnisch.

L. Protei Gra f z u M ü n s t e r , Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 72 (deest imago) [Pecten]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 170, Taf. XXI, fig. 17.

Südalpen, Karnisch.

L. cf. Protei (M str.) Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes. Pal. Bal. 1901, p. 55, Taf. V. fig. 2.

Bakony, Karnisch.

Gen. **Mysidioptera** Salomon.

(Subgen. **Latemaria** Wilckens,
Pseudacesta Waag. inclus.)

Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 117. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 177. — Bittner, Über d. triad. Lamellibranchiatengattung Mysidioptera etc. Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 59. — Philipp, Morph. u. Phylogenie d. Lam. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 620.

Typ. *M. ornata Salomon* (1895).

M. acuta Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 184, Taf. XXI. fig. 16, 17. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 110 (*M. spinigera* Bittn. var. *acuta*).

Südalpen, Karnisch.

M. aequicostata Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 139, Taf. V. fig. 24.

Südalpen, Ladinisch.

M. ambigua Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 182, Taf. XX. fig. 14. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontograph. L. 1904, p. 181, Taf. XXI. fig. 3.

Südalpen, Karnisch.

M. ampezzana Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 182, Taf. XXI. fig. 3.

Südalpen, Karnisch.

M. angusticostata Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontograph. L. 1904, p. 183, Taf. XXVIII. fig. 13—15. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 109, Textfig.

Südalpen, Karnisch.

M. aviculaeformis Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 185, Taf. XXII. fig. 5.

Südalpen, Karnisch.

M. sp. ind. aff. aviculaeformis (Broili) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 110.

Himalaya, Karnisch.

M. baconica Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 62, Taf. II. fig. 2.

Bakony, Karnisch.

M. Bassanii De Toni, Fauna trias. Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 179, Tav. XV. fig. 4.

Südalpen, Ladinisch.

M. Beneckeii Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 197, Taf. XXI. fig. 11.

Südalpen, Ladinisch.

M. Bittneri Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 187, Taf. XXII. fig. 12.

Südalpen, Karnisch.

M. Buchi Böhni, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 21, Taf. I. fig. 53, 54.

Bäreninsel, Karnisch.

- M. Cainallii Stoppa**, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 97, Pl. XX. fig. 6 (Linta). — **Salamon**, Maritolata, Palaeontograph. XLIII, 1895, p. 144, Taf. IV. fig. 16 (Linta). — **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 180, Taf. XX. fig. 15—17 (var. costata l. c. p. 188, Taf. XX. fig. 18 inclus.). — **De Lorenzo**, Foss. Trias med. di Lagonegro, Pal. Ital. II, 1896, p. 143. — **Mariani**, Contr. a. studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 6, 23. — **Galdieri**, Trias d. Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 84. Tav. II. fig. 16. — **Wilekens**, Pal. Unters. triad. Faumen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 133, Taf. V. fig. 19. — **Tommasi**, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 26, Taf. 11, fig. 25.
Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Apennin (Salerno). — Karnisch.
- M. sp. ind. aff. Cainallii** (Stoppa) **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 190, Taf. XX. fig. 29—31. — **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 180, Taf. XXI. fig. 1, 2.
Südalpen, Karnisch.
- M. carinata** **Waagen**, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 113, Taf. XXXIV. fig. 36.
Südalpen, Karnisch.
- M. cassiana** **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 178, Taf. XX. fig. 1.
Südalpen, Karnisch.
- M. (?) cimbriana** **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 68. Taf. VIII. fig. 27, 28.
Bakony, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. cimbrianae** (Bittn.) **Simionescu**, Fauna Trias inf. Dobrogea, Acad. Rom. V. Boucarest, 1911, p. 66, Texfig. 3.
Dobrudscha, Skythisch.
- M. compressa** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 186, Taf. XXII. fig. 6, 7.
Südalpen, Karnisch.
- M. crassicostata** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 182, Taf. XXI. fig. 6—8.
Südalpen, Karnisch.
- M. densistriata** **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 93, Taf. III. fig. 3.
Bakony, Anisisch.
- M. Dieneri** **Frech**, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 82, Textfig. 15.
Bakony, Hauptdolomit.
- M. dinarica** **Bittner**, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien etc. Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 604, Taf. XXVII. fig. 34.
Dinariden, Anisisch.
- M. divaricata** **Mansuy**, Faunes de Na Cham, Mém. Serv. géol. Indochine, VI/1, 1919.
Tonkin, Karnisch.
- M. dolomitica** **Koken**, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 28 (deest imago).
Südalpen, Karnisch.
- M. (?) dubiosa** **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 199, Taf. XXII. fig. 19, 20 [Nom. nov. pr. Hinmites granulosus Laubé (non Spondylus granulosus v. Klipstein), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 74, Taf. XX. fig. 12].
Südalpen, Karnisch.
- M. elongata** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 184, Taf. XXI. fig. 18.
Südalpen, Karnisch.

- M. Emiliae** Bittner, Über d. triad. Lamellibranchiatengattung Mysidioptera, Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 60, Taf. VI. fig. 1—7. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 181, Taf. XXI. fig. 4, 5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIX. fig. 20. — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 109, Taf. XXXIV. fig. 30 (var. intermedia).
Südalpen, Karnisch.
- M. erecta** Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 140, Taf. V. fig. 23.
Südalpen, Ladinisch.
- M. eximia** Dierner, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new. ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 91, Pl. XI. fig. 8.
Himalaya, Anisisch.
- M. fassaensis** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 142 Taf. III. fig. 6 (non 7 = M. Cainallii var. costata Bittn.). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 196, Taf. XXI. fig. 8—10. — Asmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 607, Taf. XXXII. fig. 22, 23.
Südalpen, Ladinisch. — Schlesien, Muschelkalk.
- M. cf. fassaensis** (Sal.) Simionescu, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. Boucarest, IV. 1910, p. 514.
Dobrudscha, Karnisch.
- M. Finkelsteini** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 142, Taf. IV. fig. 8 (Lima). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 195, Taf. XXI. fig. 6, 7.
Südalpen, Ladinisch.
- M. fornicate** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 184, Taf. XX. fig. 11.
Südalpen, Ladinisch.
- M. glaberrima** Kittl, Sarajévo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 715, Taf. XXIII, fig. 13.
Dinariden, Anisisch.
- M. gracilis** Broili, Fauna d. Paichycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 188, Taf. XXII. fig. 17.
Südalpen, Karnisch.
- M. Gremblachii** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 191, Taf. XXII. fig. 14. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 66, Taf. II. fig. 10, 11, 13, 14.
Nordalpen, Bakony, Karnisch.
- M. gronensis** v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VII/5, 1908, p. 31 (279), Taf. IV. fig. 4.
Südalpen, Skythisch.
- M. H. Philippi** Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 135, Taf. V. fig. 20, 22.
Südalpen, Ladinisch.
- M. ineuvostriata** v. Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 275 (Plagiostoma). — v. Woehrmann, Fauna d. Carditasch. etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 202, Taf. VI. fig. 10, 11 (Lima). — v. Woehrmann et Koken, Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 172 (Lima) [L. Bassaniana Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 82, Tav. IV. fig. 1, et L. nov. sp. ind. Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 10, Tav. I. fig. 4 inclus.]. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 652 (Lima). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 191, Taf. XXII. fig. 11, 12. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 64,

- Taf. II. fig. 9, 12. — **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 180, Taf. XX. fig. 17, 18. — **Freeth**, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 69, Taf. VIII. fig. 4. — **Simioneseu**, Fauna trias. Ins. Popina, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 514, Textfig. 24, 25.
Nordalpen, Südalpen, Bakony, Dobrudscha, Karnisch.
- M. cf. incurvostriata** (Gümb.) **Gortani**, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 85 (Lima cf. Bassaniana). — **Toula**, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 105.
Südalpen, Nordalpen, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. incurvostriatae** (Güemb.) **Bassani**, Foss. nella dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 10, Tav. I. fig. 16—18. (Lima sp. ind. aff. Bassaniana).
- Apennin (Salerno), Rhaetisch.
- M. interrupta** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 189, Taf. XXII. fig. 18—20.
Südalpen, Karnisch.
- M. intertexta** **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 183, Taf. XXI. fig. 4. — **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 179, Taf. XX. fig. 15, 16.
Südalpen, Karnisch.
- M. inversa** **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 68, Taf. III. fig. 7.
Südalpen, Karnisch.
- M. Klipsteiniana** **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 181, Taf. XXI. fig. 2.
Bakony, Karnisch.
- M. Kochi** **Freeth**, Neue Zweisehalter etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 28, Textfig. 49.
Südalpen, Karnisch.
- M. Laezkoi** **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bayonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 66, Taf. III. fig. 9—11.
Bakony, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. Laezkoi** **Bittner**, Brach. u. Lant. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LII. 1902, p. 636.
Bakony, Karnisch.
- M. latifissa** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 185, Taf. XXII. fig. 1.
Dinariden, Karnisch.
- M. marginata** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 183, Taf. XXI. fig. 11.
Südalpen, Karnisch.
- M. Marmolatae** **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 195, Taf. XXI. fig. 5.
Südalpen, Karnisch.
- M. Maraschinii** **Tornquist**, Recoaro u. Schio, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 669, Taf. XXI. fig. 7.
Südalpen, Ladinisch.
- M. Marzari-Peneatii** **Tornquist**, Recoaro u. Schie, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 669, Taf. XXI. fig. 5.
Südalpen, Ladinisch.
- M. multicostata** **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 62, Taf. II. fig. 3—6.
Südalpen, Ladinisch.
- M. multistriata** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 182, Taf. XXI. fig. 9, 10.
Bakony, Karnisch.
- M. obliqua** **Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 187, Taf. XXII. fig. 13—15. — **Wilckens**, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 136.
Südalpen, Karnisch.
- Südalpen, Ladinisch, Karnisch.

- M. oblonga** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 180, Taf. XX. fig. 12. Südalpen, Karnisch.
- M. obscura** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 199, Taf. XXII. fig. 13. — Waagen Lam. d. Pachycardientuffe etc. ibidem, XVIII/2, 1907, p. 112, Taf. XXXIV. fig. 34, 35. Südalpen, Karnisch.
- M. ornata** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 117, Taf. V. fig. 18, 20. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 185, Taf. XXI. fig. 14 [var. lombardica, l. c. p. 185, Taf. XXI. fig. 13, var. laevigata, l. c. 186, Taf. XXI. fig. 12 inclus.]. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 143. — Tommasi, Foss. di Ghegna, ibidem, XVII. 1911, p. 28, Tav. III. fig. 2 (var. elata). Südalpen, Basilicata, Ladinisch, Karnisch.
- M. planata** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 186, Taf. XXII. fig. 8—11. Südalpen, Karnisch.
- M. radiata** Rassmus, Wurfene Schichten bei Berchtesgaden, Zeitschr. D. G. G. LXIII. Monatsber. 1911, p. 555, Textfig. 1, 2. Nordalpen, Skythisch.
- M. Readi** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 185, Taf. XXII. fig. 2—4. Südalpen, Karnisch.
- M. cf. Readi** (Broili) Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 111, Textfig., Taf. XXXIV. fig. 31, 32. — Willekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 138. Südalpen, Karnisch, Ladinisch.
- M. Reyeri** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 183, Taf. XX. fig. 5, 6 [Typ. M. Woehrmanni Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 157, Taf. V. fig. 16, 17 (non 6), Lima subpunctata Salomon, l. c. Taf. IV. fig. 10—12 inclus.?]. Südalpen, Ladinisch.
- M. sp. ind. aff. Reyeri** (Bittn.) Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 28, Tav. III. fig. 3. Südalpen, Karnisch.
- M. rotunda** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 189, Taf. XXII. fig. 21. Südalpen, Karnisch.
- M. Saccoci** Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907, p. 251, Tav. X. fig. 5. — Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1907, p. 19, Tav. X. fig. 5. Südalpen, Ladinisch.
- M. Salomonis** Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 115, Tav. II. fig. 7 (Lucina). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 179, Taf. XX. fig. 2, 3. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, Vol. XLVI. Milano, 1913, p. 774, Textfig. 1. Südalpen, Anisisch.
- M. silvatica** Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 14, Textfig. 13. Bakony, Anisisch.
- M. similis** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 63, Taf. II. fig. 7, 8. — Toulou, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 105 Taf. VI. fig. 46—47. Bakony, Nordalpen, Karnisch.
- M. spinescens** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 59, Taf. II. fig. 1. Bakony Karnisch.

- M. spinigera** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 175, Taf. XX, fig. 32. — Bittner, Über d. triad. Lamellibranchiatengattung Mysidioptera, Jahrb. G. R. A. L. 1900, p. 59. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 59.
Südalpen, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. spinigerae** Bittner, Brach. u. Lam. aus d. Trias v. Bosnien, Jahrb. G. R. A. LIII, 1902, p. 635.
Dinariden, Karnisch.
- M. striata** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 183, Taf. XXI, fig. 12.
Südalpen, Karnisch.
- M. striatula** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 179, Taf. XX, fig. 4 = sp. non val., teste Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 93.
- M. tenella** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 181, Taf. XXI, fig. 1.
Südalpen, Karnisch.
- M. tenuicostata** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 64, Taf. III, fig. 12.
Bakony, Karnisch.
- M. vix-costata** Stoppioni, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 97, Pl. XIX, fig. 16. (Lima). — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII, 1895, p. 144. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 189, Taf. XX, fig. 24—28.
Südalpen, Ladinisch.
- M. vix-costata** (Stoppioni) var. lennaensis Mariani, Appunti di Pal. Lomb. Atti Soc. Ital. sci. nat. XXXVI, Milano, 1896, p. 128, Tav. II, fig. 1 (Lima). — Mariani, Appunti geol. e pal. sui dintorni di Schilpario, Rendic. Ist. Lomb. Milano, XXXII, 1889, p. 12, Textfig. — Mariani, Contr. a studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI, Milano, 1907, p. 250. — Contr. a studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII, Milano, 1908, p. 6, 18, 23.
Südalpen, Ladinisch.
- M. cf. vix-costata** (Stoppioni) Willekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. Z. X. 1909, p. 134, Taf. V, fig. 18. — Tommasi, Foss. di Ghegna, I, 1911, p. 27, Tav. III, fig. 1. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XLVI, Milano, 1913, p. 774.
Südalpen, Anisisch, Ladinisch.
- M. Woehrmanni** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII, 1895, p. 157, Taf. V, fig. 15 [non 16, 17 = M. Reyeri Bittn.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 178, Taf. XX, fig. 7—10. — Tornquist, Recoaro u. Schio, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 668, Taf. XXI, fig. 2. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 179, Taf. XX, fig. 12—14. — Scalia, Fauna Trias sup. di Judica, Boll. Acad. Gioenia, sci. nat. Catania, 1908, p. 20. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII, Napoli, 1908, p. 85, Tav. II, fig. 17. — Scalia, Il gruppo di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII, 1909, p. 295, Tav. IX, fig. 12.
Südalpen, Ladinisch, Karnisch — Apennin (Salerno), Sizilien, Karnisch.
- M. cf. Woehrmanni** (Sal.) Willekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 137, Taf. V, fig. 21.
Südalpen, Ladinisch.
- M. sp. ind. Mansuy**, Contr. à la carte géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 67, Pl. XVII, fig. 7.
Tonkin, Ladinisch.

M. (an gen. ind?) sp. ind. Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 141, Taf. V. fig. 17. — Südalpen, Ladinisch.

M. sp. ind. Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 92, Pl. XII. fig. 13. — Himalaya, Anisisch.

M. sp. ind. Mansuy, Contr. faunes paléoz. et trias. Tonkin, Mém. Serv. géol. Indochine, II/5, 1913, p. 27, Pl. IV. fig. 10. — Tonkin, Karnisch?

Subgen. **Latemaria** Wilckens.

Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 220.

Typ. Mysidioptera Kittlii Bittner (1895).

L. globosa Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 188, Taf. XXII. fig. 16. — Wilckens, l. c. 1909, p. 220. — Südalpen, Karnisch.

L. sp. ind. aff. globosae (Broili), Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 110. — Himalaya Karnisch.

L. inflata Wilckens, l. c. 1909, p. 220, Taf. VII. fig. 11. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 181. — Südalpen, Ladinisch.

L. sp. ind. aff. inflatae (Wilck.) Simionescu, Fauna trias. Desli-Caira, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 482, Textfig. 22. — Dobrudscha, Ladinisch.

L. Kittlii Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 198, Taf. XXI. fig. 15. (Mysidioptera). — Kittl-Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 715. — Kittl, Trias, bild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LXXXI. 1908, p. 517. — Simionescu, Fauna trias. Desli Caira, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 481, Textfig. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 181. — Südalpen, Dobrudscha, Ladinisch. — Dinariden, Anisisch.

Subgen. **Pseudacesta** Waagen.

Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 114.

Typ. Mysisoptera Dieneri Waagen (1907).

P. Dieneri Waagen, l. c. p. 113, Taf. XXXIV. fig. 33. — Südalpen, Karnisch.

Gen. **Aviculolima** Philippi.

Morph. u. Phylogenie d. Lam. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 622. — Typ. A. Jaekeli Philippi (1900).

A. Jaekeli Philippi, l. c. p. 622, Taf. XXIV. fig. 8. — Norddeutschland, Unt. Muschelkalk.

Gen. **Badiotella** Bittner.

Brach. d. alp. Trias, Abhandl. G. R. A. XIV. 1890, p. 94. — Bittner, Nachtrag, ibidem, XVII/2, 1892, p. 13. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, ibidem, XVIII/1, 1895, p. 200.

Typ. B. Schauerothiana Bittner (1895).

B. concentrica Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 178, Taf. XX. fig. 6, 7. — Südalpen, Karnisch.

- B. *excellens* Philipps, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 69, Taf. VI. fig. 5, Textfig. 8.
Südalpen, Ladinisch.
- B. cf. *excellens* (Philipps) Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 29, Tav. III. fig. 5, 6.
Südalpen, Karnisch.
- B. *gracilis* Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 177, Taf. XX. fig. 9.
Südalpen, Karnisch.
- B. (?) *incerta* Toulza, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 106, Taf. VI. fig. 48.
Nordalpen, Karnisch.
- B. *Schaurothiana* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 201, Taf. XXII. fig. 17 [Nom. nov. pr. B. cf. spuria Graf zu Münster, in Bittner, Brach. d. alp. Trias, l. c. p. 94, Taf. XXXVII. fig. 31].
Südalpen, Karnisch.
- B. *subpunctata* Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 178, Taf. XX. fig. 8.
Südalpen, Karnisch.
- B. (?) *Taramellii* Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 30. Tav. III. fig. 7.
Südalpen, Karnisch.

Gen. **Tirolidia** Bittner.

- Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 202.
Typ. *T. Haueriana* Bittner (1895).
- T. Cassiana** Bittner, l. c. p. 202, Taf. XXII. fig. 16.
Südalpen, Karnisch.
- T. Haueriana** Bittner, l. c. p. 202, Nom. nov. pr. Biv. (?) sp. ind. v. Hauer, Über d. v. Bergf. Fuchs i. d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 16, Taf. IV. fig. 17.
Südalpen, Ladinisch.
- T. Valarsana** Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 203, Taf. XXII. fig. 15.
Südalpen, Ladinisch.

Gen. **Hokonuia** Trechmann.

- Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LXXIII. 1917, p. 203.
Typ. *H. limaeformis* Trechmann (1917).
- H. limaeformis** Trechmann, l. c. p. 204, Pl. XX. fig. 4, XXII, fig. 2, 5.
Neuseeland, Karnisch.
- H. rotundata** Trechmann, l. c. p. 205, Pl. XX. fig. 5, XXI., fig. 1, 3, 4.
Neuseeland, Karnisch.

Fam. **Spondylidae** Gray.

Dimya intusstriata Simonelli (1891), Principi (1908, 1910).
Merciaia (1908) vide *Plicatula* (*Dimyopsis*) *intusstriata*.

Gen. **Dimyodon** Mun. Chalm.

Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 219.

- D. Argyropuli** Skuphos, Die stratigraphische Stellung d. Partnachschichten etc. Geogn. Jahreshefte, IV. 1892, p. 138, Taf. I. fig. 6.

Nordalpen, Karnisch?

- D. intusornatus* Frech (1904) vide *Dimyopsis intusornata*.
D. intusstriatus v. Woehrmann (1889, 1893) vide *Dimyodon Woehrmanni*, v. Arthaber (1906) vide *Dimyopsis intusstriata*.
D. patera Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 18, Taf. II. fig. 25.
Bäreninsel, Karnisch.
D. Richthofeni Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 217, Taf. XXII. fig. 32. — Jaworski, Nuculamerget v. Misol, Palaeontol. v. Timor, II/5, 1915, p. 103, Taf. XLIV. fig. 14.
Südalpen, Karnisch — Indonesien, Norisch.
D. Woehrmanni Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 219 [Typ. *D. intusstriata* v. Woehrmann (non Esmrich), Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 209 Taf. VIII. fig. 4—6.].
Nordalpen, Karnisch.

Gen. **Plicatula** Lam.

Subgen. **Dimyopsis** Bittner, **Pseudoplacunopsis** Bittner inclus.

- P. Archiaci** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 140, Pl. XXXIII. fig. 1—6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 163 [*Anomia fissistriata* Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 467, Taf. V. fig. 10 inclus.]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 83, Taf. IV. fig. 21. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten, etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 201, Taf. VI. fig. 8 (*Placunopsis fissistriata*). — Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 14, Tav. I. fig. 6 (*Placunopsis fissistriata*). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 654 (*Placunopsis fissistriata*). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 161.
Nordalpen, Südalpen, Karnisch, Rhaetisch — Karpathen, Rhaetisch.
P. cf. Archiaci De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 143 (*Placunopsis* cf. *fissistriata*).
Basilicata, Karnisch.
P. cf. Archiaci (Stopp.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV, Beitr. Geol. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 241, Taf. XVI. ifg. 9. (*Placunopsis* cf. *fissistriata*).
Sumatra, Norisch.
P. sp. ind. aff. Archiaci (Stopp.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru, ibidem, Beitr. Geol. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 45, Taf. II. fig. 17. (*Placunopsis* sp. aff. *fissistriatae*).
Indonesien, Norisch.
P. Barnensis Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 82, Pl. XVIII. fig. 5. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 163.
Südalpen, Rhaetisch.
P. Beryx Ooster (1869) vide *Ostrea gracilis*.
P. carinata Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 48, Pl. VIII. fig. 2.
Burma, Rhaetisch.
P. cloacea Vaughan, in Reynolds et Vaughan, The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 202, Pl. XVIII. fig. 5, Textfig. 3.
England, Rhaetisch.
P. difficilis Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 49, Pl. VIII. fig. 3.
Burma, Rhaetisch.

- P. filifera** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, 214, Taf. XXIII. fig. 30, 31. Südalpen, Karnisch.
- P. hettangiensis** (Terquem) Renevier, Notes géol. et pal. s. l. Alpes Vaud. I. Infralias, Mém. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, T. VIII. 1865, Pl. III. fig. 4. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 81, Taf. IV. fig. 19. Schweiz, Rhaetisch, sonst Lias.
- P. cf. hettangiensis** (Terqu.) Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 82. Südalpen, Rhaetisch.
- P. imago** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A., XVIII/1, 1895, p. 213, Taf. XXIII. fig. 23—29. — Gortani. Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 86, Südalpen, Karnisch.
- P. cf. imago** (Bittn.) Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 730. Dinariden, Karnisch.
- P. leucensis** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 81, Pl. XV. fig. 17. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 162. Südalpen, Rhaetisch.
- P. cf. leueensis** (Stoppp.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 81, Taf. IV. fig. 18. Schweiz, Rhaetisch.
- P. Ogilviae** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 212, Taf. XXIII. fig. 20, 21. Südalpen, Karnisch.
- P. (?) papiracea** Stoppani (1861), v. Dittmar (1864) vide P. Stoppanii.
- P. (Harpax) sp. ind. aff. Parkinsonii** (Bronn) Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 161. Karpathen, Rhaetisch.
- P. plexicosta** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 212, Taf. XXIII. fig. 22. Südalpen, Karnisch.
- P. Schlottheimi** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 244, Taf. XV. fig. 26 (Spondylus). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 210, Taf. XXIII, fig. 14, 15. Südalpen, Karnisch.
- P. (an Placunopsis?) sessilis** Koken, Über triass. Verst. aus China. Neues Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 204, Textfig. 2. Kwei-tchou (China), Ladinisch?
- P. solea** Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 75, Taf. XX. fig. 9. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 211. Südalpen, Karnisch.
- P. cf. spinosa** (Sow.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 83, Taf. IV. fig. 22. Schweiz, Rhaetisch.
- P. Stoppanii** Martin, Etage rhétien, 1865, p. 248 [Nom. nov. pr. P. papiracea Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 82, Pl. XVII. fig. 1—4, v. Dittmar (non Terquem), Contortazone, 1864, p. 163.] Südalpen, Rhaetisch.
- P. (?) Xeniae** Vinassa de Regny, Foss. del Montenegro, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, Vol. X. 1903, p. 225 (467), Tav. II. fig. 24. Dinariden, Ladinisch.
- P. (an Placunopsis?) sp. ind.** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 49, Pl. VIII. fig. 1. Burma, Rhaetisch.
- P. (?) sp. ind.** Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1908, p. 23, Tav. II. fig. 17. Südalpen, Karnisch.

P. (an Enantiostreon?) nov. sp. ind. *Toula*, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. C. R. A. LXIII. 1913, p. 110, Taf. VI. fig. 58, 59. Nordalpen, Karnisch.

Subgen. **Dimyopsis** Bittner.

Lant. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 72. Typ. *Ostrea intusstriata* Emmerich (1853).

D. *intusornata* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 72, Taf. VI. fig. 27, 28. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, ibidem, 1904, p. 30, Textfig. 43. (Dimyodon). Bakony, Karnisch.

D. *intusstriata* Emmerich, Geogn. Beobacht. aus d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 52 (*Ostrea*). — Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 7 (*Ostrea*). — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 502 (*Ostrea*). — Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, Pl. XVI. fig. 25 (*Ostrea*). — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 80, Pl. XV. fig. 9—16 (Hinnites) [*Spondylus obliquus* Merian, in Escher, Geol. Ber. üb. d. nördl. Vorarlberg, Nouv. Mém. Soc. Helvet. sci. nat. Zurich, XIII. 1853, Pl. IV. fig. 44, 45 inclus.]. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 162 [*Ostrea placunoides* Schafhäutl (non Schlotheim,) Neuo Petref. d. südbayer. Vorgeb. Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1851, p. 413, Taf. VII. fig. 7 inclus. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 247. — Capellini, Foss. infralias, golfo d. Spezia, Mém. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 74, Tav. VI. fig. 12. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 81, Taf. IV. fig. 17. — Stefanini, Rhaet. Foss. d. Apuanischen Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 97. — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mém. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 21 Tav. I. fig. 16 (Dimya). — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, Taf. XLIX. fig. 9 (Dimyodon). — Vinnassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 835 (Dimyodon). — Principi, Studio geol. d. Mte. Malbe, ibidem. XXXVII. 1908, p. 190, Tav. VII. fig. 3 (Dimya). — Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 228, Tav. VII. fig. 12, 13 (Dimya). — Principi, Foss. retici d'Amelia, Rivista Paleont. Ital. XVI. 1910, p. 23 (Dimya). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, Nov. Dec. 1916, p. 158.

England, Frankreich, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch, Lias.

D. cf. *intusstriata* (Emmer.) Krumböck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 44, 146, Textfig. 3.

Indonesien, Norisch.

D. *parasita* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 216, Taf. XXIII. fig. 19 (Placunopsis). — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 73.

Bakony, Karnisch.

D. *plana* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 73, Taf. VI. fig. 29.

Bakony, Karnisch.

Subgen. **Pseudoplacunopsis** Bittner.

Lant. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 215. Typ. *Plicatula affixa* Bittner (1895).

P. *affixa* Bittner, l. c. p. 215, Taf. XXIII. fig. 17, 18.

Südalpen, Karnisch.

P. *placentoides* Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 209, Pl. XXI. fig. 14, 15. Neuseeland, Karnisch.

Gen. **Prospondylus** Zimmermann.

Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 23, 25. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2 1907 p. 172, 175.

P. *comptus* Goldfuss, Petref. Germ., III. 1838, p. 3, Taf. LXXII. fig. 6 (Ostrea). — v. Schauroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 508 (Hinnites). — Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 25, Taf. VI. fig. 4 (Hinnites) [Spondylus comptus Goldfuss, l. c. p. 93, Taf. CV. fig. 1 inclus.]. — v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst. i. Vicentin. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 307 (Hinnites). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 579 (Hinnites). — Benecke, Üb. einige Muschelkalk-Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 42, Taf. III. fig. 9 (Hinnites). — Nöting, Entwicklung d. Trias i. Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 322, Taf. XIII. fig. 3 (Hinmites an Terquemias?). — Proscholdt, Beitr. z. näh. Kenntn. d. unt. Muschelk. i. Franken etc. 1879, p. 16, Taf. I. fig. 17 (Hinnitas). — Philippi, Beitr. z. Morphol. u. Phylogenie d. Lam. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 618. — Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablag. zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 714. (Hinnites). — Mariani, Foss. Trias med. Portovaltravaglia etc. Atti Soc. Ital. sci. nat. XL. Milano, 1901, p. 44 (Hinnites). — Philippi, Leth. mes. I/1, Kontin. Trias, 1903, Taf. IV. fig. 3. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, Taf. V. fig. 24 (Hinnites). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. X. fig. 1—4 (Hinnites). — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 26, Taf. III. fig. 4. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 596. Deutschland, Röth, Muschelkalk — Südalpen, Anisisch.

P. *erassus* Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 175, Taf. XIX. fig. 28.

Südalpen, Karnisch.

P. sp. ind. aff. *crasso* (Broili) Simionescu, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Romana, IV. Boucarest, 1910, p. 513, Textfig. 23. Dobrudscha, Karnisch.

P. *esinensis* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 105, Pl. XXIII. fig. 4—6 (Ostrea). — Mariani, Contr. a studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907, p. 255.

Südalpen, Ladinisch.

P. *Ombonii* Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 84, Tav. V. fig. 2—4 (Hinnites). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 653 (Hinnites).

Südalpen, Nordalpen (?), Karnisch.

P. sp. ind. aff. *Ombonii* (Par.) Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 175, Taf. XIX. fig. 30.

Südalpen, Karnisch.

P. *palliatum* Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 174, Taf. XIX. fig. 27.

Südalpen, Karnisch.

P. *Sismondae* Stoppani, Studii geol. e pal. sulla Lombardia, 1858, p. 273, 298 (Hinnites). — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 83, Tav. V. fig. 1 (Hinnites).

Südalpen, Karnisch.

P. *Taramellii* Mariani, Contr. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907, p. 251, Tav. X. fig. 6.

Südalpen, Ladinisch.

P. **Zimmermanni Broili**, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 176, Taf. XIX, fig. 29 (valv. sin.). — **Waagen**, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 114, Textfig. (valv. recta).

Südalpen, Karnisch.

Gen. **Spondylus** Lang.

S. acutecostatus v. **Klipstein**, Östl. Alpen, 1843, p. 245, Taf. XV, fig. 28 = Gen. inc. sp. incert., teste **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 205, 226.

S. denticostatus v. **Klipstein**, Östl. Alpen, 1843, p. 245, Taf. XV, fig. 29 = Mysidoptera sp. ind. aff. obseurae **Bittn.**, teste **Bittner**, Lam. v., St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 205.

S. granulosus v. **Klipstein**, Östl. Alpen, 1843, p. 245, Taf. XV, fig. 27 = Gen. incert. sp. incert., teste **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 205, 226.

S. latus v. **Klipstein** (1843) vide **Terquemia** (*Philippiella*) lata. *S. obliquus* **Merian** (1853) vide *Plicatula* (*Dimyopsis*) intusstriata, **Münster** (1841) vide **Terquemia** obliqua.

S. Schlotheimi **Merian** (1832) vide *Prospondylus comptus*, v. **Klipstein** (1843) vide *Plicatula Schlotheimii* (non *Hinnites Schlotheimii* **Merian**).

S. squamicostatus v. **Guembel**, Geogn. Beschr. d. bayer. Alpengeb. 1861, p. 403 (deest imago) = Gen. ind. sp. ind.

S. subvelatus **Graf zu Münster** (1841) vide *Pecten subvelatus*.

S. (?) sp. ind. **Krumbeck**, Ob Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 45, Taf. XI, fig. 2.

Indonesien, Norisch.

Gen. **Terquemia** Tate.

(Subgen. **Philippiella** Waagen inclus.)

Philippi, Morph. u. Phylogenie d. Lam. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 613.

T. complicata **Nöting** (1880), **Philippi** (1898), **Ahlburg** (1906), **Langenhan**, **Wurm** (1911) vide *Enantiostreum* difforme.

T. (?) compta **Nöting** (1880) vide *Philippiella Noetlingi*.

T. decencostata **Ahlburg** (1906), **Langenhan** vide *Enantiostreum* difforme.

T. difformis **Nöting** (1880), **Ahlburg** (1906) vide *Enantiostreum* difforme.

T. margine-lobata **Tommasi**, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 25, Tav. II. fig. 22, 23.

Südalpen, Karnisch.

T. multicostata **Langenhan** vide *Enantiostreum multicostatum*.

T. ostracina **Nöting** (1880) vide *Placunopsis ostracina*.

T. placunoides **Langenhan**, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. X. fig. 1—4 vide *Placunopsis placunoides*.

T. (?) sp. ind. **Wilckens**, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 148, Taf. VI. fig. 18.

Südalpen, Ladinisch.

T. sp. ind. I. **Toula**, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 109, Taf. VII. fig. 56. — **sp. ind. II.** **Toula**, l. e. p. 109, Taf. VII. fig. 57.

Nordalpen, Karnisch.

Subgen. **Philippiella** Waagen.

Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 173. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1912, p. 28.

Typ. *Spondylus obliquus Münter* (1841).

P. angustula Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 209, Taf. XXIII. fig. 10.

Südalpen, Karnisch.

P. cassiana Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 208, Taf. XXIII. fig. 11, 12. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1908, p. 24, Tav. II. fig. 20.

122 Südalpen, Karnisch.

P. denticostata Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 74, Taf. XX. fig. 7 (Hinnites). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 205, Taf. XXIII. fig. 1. — De Lorenzo, Foss. Trias med. Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 143. — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleontol. VIII, 1902 p. 85 (Hinnites). — Tommasi Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1908, p. 24, Tav. II. fig. 21. — Scalia, Il gruppo di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 281, 285, 312 (Placunopsis).

Südalpen, Karnisch.

P. cf. denticostata (Labe) Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 85, Tav. V. fig. 5 (Hinnites). — Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 15. — v. Woehrtmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 651. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 206.

Südalpen, Karnisch.

P. lata v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 241, Taf. XV. fig. 25 (Spondylus). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 207, Taf. XXIII. fig. 8. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 194, Taf. XXIII. fig. 6—8. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 173.

Südalpen, Karnisch.

P. Neetlingi Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten, Pal. Bal. I/1, 1912, p. 29, Taf. III. fig. 1—3 [Typ. *Terquemia compta* Nöting (non Goldfuss), Entwicklung d. Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 23, Taf. XIII. fig. 3.] — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 595, Taf. XXXI. fig. 1—4.

Südalpen, Karnisch.

P. obliqua Graf zu Münter, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 74, Taf. VI. fig. 34 (Spondylus). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 73, Taf. XX. fig. 8 (fig. 8a, 8b exclus.). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 206, Taf. XXIII. fig. 2—7. — Philippi, Beitr. z. Morphol. u. Phylogenie d. Lam. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 617. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 194, Taf. XXIII. fig. 9. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVII/2, 1907, p. 173.

Deutschland, Muschelkalk.

P. nov. sp. ind. aff. obliquae (Mstr.) Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei vom Gaumannmüllerkogel, Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 380, Taf. XII. fig. 2.

Südalpen, Karnisch.

P. spondylina Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 209, Taf. XXIII. fig. 9.

Nordalpen, Karnisch.

Südalpen, Karnisch.

Fam. Ostreidae Lam.

Gen. **Ostrea** L.

- O. alpina* v. Dittmar (1864) vide *Placunopsis alpina*.
- O. anomala** (Terqu.) Renevier, Not. géol. etc. sur les Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1864, p. 40. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 173. Schweiz, Karpathen, Rhaetisch, sonst Lias.
- O. ascendens* Stoppiani (1861) vide *Ostrea (Alectryonia) Haidingeriana*.
- O. avicularis* v. Klipstein (1843) vide *Cassianella gryphaeata*.
- O. brevicostata* Proescholdt (1879) vide *Enantiostreum (?) brevicoustum*.
- O. Bronni* v. Klipstein (1843) vide *Cassianella gryphaeata*.
- O. calceoformis** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 195, Taf. XIII. fig. 10, 11. — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 116, Taf. XXXIV. fig. 37, 38.
- Südalpen, Karnisch.
- O. complicata* Goldfuss (1838), v. Eck (1865), Langenhahn, Walther (1906) vide *Enantiostreum difforme*.
- O. compta* Goldfuss (1838) vide *Prospondylus comptus*.
- O. conica* Stoppiani (1861) vide *Alectryonia Haidingeriana*.
- O. costulata* Stoppiani (1861) vide *Alectryonia Haidingeriana*.
- O. crista difformis* v. Schlotheim (1823) v. Alberti (1864) vide *Enantiostreum difforme*.
- O. decemeostata* Goldfuss (1838) vide *Enantiostreum difforme*.
- O. difformis* Goldfuss (1838) vide *Enantiostreum difforme*.
- O. esinensis* Stoppiani (1859) vide *Prospondylus esinensis*.
- O. exigua* (Dunk.) Schmid et Schleiden (1846) vide *Enantiostreum spondyloides*.
- O. filicosta** Benecke, Muschelkalk-Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 33, Taf. II. fig. 6—9. — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 82, Tav. I. fig. 9.
- Südalpen, Anisisch.
- O. fimbriata** Moore, Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 501, Pl. XVI. fig. 24.
- England, Rhaetisch.
- O. gracilis** Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 6, Taf. I. fig. 3 (Anomia). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 155 (*O. inflexostriata*). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 172 [? *Plicatula Beryx Ooster*, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 82, Taf. IV. fig. 20 inclus.].
- Nordalpen, Karpathen, Schweiz (?), Rhaetisch.
- O. hinnites**, Stoppiani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 86, Pl. XVII. fig. 9, 10. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 155 [*O. tetaculata* v. Guembel, Bayer. Alpengeb 1861, p. 403 inclus.].
- Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch. —
- O. Hisingeri** (Nilsson) Lundgren, Stud. öfver faun. i. d. stenkols för. form. i. Skane, Fisiogr. Sällsk. Minneskr. Lund, 1878, p. 36, Taf. I. fig. 28, 29, 40. — Lundgren, Molluskfaun. i. Sveriges äldre mes. bild. Lunds Univ. Arskr. XVII. 1881, p. 22.
- Südschweden (Skane), Rhaetisch, sonst Lias.
- O. inflexostriata* Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 402 vide *O. gracilis* Winkler, cf. Martin, Etage rhétien, 1865, p. 250.
- O. intusstriata* Emmerich (1853), Winkler (1859, 1861) vide *Plicatula (Dimyopsis) intusstriata*.
- O. irregularis** (Gdf.) Martin, Etage rhétien, 1865, p. 249. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 84, Taf. I. fig. 21.
- Frankreich, Schweiz, Rhaetisch, sonst Lias.

- O. koessenensis** Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 4. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 155 [O. rhaetica v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 402 (var. incrassata, l. c. p. 403 inclus.)]. Ostrea sp. ind. Stoppanni, Pal. Lomb. III. Cocuches à Av. contorta, 1861, p. 86, Pl. XVII. fig. 8 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 248 (= ? O. anomala. Terquem). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 171. Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- O. Lipoldi** Bittner, Lami, v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 229, Taf. VII. fig. 10, 11. Südalpen, Ladinisch.
- O. liscaviensis* Giebel (1856), v. Alberti (1864) vide Enantiostreum liscaviense.
- O. Marcigniana* Martin (1860) vide Alectryonia Haidingeriana.
- O. Marshii* Stoppanni (1861) vide Alectryonia Haidingeriana.
- O. multicosiata* Goldfuss (1838), Giebel (1856), v. Alberti (1864) vide Enantiostreum multicostatum.
- O. nodosa* Stoppanni (1861) vide Alectryonia Haidingeriana.
- O. ostracina* v. Seebach (1861), Benecke (1868) vide Placunopsis ostracina.
- O. palmetta* Stoppanni (1861) vide Alectryonia Haidingeriana.
- O. Pietetiana** (Mortillet) Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 211, Pl. XXXVII. fig. 1—10. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 201, Taf. VI. fig. 6. Nordalpen, Karnisch — Südalpen, Rhaetisch, sonst Lias.
- O. cf. Pietetiana** (Mort.) Lundgren, Stud. öfver faun. i. d. stenskolsför. form. i. Skane, Fisiogr. Sällsk. Minneskr. Lund, 1878, p. 38, Taf. II. fig. 64. — Lundgren, Molluskfaun. i. Sveriges äldre mes. bild. Lunds Univers. Arsskr. XVII. 1881, p. 23. Südschweden (Skane), Rhaetisch.
- O. placunoides* Goldfuss (1838), Giebel (1858) vide Placunopsis placunoides, Schafhäutl (1851) vide Dimyopsis intusstriata.
- O. reniformis* Goldfuss (1838) vide Placunopsis subanomia.
- O. rhaetica* v. Guembel (1861) vide O. koessenensis.
- O. scabiosa* Giebel (1856), v. Alberti (1864) vide Enantiostreum scabiosum.
- O. Schuebleri* Goldfuss (1838) vide Placunopsis subanomia.
- O. sessilis* v. Schlotheim (1822) vide Placunopsis ostracina.
- O. solitaria* Schafhäutl (1851) vide Alectryonia Haidingeriana, Schafhäutl (1865) vide A. montis caprili.
- O. spondyloides* v. Schlotheim (1823), Goldfuss (1838) vide Enantiostreum spondyloides.
- O. subanomia* Goldfuss (1838), v. Schauroth (1858), v. Alberti (1864) vide Placunopsis subanomia.
- O. subanomia* var. *beryx* v. Schauroth (1857) vide Placunopsis beryx.
- O. tetaculata* v. Guembel (1861) vide O. hinnites.
- O. Tinieri** Renvier, Not. géol. etc. sur l. Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 42, Pl. III. fig. 5. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 250. Westschweiz, Rhaetisch.
- O. torquata** Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 83, Tav. I. fig. 10. Südalpen, Anisisch.
- O. venusta* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, Taf. VII. fig. 1 = Gen. ind. sp. ind.
- O. Willebadensis** Dunker, Über d. im Muschelk. Oberschlesiens ges. Mollusken, Palaeontograph. I. 1851, p. 312, Taf. XXXVI. fig. 19. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias. 1864, p. 69. Deutschland, Muschelkalk.

- O. sp. ind.* Stoppanni, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 105, Pl. XXIII. fig. 7, 8, 10, 11 = Gen. ind. sp. ind., teste Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907. p. 252.
O. sp. ind. Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 86, Pl. XVII. fig. 8 vide *O. koesssenensis*.
0. sp. ind. Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches a Av. contorta, 1863, p. 211, Pl. XXXIV. fig. 115. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 173.

Savoyen, Karpathen, Rhaetisch.

- 0. nov. sp. ind.** Philippi, Grignageb. Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 725, Taf. XXI. fig. 7. Südalpen, Anisisch.
0. sp. ind. Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 16, Taf. I. fig. 47. Bäreninsel, Karnisch.

Gen. **Alectryonia** Fischer.

- A. Haidingeriana** Ehrmann, Geogn. Beobacht. aus d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 377. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 154 [*O. solitaria* Schafhäutl, Neue Petref. d. südbayer. Vorgeb. N. Jahrb. f. Min. 1851, p. 419, *O. Marcigniana* Martin, Paléont. stratigr. de l'Infralias de la Côte d'Or, Mém. Soc. géol. France sér. 2, Vol. VII. 1860, p. 90, Pl. VI. fig. 24, 25, *O. Marshii* Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 85, Pl. XVI. fig. 11, *O. nodosa* Stoppanni, l. c. p. 83, Pl. XVI. fig. 1, 2, 7, *O. palmetta* Stoppanni, l. c. p. 84, Pl. XVI. fig. 3, 5, *O. ascendens* Stoppanni, l. c. p. 85, Pl. XVI. fig. 8 inclus.]. — Renevier, Not. géol. etc. sur l. Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 79. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 248 [*O. conica* Stoppanni, l. c. p. 85, Pl. XVI. fig. 9, 10, *O. costulata* Stoppanni, l. c. p. 84, Pl. XVI. fig. 6 inclus.]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 83, Taf. I. fig. 22. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 169, Taf. IX. fig. 4 [*O. Marcigniana* Renevier, l. c. p. 79 inclus.].

Frankreich, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.

- A. cf. Haidingeriana** (Ehrmann) Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 37, Pl. V. fig. 17—19. Burma, Rhaetisch.

- A. mediocostata** v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 201, Taf. VI. fig. 5. Nordalpen, Karnisch.

- A. montis caprilis** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 247, Taf. XVI. fig. 5. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 200, Taf. VI. fig. 1—3 [*Ostrea cristagalli* Schafhäutl (non De France), Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 361, *Ostrea solitaria* Schafhäutl, Der weiße Jura im Wettersteingeb. etc. Neues Jahrb. f. Min. 1865, p. 793, Taf. V. fig. 6 inclus.]. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 13, Taf. I. fig. 3. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 74, Taf. VI. fig. 14—18. — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleont. VIII. 1902, p. 86. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLII. fig. 8, 9.

Nordalpen, Südalpen, Bakony, Karnisch.

- A. parasitica** Krumböck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Boitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 47, Taf. III. fig. 7. Indonesien, Norisch.

- A. cf. *parasitica* K r u m b e c k , l. c. p. 48, Taf. III. fig. 8.
Indonesien, Norisch.
- A. *vermicostata* v. W o e h r m a n n , Fauna d. Carditaschichten etc.
Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 201, Taf. VI. fig. 4.
Nordalpen, Karnisch.

Gen. **Enantiostreon** Bittner.

Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 70. —
F r e e h , Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1912, p. 30.
Typ. E. hungaricum B i t t n e r (1901).

- E. *brevicostatum* P r ö s c h o l d t , Beitr. z. näh. Kenntn. d. unt.
Muschelk. i. Franken etc. 1879, p. 16, Taf. I. fig. 16.
Deutschland, Muschelkalk.

- E. *diforme* v. S c h l o t h e i m . Nachtr. z. Petrefaktenkunde, 1823,
Taf. XXXVI. fig. 2 (Ostracites crista difformis). — G o l d f u s s ,
Petref. Germ. II. 1838, p. 2, Taf. LXXII. fig. 1 (Ostrea). —
v. A l b e r t i , Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 64 (Ostrea) [O. complicata Goldfuss, l. c. p. 5, Taf. LXXII. fig. 3 inclus.]. —
v. E e k , Üb. d. Form. d. bunt. Sandst. etc. i. Oberschles., 1865,
p. 51, 95, 115 (Ostrea). — N ö t l i n g , Entwickl. d. Trias i.
Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 322, Taf.
XIII. fig. 2 (Terquemia). — P h i l i p p i , Fauna d. Trigondusdol. v. Hühnerfeld etc. Jahresh. Ver. d. vaterl. Naturkd.
Würt. 1898, p. 150 (Terquemia complicata). — L o e z y , Wiss.
Ergebn. d. Reise d. Grafen B. S z e c h e n y i in Ostasien, III.
1899, p. 145, Taf. X. fig. 14, 15 (Terquentia). — P h i l i p p i ,
Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 2 (Ostrea). —
A h l b u r g , Die Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß.
Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 56, 84 (Terquentia). —
L a n g e n h a n , Verst. d. deutsch. Trias, Taf. X. fig. 7—9
(Terquemia decemcostata), 10—14 (T. complicata). — W u r n t ,
Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 105,
Taf. VI. fig. 12 (Terquentia complicata). — A s s m a n n , Brach.
u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915,
XXXVI/1, Heft 3, p. 591, Taf. XXX, fig. 17—19, Textfig. 1.
[Ostrea complicata Goldfuss, l. c. p. 5, Taf. LXXII. fig. 3,
v. S e e b a c h , l. c. p. 566, v. E e k , l. c. p. 51, 95, 115, Ter-
quemia complicata N ö t l i n g , l. c. p. 322, Taf. XIII. fig. 1,
A h l b u r g , l. c. p. 57, Ostrea decemcostata Goldfuss, l. c.
p. 3, Taf. LXXII. fig. 4, G i e b e l , Lieskau, 1856, p. 9, Taf. II.
fig. 4, 5, v. A l b e r t i , Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 64, v.
S e e b a c h , Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G.
XII. 1861, p. 567, P h i l i p p i , Grignageb. ibidem, XLVII.
1895, p. 724, Terquemia decemcostata A h l b u r g , l. c. p. 57,
E. difforme var. septemcostata F r e e h , Leitfoss. d. Werfener
Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1912, p. 33, Taf. V. fig. 2a, 2b, var.
decemcostata F r e e h , l. c. Taf. V. fig. 2a inclus.].

Deutschland, Röth, Muschelkalk — Aragonien, Muschel-
kalk — Yunnan (China), Karnisch.

- E. cf. *diforme* (S c h l o t h.) S a l o m o n , Marmolata, Palaeonto-
graph. XLII. 1895, p. 107, Taf. IV. fig. 1—3.
Südalpen, Karnisch.

- E. sp. ind. aff. *diformi* (S c h l o t h.) T o n n i m a s i , Foss. di Ghegna,
Pal. Ital. XVII. 1908, p. 23, Tav. II. fig. 18, 19 (Ostrea sp. ind.
aff. multicostatae).
Südalpen, Karnisch.

- E. *Gepidorum* F r e e h , Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal.
Bal. I/1, 1912, p. 32, Taf. V. fig. 5.
Bakony, Skythisch.

- E. *hungaricum* B i t t n e r , Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes,
Pal. Bal. I/1, 1901, p. 70, Taf. VI. fig. 20—25.
Bakony, Karnisch.

- E. lisceaviense* Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 10, Taf. II. fig. 2 (Ostrea). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 65 (Ostrea). Deutschland, Muschelkalk.
- E. multicostatum* Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, Taf. LXXII. fig. 2 (Ostrea). — Giebel, Lieskau, 1856, p. 11, Taf. II. fig. 9. (Ostrea). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 65 (Ostrea). — Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907, p. 252 (Ostrea) [Ostrea sp. ind. Stoppiani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 105, Pl. XXIII. fig. 9 inclus.]. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. X. fig. 15 (Terquemia). Deutschland, Muschelkalk — Südalpen, Ladinisch.
- E. cf. multicostatum* (Mstr.) Philippi, Grignageb. Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 725. Südalpen, Anisisch.
- E. seabiosum* Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 11, Taf. II. fig. 17 (Ostrea). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias 1864, p. 65 (Ostrea). Deutschland, Muschelkalk.
- E. spondyloides* v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkunde, 1823, Taf. XXXVI. fig. 1b (Ostracites). — Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 3, Taf. LXXII. fig. 5 (Ostrea). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 568 (Ostrea). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 63 (Ostrea) [O. subspondyloides d'Orbigny, Prodome, 1850, p. 177, O. exigua (Dunk). Schmidet Schleiden, Die geogn. Verhältn. Thüringens, 1846, Taf. IV. fig. 4, Anomia matercula Queenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 1851, Taf. XL. fig. 6 inclus.]. — v. Eck, Über d. Form. d. bunten Sandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 51 (Ostrea). — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV, fig. 1 (Ostrea). Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. X. fig. 16 (Terquemia). — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1912, p. 32, Taf. V, fig. 4. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 594, Taf. XXX. fig. 20. Deutschland, Muschelkalk.

Gen. *Gryphaea* Lam.

- G. arcta* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, Taf. VII. fig. 2 = sp. inval., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 221.
- G. avicularis* Münter (1841), Laubé (1865) vide Cassianella avicularis.
- G. Keilhau* Böhm, Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 16, Taf. I. fig. 35, 37, 38, 44—46, 50—52. Bäreninsel, Karnisch.
- G. sp. ind. aff. Keilhau* Böhm, l. c. p. 17, Taf. I. fig. 49. Bäreninsel, Karnisch.
- G. Skuld* Böhm, Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 17, Taf. I. fig. 36, 39—41. — Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 21. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907. p. 30, Taf. II. fig. 7. Bäreninsel, Ellesmereland, Karnisch.

Fam. Anomiidae Gray.

Gen. *Anomia* Müller.

- A. alpina* Winkler (1859), v. Guembel (1861), Merciai (1908), Pridcipi (1910) vide Placunopsis alpina.
- A. alta* Giebel (1856) vide Placunopsis alta.
- A. Andraei* Giebel (1856) vide Placunopsis subanomia.
- A. beryx* Giebel (1856), v. Seebach (1861), v. Alberti (1864) vide Placunopsis beryx.

- A. Favrii Stoppanni* (1863), *Simonelli* (1891), *Vinassa de Regny* (1906), *Schmidt* (1909), vide *Placunopsis Favrii*.
A. fissistriata Winkler (1861), v. *Woehrmann* (1889, 1893), *Tommasi* (1890) vide *Plicatula Archiae*.
A. gracilis Winkler (1859) vide *Ostrea gracilis*.
A. Hebertii Stoppanni (1863) vide *Placunopsis alpina*.
- A. Hoffmanni De Stefani**, Rhaet. Foss. d. apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 97. Apennin, Rhaetisch.
- A. irregularis Martin* (non Terquem), Etage rhétien, 1865, p. 251 vide *Placunopsis Favrii*.
- A. matercula Quenstedt* (1851) vide *Enantiostreon spondyloides*.
- A. Mortilleti Stoppanni* (1863), v. *Dittmar* (1864), *Martin* (1865), *Cappellini* (1866) vide *Placunopsis Mortilleti*.
- A. Napengensis Healey* (1908) vide *Placunopsis Napengensis*.
- A. pellucida Martin* (non Terquem), Etage rhétien, 1865, p. 250 vide *Placunopsis alpina*.
- A. Picteti Stoppanni* (1863) vide *Placunopsis alpina*.
- A. (?) pusilla Koken**, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 28, Taf. VI. fig. 3. Südalpen, Karnisch.
- A. Revonii Stoppanni* (1863) vide *Placunopsis alpina*.
- A. Schafhäutli Winkler* (1859), *Stoppanni* (1863), *Dumortier* (1864), *Ooster* (1869) vide *Placunopsis alpina*.
- A. striatula (Oppel) Principi**, Stud. geol. Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 191, Tav. VII. fig. 6. — *Merciai*, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 229, Tav. VII. fig. 15. — *Principi*, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleontol. XVI. 1910, p. 24, Tav. I. fig. 18, 19. Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- A. Talegii Stoppanni* (1863) vide *Placunopsis alpina*.
- A. tenuis Dunker* (1851) *Placunopsis subanomia*.
- A. triadica Diener**, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 94, Pl. XII. fig. 15, 16. • Himalaya, Anisisch.
- A. sp. ind.** Vaughan, in Reynolds et V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 201, Pl. XVIII. fig. 1. England, Rhaetisch.

Gen. **Placunopsis** Morr. et Lyc.

Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVI/1/2, 1907, p. 174.

- P. alpina Winkler**, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 5, Taf. I. fig. 1 (Anomia). — v. *Guentzel*, Obere Abt. d. Keupers i. d. Alpen, Gotha, 1861, p. 48 (Anomia). — *Moore*, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861 p. 500, Pl. XVI. fig. 4, 5. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 156 (*Ostrea*) [Anomia sp. ind. Quenstedt], Der Jura, 1856, p. 30, Taf. I. fig. 16, A. *Schafhäutli Winkler*, l. c. p. 5, Taf. I. fig. 2, *Stoppanni*, Pal. Lomb. III. 1863, Couches à Av. contorta, p. 138, Pl. XXXII. fig. 6—9 inclus.]. — *Bittner*, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 106 (Anomia). — *Vinassa de Regny*, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 833. — *Merciai*, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 228, Tav. VII. fig. 14 (Anomia). — *Principi*, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Palaeont. XVI. 1910, p. 24, Taf. I. fig. 7 (Anomia). — *Goetel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 162, Taf. IX. fig. 2 [Anomia Talegii Stoppanni, l. c. p. 139, Pl. XXXII. fig. 16,

A. Heberti *Stoppani*, l. c. p. 210, Pl. XXXVI. fig. 15, 16,
 A. Picteti *Stoppani*, l. c. p. 210, Pl. XXXVI. fig. 9, 10,
 A. Revonii *Stoppani*, l. c. p. 209, Pl. XXXVI. fig. 11—13,
 A. irregularis *Martin* (non Terquem), Pal. strat. de l'Infralias de la Côte d'Or, Mém. Soc. géol. France, sér. 2, T. VII. 1863, p. 61, A. Schafhäutli *Dumortier*, Bassin du Rhône, I. Infralias 1864, p. 84 Pl. XIII. fig. 12—14, *Placunopsis Schafhäutli Ooster*, Rhaet. Sutte v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 85, Taf. IV. fig. 23, Pl. Mortilleti *Ooster* (non *Stoppani*), l. c. p. 85, Taf. IV. fig. 23, Pl. Talegii *Ooster*. l. c. p. 86 inclusus].

England, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Apennin, Nordalpen, Südalpen, Karpathen, Bakony, Rhaetisch.

P. cf. alpina (Winkl.) *Krumbeck*, Obere Trias v. Buru etc. Palaeon topograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 46, Taf. I. fig. 21. — *Jaworski*, *Nuculamergel v. Misol*, Pal. v. Timor, II/5, 1915, p. 104, Taf. XLV. fig. 3 (Pl. cf. Schafhäutli).

Indonesien, Norisch.

P. sp. ind. aff. alpinae (Winkl.) *Merciai*, Foss. di Mte. Malbe, Atti, Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 230, Tav. VII. fig. 16 (Anomia).

Apennin, Rhaetisch.

P. alta *Giebel*, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 14, Taf. VI. fig. 2 (Anomia).

Deutschland, Muschelkalk.

P. beryx *Giebel*, Verst. im Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 14, Taf. VI. fig. 5 (Anomia). — v. *Schauroth*, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 93, Taf. VI. fig. 8 (*Ostrea subanomia* var. *beryx*). — v. *Seebach*, Conchyliesenf. d. Weimar. Trias, ibidem, XIII. 1861, p. 570, Taf. I (XIV), fig. 5 (Anomia). — v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 68 (Anomia?).

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

P. denticostata *Tommasi* (1890), v. *Woehrmann* (1893) vide *Terquemia denticostata*.

P. Favrii *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 139, Pl. XXXII. fig. 14, 15 (Anomia). — *Cappellini*, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 75, Tav. VI. fig. 14 (Anomia). — *Simoneilli*, Foss. retici di Cetona, ibidem, ser. 5, T. II. 1891, p. 635. — *Vinassa de Regny*, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 833 (Anomia). — *Schmidt*, Exotische Klippen, Mitt. Geol. Wien, II. 1909, p. 204.

Frankreich, Westschweiz, Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

P. cf. fissistriata (Winkl.) *De Lorenzo* (1896) vide *Plicatula cf. Archiaci*.

P. sp. ind. aff. fissistriatae (Winkl.) *Krumbeck* (1913) vide *Plicatula* sp. ind. aff. *Archiaci*.

P. gracilis *Giebel*, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 13, Taf. VI. fig. 2. — v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 70 [*Ostrea subanomia* var. *orbica* v. *Schauroth*, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 91, Taf. VI. fig. 2 inclusus]. — v. *Linstow*, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 138, Taf. XII. fig. 4, 5.

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

P. Korzniani *Goetel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 167, Taf. IX. fig. 3.

Karpathen, Rhaetisch.

P. Mortilleti *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 139, Pl. XXXII. fig. 10—13 (Anomia). — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 156 (Anomia). — *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 251 (Anomia). — *Cappellini*, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866,

- p. 485, Pl. VI, fig. 13 (Anomia). — Principi, Studio geol. Mite. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 192, Tav. VII. fig. 5 (Anomia). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 166 [P. Revonii Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. v. Bern, 1869, p. 85, Taf. IV. fig. 24 inclus., P. Mortilleti Ooster, l. c. p. 85, Taf. IV. fig. 23 (= P. alpina Winckl.) exclus.].
- Schweiz, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch.
- P. cf. Mortilleti (Stopp.) Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 834.
- Apennin, Rhaetisch.
- P. cf. Mortilleti (Stopp.) Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 50, Pl. VIII. fig. 4—6. — Krumbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 243, Taf. XVI. fig. 8.
- Burnta, Rhaetisch. — Sumatra, Norisch.
- P. sp. ind. aff. Mortilleti (Stopp.) Krumbeck, Ob. Trias v. Buru, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, 1918, p. 47, Taf. I. fig. 22.
- Indonesien, Norisch.
- P. Napengensis Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 50, Pl. VIII. fig. 7 (Anomia).
- Burnta, Rhaetisch.
- P. cf. Napengensis (Heal.) Krumbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/3, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 242, Taf. XVI. fig. 7.
- Sumatra, Norisch.
- P. obliqua Giebel, Lieskau, 1856, p. 13, Taf. VI. fig. 13. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 70.
- Deutschland, Muschelkalk.
- P. estracina v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 215 (Chamites). — v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkde. 1822, II. p. 111, Taf. XXXVI. fig. 1 (Ostrea sessilis). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 568 (Ostrea) [Lima concinna Duncker, Über d. im Muschelk. Oberschles. ges. Moll. Palaeontograph. I. 1851, p. 392, Taf. XXXIV. fig. 30 inclus.]. — Benecke, Üb. ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 33, 42, Taf. II. fig. 18, III. fig. 7, 8. — Nöting, Entwickl. d. Trias i. Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 322. — Phillipi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 150, Taf. VII. fig. 10. — Phillipi, Üb. ein interessantes Vorkommen v. Pl. ostracina, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 67 (Verh.). — v. Linstow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 136, 149. Taf. XII. fig. 1—3, 10—13. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, Taf. IV. fig. 20. — Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 57. — Gruppe, Der Unterkeuper im nördl. Hannover, A. v. Koenen-Festschr. 1907, p. 108. — Zeller, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle etc. in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 65, Taf. I. fig. 6 (var. orbica), 7—9. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. 1915, XXXVI/I, Heft 3, p. 596, Taf. XXXI. fig. 5—8 [Anomia alta Ahlburg, l. c. p. 57 inclus.].
- Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle — Südalpen, Anisisch.
- P. (?) parasita Bittner (1895) vide Dimyopsis parasita.
- P. Pasini Tornquist, Recouru u. Schio, II. Zeitschr. D. G. C. L. 1898, p. 670, Taf. XXI. fig. 7, XXIII. fig. 8.
- Südalpen, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. pellucidae (Terquem) Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 168.
- Karpathen, Rhaetisch.

- P. placunoides** Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 19, Taf. LXXIX, fig. 2 (Ostrea). — Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 12 (Ostrea). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. X, fig. 1—4 (Terequemia). Deutschland, Muschelkalk.
- P. plana** Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 13, Taf. II, fig. 6. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 572. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 69. Deutschland, Muschelkalk.
- P. Revonii** Ooster (1869) vide P. Mortilleti.
- P. (an Plicatula?) Rothpletzii** v. Woehrmann, Fauna d. Carditenschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 202, Taf. VI, fig. 9. Nordalpen, Karnisch.
- P. cf. Schafhäutli** (Winkl.) Krumbeck (1913) vide P. cf. alpina.
- P. subanomia** Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 19, Taf. LXXIX, fig. 2 (Ostrea). — v. Schauroth, Schaltiere d. Lettenkohlenformi. etc. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 90, Taf. VI, fig. 5 (Ostrea). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 66 (Ostrea) [var. Schuebleri Goldfuss, l. c. p. 19, Taf. LXXIX, fig. 3, v. Schauroth, l. c. Taf. VI, fig. 4, v. Schauroth, Krit. Verz. d. Triasverst. im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXV. 1859, p. 306, Taf. II, fig. 5, var. reniformis Goldfuss, l. c. p. 20, Taf. LXXIX, fig. 4, v. Schauroth, Lettenkohlenformi, l. c. Taf. VI, fig. 3, v. Seebach, l. c. Taf. I, fig. 4, var. tenuis Dunker. Über d. im Muschelk. Oberschlesiens ges. Moll. Palaeontograph. I. 1851, Taf. XXXIV, fig. 27—29 (Anomia), v. Schauroth, l. c. Taf. VI, fig. 1, var. Andraei Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 14, Taf. II, fig. 14 (Anomia, syn. var. turpis v. Schauroth, l. c. p. 93, Taf. VI, fig. 7), var. rugifera v. Schauroth, l. c. p. 92, Taf. VI, fig. 6, inclus.]. Deutschland, Muschelkalk, Keuper. — Südalpen, Anisisch.
- P. Talegii** Ooster (1869) vide P. alpina.
- P. tenuistriata** Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI. Heft 3, p. 596, Taf. XXI, fig. 9. Deutschland, Muschelkalk.
- P. teruelensis** Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 107, Taf. VI, fig. 13. Aragonien (Hispania), Muschelkalk.
- P. sp. ind.** Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 16, Tav. I, fig. 7 [= ? Plicatula Archiaci Stopp. (Anomia fissistriata Winkl.), teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 651]. Nordalpen, Südalpen, Karnisch.
- P. (?) sp. ind.** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 217, Taf. XXIII, fig. 16. Südalpen, Karnisch.
- P. sp. ind.** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 70, Taf. VI, fig. 19. Bakony, Karnisch.
- P. sp. ind.** Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 168. Khrpathen, Rhaetisch.

Fam. Myalinidae Frech.

Gen. **Myalina** de Koninck.

- M. Blezingeri** Philipp, Neue Zweischaler von palaeozoischem Habitus etc. Zeitsch. D. G. G. LI. 1899, p. 63, Textfig. 1, 2. Süddeutschland, Muschelkalk.

- M. eduliformis* Philippi (1903), Frech (1904) vide *Mytilus eduliformis*.
- M. Schamarae* Bittner, Verst. d. Süd-Ussurigeb. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 19, Taf. IV. fig. 20—25. Ussuribucht, Skythisch.
- M. (?) Tommasii* Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 157, Taf. V. fig. 21—24 [? *Mytilus cf. vomer* (Stoppani) Polifka, Fauna d. Schleradol. Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 602, Taf. VIII. fig. 9 inclus.]. Südalpen, Ladinisch.
- M. Tommasii* var. *obtusa* Salomon, l. c. p. 157, Taf. V. fig. 25. — Wilekens, Untersuchg. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 148, Taf. V. fig. 26. Südalpen, Ladinisch.
- M. (?) sp. ind. aff. Tommasii* (Sal.) Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 199, Taf. XXIV. fig. 28. Südalpen, Karnisch.
- M. vetusta* Benecke (1868), Bittner (1889), v. Wittenburg (1908) vide *Mytilus eduliformis* var. *praecursor*, Bittner (1901) vide *Mytilus eduliformis* var. *minor*.

Gen. **Aviculomyalina** Assmann.

Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 608.
Typ. *A. lata* Assmann (1915.)

A. lata Assmann, l. c. p. 608, Taf. XXIII. fig. 4, 5 [cf. *Perna vetusta* v. Eck, Formi. d. bunten Sandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 99 inclus.]. Norddeutschland, Muschelkalk.

Gen. **Joannina** L. Waagen.

Lant. d. Frombachtuffe, Verh. G. R. A. 1906, p. 390. — Waagen, Lant. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 94.
Typ. *J. Joannae* Waagen (1907).

J. Joannae Waagen, l. c. 1907, p. 94, Taf. XXXIV. fig. 12—14. Südalpen, Karnisch.

Gen. **Mysidia** Bittner.

Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 113.
Typ. *M. orientalis* Bittner (1891).

M. aequilateralis Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1860, p. 52, Pl. V. fig. 17, 18 (Corbis). — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 28, Textfig. 39.

Südalpen, Nordalpen, Rhaetisch.

M. lithophagooides Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias. Pal. Bal. I/1, 1904, p. 27, Textfig. 37.

Bakony, Karnisch.

M. orientalis Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XII. 1891, p. 113, Taf. II. fig. 10. — Bittner, Neue Arten aus d. Trias v. Balia, ibidem, XLII. 1892, p. 85, Taf. V. fig. 4, 5. — Renz, Neue Vorkommen von Trias in Griechenland etc. Zentralbl. f. Min. 1904, p. 263. — Renz, Stratigr. Unters. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 564. Anatolien, Norisch. — Corfu, Karnisch.

M. Taramellii De Toni, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 182, Tav. XV. fig. 6.

Südalpen, Ladinisch.

Gen. **Mytiloconcha** Tommasi.

Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 35.

Typ. *M. orobica* Tommasi (1911).**M. orobica** Tommasi, l. c. p. 35, Tav. III. fig. 21—23.

Südalpen, Karnisch.

Gen. **Pergamidia** Bittner.

Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 103.

Typ. *P. Eumenea* Bittner (1891).**P. Attalea** Bittner, l. c. p. 112, Taf. III. fig. 4. — Bittner, Neue Arten aus d. Trias v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1892, p. 85, Taf. V. fig. 6. Anatolien, Norisch.**P. Eumenea** Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 103, Taf. III. fig. 1—3. — Bittner, Neue Arten aus d. Trias v. Balia, ibidem, XLII. 1892, p. 88. Anatolien, Norisch.Fam. **Mytilidae** Fleming.Gen. **Mytilus** L.(Subgen. **Septifer** Recluz inclus.).**M. acutearinatus** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 20, Taf. VII. fig. 15—19.

Bakony, Karnisch.

M. (an Modiola?) alpinus v. Guembel, Geogn. Beschr. d. bayer. Alpengeb. 1861, p. 275. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditenschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 210, Taf. VIII. fig. 7. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2. T. VIII. 1890, p. 27, Tav. II. fig. 6. — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleont. VIII. 1902, p. 86. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 200.

Nordalpen, Südalpen, Karnisch

M. (an Myoconcha?) altecarinatus Wilekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturh. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 153, Taf. VI. fig. 4. Südalpen. Ladinisch.**M. anonymous** Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 56, Tav. III. fig. 16.

Südalpen, Skythisch.

M. (?) aretus Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 66, Pl. X. fig. 10, 11.

Südalpen; Rhaetisch.

M. arenarius Zenker, Beitr. z. Naturgesch. d. Urwelt, 1833, p. 57, Taf. VI. fig. B 1, 2, = sp. inval., teste Benecke, Üb. Myt. eduliformis, Zentralbl. f. Min. 1905, p. 706.**M. Beaumonti** Verneuil, in Murchison, Verneuil et Keyserling, Géol. de la Russie d'Europe, II. Paléontol. 1845, p. 315, Pl. XXII. fig. 2.

Bogdo (Astrachan), Skythisch.

M. Cainalli Stoppa (1859) vide Modiola esinensis.**M. compressifusculus** Stoppa, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 89, Pl. XVIII. fig. 7. Südalpen, Ladinisch.**M. Cornalbae** Stoppa (1865), Bassant (1893) vide Myoconcha Cornalbae.**M. (an Myalina?) Dalailamae** (Verneuil) Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 45, Taf. III. fig. 1—11. — Bittner, Verst. d. Süd-Ussurigebl. Mém. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 19.

Bogdo (Astrachan), Skythisch.

M. divaricatus Schafhäutl (1851) vide Modiola Schafhäutli.
M. eduliformis v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 299
 (Mytulites). — v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkde.
 II. 1823, Taf. XXXVII. fig. 4. — Quenstedt, Handb. d.
 Petrefaktenkde. 1852, Taf. XLIII. fig. 3. — Brönn, Leth.
 googn. III/3, 1856, p. 66, Taf. XI. fig. 4. — Giebel, Verst.
 im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 37, Taf. IV. fig. 2 [M. vetustus
 Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 169, Taf. CXXVIII.
 fig. 7, v. Ziehen, Verst. Württembergs, Taf. LIX. fig. 2,
M. inflexus Römer, Neue Verst. aus d. Muschelk. Palaeontograph.
 I. 1849, p. 312, Taf. XXXVI. fig. 12, 13 inclus.]. —
 Bornemann, Verst. int span. Muschelk., Zeitschr. D. G. G.
 VIII. 1856, p. 165. — v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst.
 d. Trias im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV, 1858,
 p. 320. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeit-
 schr. D. G. G. XIII. 1861, p. 596. — v. Alberti, Überbl. üb.
 d. Trias, 1864, p. 95. — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 46,
 Taf. III. fig. 10—12 (M. vetustus Gd f. et M. inflexus Röm.). —
 Tommasi, Trias inf. d. nostre Alpi, 1882, p. 63, Tav. I. fig. 8.
 — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 158
 [M. vomer Stoppiani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859,
 p. 89, Pl. XVIII. fig. 2—6 inclus.]. — Tommasi, Fauna
 Trias inf. vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 55, Tav. III.
 fig. 15. — Renz, in French, Neue Zweischaler etc. aus d.
 Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, Textfig. 20. — Benecke,
 Üb. M. eduliformis, Zentralbl. f. Min. 1905, p. 705, Textfig. 4, 5. —
 Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906,
 p. 27, Taf. VI. fig. 29. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in
 Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 68. —
 v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Oest. XXVII.
 1915, p. 192.

Deutschland, Muschelkalk bis Grenzdolomit. — Spanien,
 Muschelkalk. — Südalpen, Skythisch bis Ladinisch. —
 Bogdo (Astrachan), Skythisch. — Anatolien, Ladinisch?

M. eduliformis (Schloth.) var. **minor** Bittner, Lam. aus d.
 Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 87, Taf. IX.
 fig. 25—27 (Myalina cf. vetusta). — Benecke, Üb. M. eduli-
 formis, Zentralbl. f. Min. 1905, p. 705.

Bakony, Skythisch.

M. eduliformis (Schloth.) par. **praeursor** Renz, in French,
 Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904,
 p. 20, Textfig. 23—25 (Myalina). — Benecke, Üb. M. eduli-
 formis, Zentralbl. f. Min. 1905, p. 705, Textfig. 1—3 [Myalina
 vetusta Benecke, Üb. ein. Muschelkalkablag. d. Alpen,
 Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 22, Taf. I. fig. 17, M. eduliformis
 Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 37, Taf. IV.
 fig. 2, Myalina eduliformis Philippi, Kont. Trias, Leth.
 mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 5 inclus.]. — Langenhahn, Verst.
 d. deutsch. Trias, Taf. VIII. fig. 34, IX. fig. 13. — Hohen-
 stein, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelk. am östl. Schwarzwald-
 rand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII. 1913, p. 54 (226), Taf. I
 (XII), fig. 15. 33. — Assmann Brach. u. Lam. d. oberschles.
 Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 607,
 Taf. XXX. fig. 3 [M. vetustus v. Eek, Über d. Form. d. bunten
 Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 56, 99, M. eduliformis
 Ahlburg, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906,
 p. 24, 61 inclus.]. — Diener [Myalina vetusta Bittner.
 Verst. d. Süd-Ussurigeb. Mém. Com. géol. St. Petersbourg,
 VII/4, 1899, p. 17, Taf. IV. fig. 17—19, v. Wittenburg,
 Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Ab-
 handl. N. F. VIII/5, 1908, p. 33 (281) inclus.].

Südalpen, Bakony, Skythisch, Anisisch. — Deutschland,
 Röth, Unt. Muschelkalk. — Ussuribucht, Skythisch.

M. (an *Modiola?*) *Ervensis Stoppanni*, Stud. geol. e pal. sulla Lombardia, 1857, p. 390 [Typ. *M. glabratus Stoppanni* (non *Dunker*), Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 134, Pl. XXX. fig. 32, 33, teste v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 168, M. Escheri v. Gumbel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 406, *M. rugosus Stoppanni* (non *Römer*), l. c. p. 65, Pl. X. fig. 6, 7 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 240. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 73, Taf. II. fig. 32.

Westschweiz, Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.

M. Escheri v. Gumbel (1861) vide *M. Ervensis*.

M. esinensis Stoppanni (1859) vide *Modiola esinensis*.

M. gibbus Schafhäutl (1851) vide *Modiola minuta*.

M. glabratus Dunker, Über d. im Muschelk. Oberschlesiens ges. Moll. Palaeontograph. I. 1856, p. 422, Textfig. 17, 18.

Non *M. glabratus Stoppanni*, Pal. Lomb. III. 1863, p. 134, Pl. XXX. fig. 32, 33 = *M. Ervensis Stoppanni* (1857), teste v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 168, Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 176.

Deutschland, Muschelkalk.

M. hamuliferus Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 44, Taf. V. fig. 1.

Südalpen, Karnisch.

M. Homfrayi Gabb, Palaeontol. of California, I. 1864, p. 29, Pl. VI. fig. 25.

Nevada, ?.

M. incertus v. Schlotheim, Petrefaktenkde., 1850, p. 295, Nachtr. II. Taf. XXXVII. fig. 3 = sp. inval., teste v. See, baech, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 597.

M. inflexus Römer (1851) vide *M. eduliformis*.

M. latus v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 257, Taf. XVII. fig. 13 = Gen. ind. sp. ind., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 42.

M. liasinus (Terquem) Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 230, Tav. VII. fig. 18.

Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.

M. Maximiliani Leuchtenbergensis v. Klipstein (1843) vide Myoconcha Maximiliani Leuchtenbergensis.

M. minutus Goldfuß (1834), v. Dittmar (1864), Martin (1865), Renvier (1865), Ooster (1869), Lundgren (1878), Simonelli (1891), v. Arthaber (1906), vide *Modiola minuta*.

M. (?) mirabilis Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 202, Pl. XX. fig. 9.

Neuseeland, Karnisch.

M. Mülleri Giebel (1856) vide Myoconcha Müller.

M. Muensteri v. Klipstein (1843) vide *Modiola Muensteri*, Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 44, Taf. XVI. fig. 5a, c, d, e vide *Modiola (Septiola) pygmaea*, 5b, f, vide *Modiola (Septiola) subcarinata*, v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibl. Schichten v. Schlerm-plateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 176 vide *Modiola (Septiola) dreissensiformis*, teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 48.

M. (?) problematicus v. Zittel, Foss. Moll. etc., Palaeontologie v. Neuseeland, Wien, 1864, p. 28, Taf. VII. fig. 1. — Pioute, Trias de la Nouv. Calédonie, Bull. Soc. géol. France, sér. 4, T. VIII. 1908, p. 325. — Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 201, Pl. XX. fig. 8.

Neuseeland, Neu-Caledonien, Karnisch.

M. productus Stoppanni (1863) [non *Terquem*] vide *M. semi-circularis*.

- M. psilonoti** Quenstedt, Der Jura, 1858, p. 48, Taf. IV. fig. 15. — De-Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A., 1882, p. 100.
Non **M. psilonoti Stoppani** (1861) = **M. Stoppanii**.
Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- M. sp. ind. aff. psilonoti** (Quenstedt.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 73, Taf. II. fig. 29.
Schweiz, Rhaetisch.
- M. pupa Stoppani**, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 90, Pl. XVIII. fig. 9—11. — Benecke, Üb. Trias u. Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 158.
Südalpen, Ladinisch bis Hauptdolomit.
- M. pygmaeus** Münter (1841) vide Modiola (Septiola) pygmaea, Schafhäutl (1853) vide Modiola minuta.
- M. Quenstedti** Giebel (1856) vide Myoconcha Quenstedti.
- M. radians** Stoppani (1865), Bassani (1893) vide Myoconcha radians.
- M. rectus** Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 109. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 661 (Mytilus sp. ind.). — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 86, Tav. VIII. fig. 21.
Südalpen, Karnisch.
- M. rugosus** Stoppani (non Römer) 1861 vide M. Ervensis.
- M. rugulosus** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 44, Taf. IV. fig. 22, XXIV. fig. 1.
Südalpen, Karnisch.
- M. rusticus** (Terquem) Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 230, Tav. VII. fig. 17. — Principi, Studio geol. Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 194, Tav. VII. fig. 8 (Modiola) [M. subcarinata var. carinata Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 199, Taf. XXIV. f. 5—10 inclus.].
Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- M. scalaris** v. Klipstein (1843) vide Modiola scalaris.
- M. Schafhäutli** Stoppani (1861) vide Modiola Schafhäutli.
- M. semicircularis** Stoppani, Studi geol. e pal. sulla Lombardia, 1857, p. 390 [Typ. M. productus Stoppani (non Terquem), Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 134, Pl. XXXI. fig. 1, teste v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 168.].
Südalpen, Rhaetisch.
- M. similis** (Graf zu Münster) D'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 200, Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 43, Taf. XVI. fig. 4, Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 108 = Gen. ind. sp. ind., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 42, 48.
Südalpen, Rhaetisch.
- M. Stoppanii** Dumortier, Dépôts jur. bassin du Rhône, I. Infralias, 1864, p. 42, Pl. V. fig. 1—4 [M. psilonoti Stoppani (non Quenstedt), Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 64, Pl. X. fig. 1—5 inclus.]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 74, Taf. II. fig. 30. — De-Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 99.
Südalpen, Schweiz, Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- M. subdimidiatus** Sandberger, Übersicht d. Verst. d. Triasform. Unterfrankens, Verh. Phys. Med. Ges. Würzburg, N. F. XXIII. 1890, p. 42 (Modiola). — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 68, Taf. I. fig. 1. [Modiola sp. ind. Tegtmeyer, Beitr. z. Kenntn. d. Keupers im nördl. Thüringen, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. N. F. 1876, XIII, p. 457, Taf. VI. fig. 4 inclus.].
Deutschland, Keuper.
- M. subygmaeus** d'Orbigny, Prodrome I. 1849, p. 200, Laubé (1865) vide Modiola (Septiola) pygmaea.

M. vetustus v. Ziethen (1833), Goldfuss (1838) vide *M. eduliformis*.

M. vomer Stoppaani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 89, Pl. XVIII. fig. 2—6 syn. c. *M. eduliformis* Schloth. (*M. vetustus* Gdf.), teste Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 158.

M. cf. vomer (Stoppa) Polifka (1886) vide Myalina Tommasii.

M. sp. ind. v. Hauer, Über d. v. Bergr. Fuchs i. d. Vent. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 4, Taf. I. fig. 10 = Gen. ind. sp. ind.

M. sp. ind. Stoppaani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 134, Pl. XXX. fig. 34. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtat. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 179.

Südalpen, Karpathen, Rhaetisch.

M. sp. ind. Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturh. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 153, Taf. VI. fig. 3.

Südalpen, Ladinisch.

Subgen. **Septifer** Recluz.

S. praeacutiformis Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturh. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 151, Taf. VI. fig. 1, 2.

Südalpen, Ladinisch.

S. praeacutus v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 258, Taf. XVII. fig. 15. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 43, Taf. V. fig. 12—14. — Simionescu, Fauna trias. ins. Popina, Acad. Rom. IV. Bouarest, 1910, p. 515, Txetfig. 26, 27. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 199, Taf. XXIV. fig. 3, 4.

Südalpen, Dobrudscha, Karnisch.

S. cf. praeacutus (Klipst.) Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturh. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 153, Taf. VI. fig. 5.

Südalpen, Ladinisch.

Gen. **Lithodomus** Cuvier (Lithophagus Mühlf.).

L. (Botula?) cassiana Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 49, Taf. V. fig. 17, 18.

Südalpen, Karnisch.

L. faba Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 19, Taf. II. fig. 6 (Myacites). — Stoppaani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1860, p. 67, Pl. X. fig. 12—14. — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 473, Taf. VI. fig. 10 (Myacites). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 169. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 240. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 104. Frankreich, Nordalpen, Südalpen, Bakony, Rhaetisch.

L. prisca Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 38, Taf. IV. fig. 10. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 601. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 98. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 15, 16.

Deutschland, Muschelkalk.

L. rhomboidalis v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 601, Taf. I. fig. 8. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 98. — v. Eck, Form. d. bunten Sandst. etc. i. Oberschlesien, 1885, p. 56.

Non *L. rhomboidalis* Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A.N. F. Heft 50, 1906, p. 62, teste Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 615.

Deutschland, Muschelkalk.

- L. *sulcata* Blanckenhorn, Die Trias am Nordrand d. Eifel, Abhandl. Geol. Spezialk. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 102, Taf. III, fig. 5. Norddeutschland, Muschelkalk.
- L. (?) *triadica* Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 21, Taf. VIII. fig. 7—10. Bakony, Karnisch.

Gen. **Modiola** Lam.

(Subgen. **Septiola** Bittner inclus.).

- M. *Albertiana* Philipp, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 208, Taf. IX, fig. 8. [Nom. nov. pr. M. *similis* v. Alberti (non Münster), Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 96.] Württemberg, Lettenkohle.
- M(?) *Boehmi* Skuphos, Entwicklg. u. Verbr. d. Partnachsichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 175, Taf. V. fig. 24. Nordalpen, Anisisch.
- M. *cannstattiensis* Philipp, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 209, Taf. VI. fig. 9 [Nom. nov. pr. M. *dimidiata* v. Alberti (non Münster), Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 96.] Württemberg, Lettenkohle.
- M. Credneri* (Dunker), in Credner, Zeitschr. D. G. G. III. 1851, p. 365, Berger (1859) vide M. *hirundiniformis*.
- M. *cristata* v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 599, Taf. I. fig. 7. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 97. — v. Eck, Form. d. bunten Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 99. — Assmann, Brach. u. Lant. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 614, Taf. XXXIII. fig. 21. Deutschland, Muschelkalk.
- M. *dimidiata* Graf zu Münster, Beitr. z. Geol. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 81, Taf. VII. fig. 28. — Laubere, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 45, Taf. XVI. fig. 6. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1908, p. 29. [= ? M. *gracilis* v. Klipstein, (1843), teste v. Woermann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 661, Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 49. Südalpen, Karnisch.
- M. dimidiata* v. Alberti (non Münster), Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 96 vide M. *cannstattiensis*.
- M. (?) *dubia* Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 55, Pl. VIII. fig. 1. Burma, Rhaetisch.
- M. sp. ind. aff. *dubiae* (Healey) Jaworski, Nuculanergel v. Misol, Pal. v. Timor, II/5, 1915, p. 105, Taf. XLV. fig. 4. Indonesien, Norisch.
- M. *eduliformis* v. Schaueroth (non Mytilus *eduliformis* Schlotheim), Krit. Verz. d. Verst. d. Trias int. Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 314, Taf. II. fig. 5. [cf. v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 597]. Südalpen, Anisisch?
- M. *esinensis* Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 90, Pl. XVIII. fig. 12, 13 (Mytilus). — Mariani, Contr. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 253 (Mytilus Cainallii Stoppani, l. c. p. 89, Pl. XVIII. fig. 8 inclus.). Südalpen, Ladinisch.
- M. *Frugi* Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 54, Pl. VIII. fig. 10. Burma, Rhaetisch.

M. gastrochaena

Duncker (1851), Taf. XXXV. fig. 12 vide Myoconcha Goldfussi, fig. 13 vide Myoconcha gastrochaena.

M. gibba v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 95, Taf. I. fig. 9.

Süddeutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

M. Goldfussi Duncker (1851) vide Myoconcha Goldfussi.

M. gracilior Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 363, Taf. V. fig. 8.

Südalpen, Rhaetisch.

M. gracilis v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 258, Taf. XVII. fig. 2. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 45, Taf. XVI. fig. 7. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 110, Tav. IX. fig. 3. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 28. — v. Woermann et Koken, Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 177. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 47, Taf. V. fig. 9—11. — Fiedler, Verst. aus d. Arlbergschichten bei Bludenz, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 10 (Briefl. Mitt.). — Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 232, Tav. VII. fig. 20.

Südalpen, Nordalpen, Karnisch. — Apennin, Rhaetisch.

M. (?) gregaria Stoppani, Pal. Lonub. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 70, Pl. XI. fig. 6—10 (Avicula). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 164 (Avicula). — De Stefanii, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 99 (Avicula). — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 17. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 838. — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. di Paleontol. Ital. XVI. 1910, p. 26, Tav. V. fig. 25, 26.

Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

M. hirundiniformis v. Schaueroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 511, Taf. II. fig. 2. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 598 [Gerv. Albertii v. Schaueroth, l. c. p. 509, Taf. II. fig. 1 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 97 [M. Credneri (Dunk.), in Credner, Zeitschr. D. G. G. III. 1851, p. 365, Berger, Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 169, Taf. III. fig. 6—8 inclus.]. — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 101, Tav. I. fig. 15. Deutschland, Röth, Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

M. (?) humilis Tommasi, Revis. fauna d. dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 101, Tav. XVI. fig. 19, 20.

Südalpen, Hauptdolomit.

M. Hybbeusis Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 175, Taf. IX. fig. 5.

Karpathen, Rhaetisch.

M. imbricata Schafhäutl (non Sowerby) [1893] vide Anodontophora recta.

M. Klipsteini Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 47, Taf. IV. fig. 21.

Südalpen, Karnisch.

M. longaticensis Bittner, Lam. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 230, Taf. VI. fig. 5.

Südalpen, Ladinisch.

M. Mathildis Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 614, Taf. XXIII. fig. 22, 23.

Norddeutschland, Muschelkalk.

M. minima (Sow.) Vaughan, in Reynolds et Vaughan, The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 204.

Nec Moore (1861), nec Pflücker (1868), vide *M. minutula*. England, Rhaetisch, sonst Lias.

- M. minuta** Goldfuss, Petref. Germ. I. 1834, Taf. CXXX. fig. 6 (Mytilus). — v. Alborti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 96. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 167 (Mytilus) [Mytilus gibbosus Schafhäutl (non Gdf.)], Neue Petref. d. südbayer. Vorgeb. Neues Jahrb. f. Min. 1851, p. 419, Mytilus pygmæus Schafhäutl (non Mstr.), Beitr. z. näh. Kenntn. d. bayer. Voralpen, ibidem, 1853, p. 318, Mytilus sinemuriensis Martin, Paléontol. stratigr. Mém. Soc. géol. France, ser. 2, T. VII. 1859, p. 88, Pl. VI. fig. 19, 20, M. minima Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. XVII. 1861, p. 505, Pl. XV. fig. 26 inclusus]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 239 (Mytilus). — Renevier, Not. géol. et pal. sur les Alpes Vaud. II Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 66 (Mytilus). — Pflücker y Rico, Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 411. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thuu, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 73, Taf. II. fig. 31 (Mytilus). — Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 363, Taf. V. fig. 7. — Lundgren, Studier öfver faunan i. d. stenkolsför. form. i. Skane, Fisiogr. Sällsk. Minneskr. Lund, 1878, p. 44, Taf. I. fig. 9, 10 (Mytilus). — Lundgren, Molluskfaunan i Sveriges äldre mes. bildn. Lunds Univers. Arsskr. XVII. 1881, p. 37. — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 236 (Mytilus). — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. IV. fig. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, ibidem, I/3, 1906, Taf. XLIX. fig. 8 (Mytilus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 4. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A., Nov. Dec. 1916, p. 174 [M. minima Pflücker (non Sow.), l. c. p. 412, Taf. VII. fig. 4 inclusus].
- England, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Apennin, Südschweden, Karpathen, Rhaetisch,
auch Lias.
- M. sp. ind. aff. minutae** (Gdf.) Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 107, Taf. VIII. fig. 35. Bakony, Rhaetisch.
- M. sp. ind. ex aff. minutae** (Gdf.) Newton, On marine triass. Lamellibr. Malay Pennins. Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 133, Pl. XII. fig. 17. (Mytilus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunæ of Spiti, 1908, p. 139, Pl. XXIV. fig. 6 (Mytilus); Malacea, Himalaya, Obertrias.
- M. Montis Malbae Merciai**, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 335, Tav. VII. fig. 26. Apennin, Rhaetisch.
- M. myoconchaeformis** Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. Vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 159. Taf. V. fig. 2.
- Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- M. Muensteri** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 257, Taf. VII. fig. 12. (Mytilus). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 45, 46. Südalpen, Karnisch.
- M. cf. Muensteri** (Klipst.) Bassani, Foss. dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 10, Tav. I. fig. 15 (Mytilus).
- Apennin (Salerno), Rhaetisch.
- M. obtusa** Eichwald, Naturhist. Bem. etc. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, IX. 1851, p. 199, Taf. I. fig. 8. — v. Woehrmann et Kokon, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau; Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 176.
- Südalpen, Karnisch.
- M. Paronai** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1. 1895, p. 48, Taf. V. fig. 19, 20.
- Südalpen, Karnisch.

M. Perusiae Merciai, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 234, Tav. VII. fig. 23.

Apennin, Rhaetisch.

M. plana v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 258, Taf. XVII. fig. 3 = M. sp. ind., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 42.

M. Raibiana Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 48, Taf. V. fig. 21, 22. — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleont., VIII. 1902, p. 87, Tav. IX. fig. 1.

Südalpen, Karnisch.

M. sp. ind. aff. Raibiana Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 21, Taf. VII. fig. 26, 27.

Bakony, Karnisch.

M. sp. ind. ex aff. Raibiana (Bittn.) Böhni, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 37, Textfig. 6.

Bäreninsel, Karnisch.

M. (?) sp. ind. aff rectae (Broili) Krumbeck (1913) vide Mycoconcha sp. ind. aff. rectae.

M. rhaetica Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 362, Taf. V. fig. 6.

Südalpen, Rhaetisch.

M. rustica (Terquem) Principi (1908) vide *Mytilus rusticus*

M. Salzstettensis Hohenstein, Mittl. Muschelk. etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 227 (55), Taf. I (XII), fig. 16—29, 31, 32 [var. convexa, plana, elongata, lata inclus.].

Süddeutschland, Muschelkalk.

M. scalaris v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 257, Taf. VII. fig. 14 (*Mytilus*). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 43, 45.

Südalpen, Karnisch.

M. Schafhäutli Stur, Jahrb. G. R. A. II. 1851, p. 22. — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 64, Pl. X. fig. 8, 9 (*Mytilus*) [Modiola texta Schafhæutl., Beitr. z. näh. Kenntn. d. Bayer. Voralpen, Neues Jahrb. f. Min. 1854, p. 285, Taf. VIII. fig. 21 inclus.]. — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, Taf. IX. fig. 6. — v. Dittmar, Contortazone, 1894, p. 169 (*Mytilus*) [*Mytilus varicatus* Schafhæutl., Geogn. Unters. d. südbayer. Alpengeb. 1851, p. 136, Taf. XXIV. fig. 34, Modiola undulata Schafhæutl., Beitr. z. näh. Kenntn. d. bayer. Voralpen, I. l. c. 1853, p. 319 inclus.]. — De Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 100. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov., Dec. 1916, p. 177 [*M. strigillata* v. Dittmar, l. c. 1864, p. 169, Taf. III. fig. 1 inclus.].

Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch.

M. similis Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols 1841, IV. p. 81, Taf. VII. fig. 27 = Gen. ind. sp. ind., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 42.

M. similis v. Alberti (non Münster) [1864] vide *M. Albertiana*.

M. sodburiensis Vaughan, in Reynolds et V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London LX. 1904, p. 203, Pl. XVIII. fig. 3.

England, Rhaetisch.

M. strigillata v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 169, Taf. III. fig. 1 (= ? *M. Schafhäutli Stur*, teste Goetel, l. c. p. 177).

Nordalpen, Rhaetisch.

M. subcarinata Bittner (non Lam.) [1895], Merciai (1908), Principi (1908, 1910) vide *M. Bittneri*.

- M. substriata** v. Schauroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 512, Taf. II. fig. 3 [= ? Mytilus Mülleri Giebel, Lieskau, 1856, p. 35, Taf. III. fig. 2, 4, VI. fig. 9]. — Benecke, Üb. ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen. Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 42, Taf. III. fig. 11. Südalpen, Anisisch.
- M. Taramellii** Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. p. 30, Tav. II. fig. 7. Südalpen, Karnisch.
- M. texta* Schafhäutl (1854) vide M. Schafhäutli.
- M. Thielai* v. Strombeck, Über eine neue Modiola etc. Zeitschr. D. G. G. II. 1850, p. 90, Taf. V. fig. 1, 2 = sp. non val., teste Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 161.
- M. triquetra** v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 599, Taf. XIV. fig. 6. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 97. — Benecke, Üb. ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 35, Taf. II. fig. 12, 13. — Schmid, Das ostthüring. Röth. Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1881, p. 141. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXV. fig. 2. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 12. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. 1906, p. 28, Taf. VI. fig. 30. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 614, Taf. XXXIII. fig. 18—20 [M. cf. cristata Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1900, p. 24 inclus.]. Deutschland, Röth, Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.
- M. triquetra** (Seeb.) var. *angusticaudata* Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 57, Tav. III. fig. 17. Südalpen, Skythisch.
- M. cf. triquetra** (Seeb.) Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkd. Würt. 1898, p. 158, Taf. V. fig. 1. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- M. Umbriae Merciai**, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 233, Tav. VII. fig. 25. Apennin, Rhaetisch.
- M. Verrii Merciai**, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 233, Tav. VII. fig. 22. Apennin, Rhaetisch.
- M. Vinassai Merciai**, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 234, Tav. VII. fig. 24. Apennin, Rhaetisch.
- M. (an Myalina?) Weissenbachensis** Toulou, Schichten m. Gerv. Boue vom Gaumannmüllerkoegel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 392, Taf. XII. fig. 7. Apennin, Rhaetisch.
- M. sp. ind. Benecke**, Über ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 61, Taf. IV. fig. 13. Nordalpen, Karnisch.
- M. sp. ind. Bittner**, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 114, Taf. II. fig. 11, 12. Nordalpen, Ladinisch.
- M. sp. ind. Healey**, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. now ser. II/4, 1908, p. 53, Pl. VIII. fig. 8, 9. Anatolien, Norisch.
- M. (?) sp. ind. I. Healey**, l. c. p. 55, Pl. VIII. fig. 12. Burma, Rhaetisch.
- M. (?) sp. ind. II. Healey**, l. c. p. 55, Pl. VIII. fig. 13. Burma, Rhaetisch.
- M. (?) sp. ind. III. Healey**, l. c. p. 56, Pl. VIII. fig. 14. Burma, Rhaetisch.
- M. (?) sp. ind. IV. Healey**, l. c. p. 56, Pl. VIII. fig. 15. Burma, Rhaetisch.

M. sp. ind. D i e n e r , Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 87, Pl. XII, fig. 3.

Himalaya, Anisisch.

M. sp. ind. H o h e n s t e i n , Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 228 (56), Taf. I (XII), fig. 30, 34, 35. Süddeutschland, Muschelkalk.

Subgen. **Septiola** Bittner.

Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 45. — W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe etc. ibidem, XVIII/2, 1907, p. 164.

Typ. *Mytilus pygmæus Münnster* (1843).

S. Bittneri V i n a s s a d e R e g n y , Revue crit. de Paléozool. I. 1897, p. 80 [Nom. nov. pr. *M. subcarinata* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 46, Taf. V, fig. 6. (Nom. nov. pr. *Mytilus Muensteri* v. L a u b e (non v. K l i p s t e i n), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 44, Taf. XVI. fig. 5b, f, caet. exclus.)]. — M e r c i a i , Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. XXIV. Pisa, 1908, p. 231, Tav. VII. fig. 19 (*M. subcarinata*). — P r i n c i p i , Studio geol. Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII 1908, p. 195, Tav. VII. fig. 9 (*M. subcarinata*). — P r i n c i p i , Foss. retici d'Amelia, Riv. di Paleont. XVI. 1910, p. 27, Tav. I. fig. 27 (*M. subcarinata*).

Südalpen, Karnisch. — Apennin, Rhaetisch.

S. dreissensiformis W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 85, Taf. XXXII, fig. 22 [Non. nov. pr. *M. subcarinata* Bittn. var. carinata B r o i l i , Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 199, Taf. XXIV. fig. 5—10, *Mytilus Muensteri* v. W o e h r m a n n et K o k e n (non v. K l i p s t e i n), Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 146 inclus.].

Südalpen, Karnisch.

S. nachamensis M a n s u y , Faunes de Na Cham, Méni. Serv. géol. Indochnine, VI/1, 1919. Tonkin, Karnisch.

S. pygmaea G r a f z u M ü n s t e r , Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 80, Taf. VII. fig. 26 (*Mytilus*). — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 45, Taf. V. fig. 2—5, 7 [*Mytilus subpygmæus d'Orbigny*, Prodrome, I. 1849, p. 200, L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 44, *M. Muensteri* L a u b e (non v. K l i p s t e i n), ibidem, p. 44, Taf. XVI. fig. 5a, c, d, e inclus.]. — G o r t a n i , Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 86, Tav. IX. fig. 2. — B r o i l i , Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 200, Taf. XXIV. fig. 11. — M e r c i a i , Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 232, Tav. VII. fig. 21. — P r i n c i p i , Studio geol. d. Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 196. — P a u l o c k e , Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 212.

Südalpen, Karnisch. — Apennin, Rhaetisch. — Schweiz.

Röthidolomit.

S. subcarinata B i t t n e r (1895), M e r c i a i (1908), P r i n c i p i (1908, 1910) vide S. Bittneri.

S. subcarinata var. *carinata* B r o i l i (1904) vide S. *dreissensiformis*.

Fam. Modiolopsidae Fischer.

Gen. **Modiolopsis** Hall.

M. gonoides H e a l e y , Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 51, Pl. VII. fig. 13—17 [*Pleurophorus elongatus* (?) (M o o r e) N e w t o n , Marine triass. Lam. Malay Penins.. Proceed. Malacol. Soc. London IV. 1900, p. 133, Pl. XII. fig. 8 inclus.].

Burma, Malacea, Rhaetisch.

Ordo: Homomyaria auct.

Subordo: Taxodonta Neumayr.

Fam. Nuculidae Gray.

Gen. **Nucula** Lam.

- N. acutula** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 141, Taf. XVII. fig. 23, 24. — Paulcke, Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 212.
Südalpen, Karnisch. — Schweiz, Röthidolomit.
- N. bocconis** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 130, Pl. XXX. fig. 8, 9. Südalpen, Rhaetisch.
- N. carantana** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 152, Taf. XVII. fig. 46—48.
Südalpen, Karnisch.
- N. cf. carantana** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 18, Taf. VIII. fig. 4. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 66.
Bakony, Karnisch.
- N. cordata** Münster (1841) vide **N. expansa**.
N. cuneata Goldfuss (non Philipps) [1838], Münster (1841), Frech (1904) vide **N. subcuneata**.
- N. dimidiata** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 141, Taf. XVII. fig. 34.
Südalpen, Karnisch.
- N. elongata** Öberg, Trias först. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 18, Taf. V, fig. 6.
Spitzbergen, Anisisch.
- N. elliptica** Goldfuss (1838), Münster (1841) vide Ctenodonta elliptica.
- N. (an Leda?) excavata** Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 153, Taf. CXXIV. fig. 14. — d'Orbigny, Prodrome I. 1849, p. 173 (Leda). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 101. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 57. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 13, Textfig. 11. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, Vol. XLVI. Milano, 1913, p. 777 (Leda).
Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle. — Bakony, Südalpen, Anisisch.
- N. (an Leda?) sp. ind. aff. excavatae** (Gdf.) Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 109, Tav. II. fig. 4 (Leda).
Südalpen, Anisisch.
- N. sp. ind. ex aff. excavatae** (Gdf.) et Titei (Moore) Loezy, Wiss. Ergebni. d. Reise d. Grf. B. Széchenyi i. Ostasien, III. 1899, p. 145, Taf. X. fig. 3, 4. Yunnan (Südchina), Karnisch.
- N. exilis** Dunker (1851) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) gregaria.
- N. expansa** Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 84. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 66, Taf. XIX. fig. 9 [**N. cordata** Münster (non Goldfuss), l. c. p. 84, Taf. VIII. fig. 12, **N. subcordata** d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 199 inclus.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1859, p. 140, Taf. XVII. fig. 25—33. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 18. — Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 716. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 31. — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleontol. XVI. 1910, p. 28, Tav. I, fig. 29, 30.
Südalpen, Bakony, Karnisch. — Dinariden, Anisisch. — Apennin, Rhaetisch.

N. faba Wissmann, in Münster (1841) vide *Palaeoneilo faba*.
N. Fritschii Böttger, Tertiärform, v. Sumatra, *Palaeontograph.* Suppl. III. 1880, p. 39, Taf. I. fig. 19, 20. — Krumbeck, Ob. Trias v. Sumatra, ibidem, Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 244, Taf. XVI. fig. 16, 17 [Sphenia tellina Böttger, l. c. p. 33, Taf. I. fig. 4 inclus.].

Sumatra, Norisch.

N. Goldfussii v. Alberti, in Goldfuss, *Petref. Germ.* II. 1838, p. 152, Taf. CXXIV. fig. 13. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 101 [*N. cuneata* Giebel (non Goldfuss) Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 45, Taf. VI. fig. 7 inclus.]. — v. Seebach, *Conchylienf.* d. Weimar. Trias, *Zeitschr.* D. G. G. LXIII. 1861, p. 56. — Philipp, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, *Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde.* Würt. 1898, p. 176, Taf. VII. fig. 7. — v. Linストow, Trias v. Lüneburg, *Jahrb. Preuß. Geol.* L. A. XXIV. 1903, p. 156, Taf. XII. fig. 17. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, *Pal. Bal.* I/1, 1904, p. 13, Textfig. 12. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 28, Taf. VI. fig. 32. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 20, 26. — Wurm, Trias v. Aragonien, *Zeitschr.* D. G. G. LXIII. 1911, p. 112, Taf. VI. fig. 19, 20. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, *Jahrb. Preuß. Geol.* L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 615, Taf. XXXIII. fig. 24, 25.

Deutschland, Röth bis Lettenkohle. — Bakony, Anisisch.

— Aragonien (Hispania), Muschelkalk.

N. Goldfussii (Alb.) var. *Boeckhi* Frech, Nachtr. zu *Cephal. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias*, *Pal. Bal.* I/1, 1905, p. 15, Textfig. 19.

Bakony, Karnisch.

N. sp. ind. aff Hammeri (Gdf.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 71, Taf. II. fig. 3, 4.

Schweiz, Rhaetisch.

N. incrassata (Münster), Goldfuss (1838) vide *Myophoriopsis Pseudocorbula* incrassata.

N. jugata v. Guembel, *Geogn. Beschr.* d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 406. — v. Dittmar, *Contortazone*, 1864, p. 170 [Deest imago].

Nordalpen, Rhaetisch.

N. lineata Goldfuss (1838), Münster (1841), Laube (1865), v. Arthaber (1906) vide *Palaeoneilo lineata*.

N. Mattani Stoppiani (1863) vide *Tellina* (?) bavarica.

N. misolensis Jaworski, *Nuculamergel* v. Misol, *Palaeontol.* v. Timor, II/5, 1915, p. 106, Taf. XLIV. fig. 7—13.

Indonesien, Norisch.

N. nuda Wissmann in Münster (1841), vide *N. subnuda*.

N. obliqua Graf zu Münster [non Blainville, 1825] (1841) vide *N. subobliqua*.

N. Oppelia Stoppiani, *Pal. Lomb.* III. *Couches à Av. contorta*, 1861, p. 61, Pl. VII. fig. 23, 24 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Dittmar, *Contortazone*, 1864, p. 170.

N. oviformis v. Eck, Rüdersdorf etc. *Abhandl. z. Geol. Spezialkto.* v. Preußen, I. 1872, p. 87, Taf. I. fig. 9. — Paulcke, *Helvet. Trias*, *Geol. Rundschau*, VI. 1915, p. 212.

Deutschland, Muschelkalk. — Schweiz, Röthidolomit.

N. Pealii Healey, *Fauna of the Napeng beds*, *Pal. Ind. new ser.* II/4, 1908, p. 10, Pl. I. fig. 13, 14.

Burma, Rhaetisch.

N. predazzensis Wilckens, *Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo*, *Verh. Naturh. Med. Ver. Heidelberg*, N. F. X. 1909, p. 154, Taf. VI. fig. 20.

Südalpen, Ladinisch.

N. Ristorii Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro, *Boll. Soc. geol. Ital.* XXIII. 1904, p. 348, Tav. XI. fig. 42, 43.

Dinariden, Ladinisch.

- N. rotunda** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 141, Taf. XVII. fig. 19. Südalpen, Karnisch.
- N. cf. rotunda** (Bittn.) Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleontol. XVI. 1910, p. 29, Tav. I. fig. 32. Apennin, Rhaetisch.
- N. Schlotheimiana** Picard, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, XI. 1858, p. 434, Taf. IX. fig. 8, 9. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 604. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 103. Deutschland, Muschelkalk.
- N. speciosa** Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 152, Taf. CXXIV. fig. 10. — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 173 (Leda). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 101 [N. speciosa v. Sehauroth, Geogn. Verh. v. Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 513 exclus.]. Süddeutschland, Lettenkohle.
- N. Stotteri** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 262, Taf. XVII. fig. 8 = sp. non val., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 135.
- N. strigillata** Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 153, Taf. CXXIV. fig. 18. — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 83, Taf. VIII. fig. 10. — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 199. — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 65, Taf. XIX. fig. 2. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 102. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 113, Taf. IX. fig. 8. — v. Woehrmann, Raibler Sichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 663. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 137, Taf. XVII. fig. 1—17 [N. subcuneata Laubé (non d'Orbigny, l. c. p. 66, Taf. XIX. fig. 4 inclus.)]. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/I, 1901, p. 18, Taf. VIII. fig. 3. — Broili, Fauna d. Pachyeardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 201, Taf. XXIV. fig. 12. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. 1/3, 1906, Taf. XXXIX. fig. 10. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/I, 1907, p. 66, Taf. IX. fig. 5. — Scalia, Il gruppo di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1909, p. 300, Taf. IX. fig. 21, 22. — v. Arthaber, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Österr. XXVII. 1915, p. 192. — Paulcke, Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 212. Südalpen, Bakony, Sizilien, Anatolien, Karnisch. — Schweiz, Röthidolomit.
- N. strigillata** (Gdf.) var. *inflata* Gortani, Nuovi foss. raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 88, Taf. IX. fig. 5. Südalpen, Karnisch.
- N. cf. strigillata** (Gdf.) Koken, Über trias. Verst. aus China, Neues Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 203, Taf. X. fig. 26, 27. — Mansuy, Foss. terr. més. Sam Nana, Mém. Serv. géol. Indochine, VII/1. Kwei-tchou (China), Indochina, Ladinisch?
- N. nov. sp. ind. ex aff. strigillatae** (Gdf.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 53, Taf. III. fig. 18. Indonesien, Norisch.
- N. subaequilatera** Schafhäutl, Der weiße Jura im Wetterstein etc. Neues Jahrb. f. Min. 1865, p. 797, Taf. VI, fig. 10. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 211, Taf. VIII. fig. 10—12 [N. triquetra Schafhäutl (non Goldfuss), l. c. p. 797, Taf. VI. fig. 9 inclus.]. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, ibidem, XVIII. 1893, p. 663. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 152, Taf. XVII. fig. 41—44. Nordalpen, Südalpen, Karnisch.

- N. subcordata* d'Orbigny (1849) vide *N. expansa*.
- N. subcuneata* d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 175, 199 [Nom. nov. pr. *N. cuneata* Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 153, Taf. CXXIV. fig. 15, Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 84, Taf. VIII. fig. 13.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 139, Taf. XVII. fig. 20, 21, 22. [*N. subcuneata* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wied. XXV. 1865, p. 66, Taf. XIX. fig. 4 (= *N. strigillata* Gdf. juv.) exclus.]. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 14 (*N. cuneata*).
- Südalpen, Bakony, Karnisch.
- N. cf. subcuneata* (d'Orb.) Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 106, Tav. II. fig. 2.
- Südalpen, Karnisch.
- N. subnuda* d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 199 [Nom. nov. pr. *N. nuda* Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 85, Taf. VIII. fig. 18]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 14, Taf. XVII. fig. 40.
- Südalpen, Karnisch.
- N. subobliqua* d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 199. [Nom. nov. pr. *N. obliqua* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 85, Taf. VII. fig. 18]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 139, Taf. XVII. fig. 35—39 [*N. subobliqua* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 65, Taf. XIX. fig. 3 (= *Palaeoneilo tenuilineata* Klipst.) exclus.]. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 201, Taf. XXIV. fig. 13, 14. — Principi, Stud. geol. Mte. Malbe, Boll. Soc. geol. Ital. XXVII. 1908, p. 197, Tav. VII. fig. 4. — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleontol. XVI. 1910, p. 29, Tav. I. fig. 31.
- Südalpen, Karnisch. — Apennin, Rhaetisch.
- N. cf. subobliqua* (d'Orb.) Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teor. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 35.
- Südalpen, Karnisch.
- N. subovalis* Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 154, Taf. CXXV. fig. 4. — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 61, Pl. VII. fig. 21, 22. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 171. — Cappellini, Foss. infralias, golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 61, Tav. IV. fig. 18, 19.
- Non *N. subovalis* Münster (1841) [vide Leda Zelima].
- Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
- N. cf. subovalis* (Gdf.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 71, Taf. II. fig. 13. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 838.
- Schweiz, Apennin, Rhaetisch.
- N. subtrigona* Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 84, Taf. VIII. fig. 14 (male!). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 67, Taf. XVIII. fig. 13 (male!). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 138, Taf. XVII. fig. 18.
- Südalpen, Karnisch.
- N. sulcellata* Wissmann (1841), v. Hauer (1857) vide Leda sulcellata, v. Klipstein (1843) vide Phaenodesmia Klipsteiniana, v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 103 (Lettenkohle) vide Pseudocorbula Sandbergeri, teste Philipp. Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkd. Würt. 1898, p. 208.
- N. cf. sulcellata* (Wissm.) Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 114, Tav. IX. fig. 7 = *N. sp. ind.*, teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 663.

- N. telleri* v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXI. 1889, p. 211, Taf. VIII. fig. 13, 14. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 152, Taf. XVII. fig. 45. Nordalpen, Karnisch.
N. tenuilineata v. Klipstein (1843) vide Palaeoneilo tenuilineata.
N. tenuis v. Klipstein (1843) vide Palaeoneilo elliptica.
N. teutlebensis Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 22, 23. Norddeutschland, Ob. Muschelkalk.
N. triangularis Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 41, Taf. IV. fig. 27. Bäreninsel, Karnisch.
N. trigonella Stoppanni, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 88, Pl. XVIII. fig. 1. Südalpen, Ladinisch.
N. triquetra Schafhäutl (non Goldfuss) [1865] vide N. subaequilatera.
N. undata v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 262, Taf. XVII. fig. 16, 21 = sp. incert., teste Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 64 (? = Palaeoneilo lineata G d f.).
N. sp. ind. Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 10, Pl. XXX. fig. 12—15, p. 131, Pl. XXX. fig. 19 vide Leda clavellata.
N. sp. ind. Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 131, Pl. XXX. fig. 18. — Dumortier, Dép. jur. bass. du Rhône, I. Infralias, 1864, p. 11, Pl. I. fig. 7. Südalpen, Frankreich, Rhaetisch.
N. sp. ind. Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. Vol. II/4, 1908, p. 10, Pl. I. fig. 12. Burma, Rhaetisch.

Gen. **Ctenodonta** Salter.

- C. elliptica* Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 153, Taf. CXXIV. fig. 16 (Nucula). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 83, Taf. VIII. fig. 8 (Nucula). — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 197 (Leda). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 102 (Nucula). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 67, Taf. XIX. fig. 6 (Leda) [Nucula tenuis v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 263, Taf. XVII. fig. 17 inclus.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 142, Taf. XVI. fig. 26—31 (Palaeoneilo). — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. II. 1895, p. 57, Tav. III. fig. 18. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 203, Taf. XXIV. fig. 22—25. — Frech, Nachr. zu Cephal. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/I, 1905, p. 14, Textfig. 17/2 (var.). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 17, 18 (Nucula). — Walther, Zwölftaf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 28, Taf. VI. fig. 31. — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 104, Taf. XXXIV. fig. 26 (Palaeoneilo). — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 300, Tav. IX. fig. 23—25 (Palaeoneilo). — Paulcke, Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 232 (Palaeoneilo).

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle. — Südalpen, Skythisch, Karnisch. — Bakony, Sizilien, Karnisch. — Schweiz, Röthidolomit.

- C. elliptica* (G d f.) var. *praecursor* Frech, Neue Zweischaler etc. d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/I, 1904, p. 11, Textfig. 9 [Nucula elliptica v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 603 inclus.]. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, Vol. XLVI. Milano, 1913, p. 777.
 Deutschland, Muschelkalk. — Südalpen, Bakony, Anisisch.

C. cf. elliptica (G d f.) **T o m m a s i**, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 107, Tav. II. fig. 3.

Südalpen, Anisisch.

C. lineata F r e c h (1904, 1907) vide *Palaeoneilo lineata*.

C. praeacuta (K l i p s t.) F r e c h (1905) vide *Palaeoneilo praeacuta*.

C. tenella F r e c h (1905) vide *Palaeoneilo tenella*.

Gen. **Leda** Schum.

L. alpina W i n k l e r (non d'Orbigny) 1859, 1861 vide *L. percaudata*.

L. bavarien W i n k l e r, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 574, Taf. VII. fig. 4.

Nordalpen, Rhaetisch.

L. Becki P h i l i p p i, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 176, Taf. VII. fig. 1.

Süddeutschland, Muschelkalk.

L. Biondii N e l l i, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 27, Tav. VIII. fig. 16, 17 [syn. c.? *Mytilus Biondii* G e m m e l l a r o, Sopra alc. organ. foss. d. Turoniano e Nummulitico di Judica, Atti Acad. Gioenia sci. nat. Catania, ser. 2a, Vol. XV. 1860, Tav. I. fig. 1] vide *L. percaudata*.

L. Borsoni S t o p p a n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 132, Pl. XXX. fig. 25. — v. D i t t m a r, Contortazone, 1864, p. 172.

Südalpen, Rhaetisch.

L. Chaussoni R e n e v i e r (1864) vide *L. percaudata*.

L. clavellata v. D i t t m a r, Contortazone, 1864, p. 172 [Typ. *L. minuta* W i n k l e r (non d'Orbigny)], Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 475, Taf. VII. fig. 5, *Nucula* sp. ind. S t o p p a n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 130, Pl. XXX. fig. 12—15 inclus.]. — D e - S t e f a n i, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 101 [*Nucula* sp. ind. S t o p p a n i, l. c. p. 131, Pl. XXX. fig. 19 inclus.]. — S i m o n e l l i, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 16. — V i n a s s a d e R e g n y, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 839.

Nordalpen, Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

L. claviformis S t o p p a n i (non S o w.) [1863] vide *L. percaudata*.

L. complanata S t o p p a n i (non G d f.) [1861] vide *L. percaudata*.

L. Deffneri O p p e l et S u e s s (1856), O o s t e r (1869) vide *L. percaudata*, S t o p p a n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 131, Pl. XXX. fig. 22—34 = *L. sp. ind.*, teste v. D i t t m a r Contortazone, 1864, p. 171.

*L. (an *Palaeoneilo*?) distincta* B i t t n e r, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 150, Taf. XVI. fig. 38, 39. — B i t t n e r, Lam. aus d. Trias d. B a s s o n y e r w a l d e s, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 17, Taf. VIII. fig. 2.

Südalpen, Bakony, Karnisch.

L. (?) dubia G r a f z u M ü n s t e r, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 78, Taf. VII. fig. 22 (A vicula). — L a u b e, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 37, Taf. XV. fig. 8. (Lucina). — B i t t n e r, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 149, Taf. XVIII. fig. 1—7 [*L. Zelima* L a u b e (non d'Orbigny), l. c. p. 69, Taf. XIX. fig. 8 inclus.]. — B i t t n e r, Lam. aus d. Trias d. B a k o n y e r w a l d e s, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 17, Taf. VIII. fig. 1. — F r e c h, Leitfoss. d. W e r f e n e r Schichten etc. ibidem, 1907, p. 67.

Südalpen, Bakony, Karnisch.

L. sp. ind. aff. dubiae (M s t r.) J a w o r s k i, Nuculamerzel v. Misol, Palaeont. v. Timor, II/5, 1915, p. 108, Taf. XLIV. fig. 17.

Indonesien, Norisch.

L. elliptica L a u b e (1865), T o m m a s i (1894, 1895) vide *Ctenodonta elliptica*.

L. cf. elliptica Penecke, Verh. G. R. A. 1884, p. 384 vide Palaeoneile Penecke.

L. excavata d'Orbigny (1849) bide Nucula excavata.

L. fibula Mansuy, Mission Zeil dans le Laos etc. Méni. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 47, Pl. IX. fig. 10.

Laos (Indochina), Obertrias.

L. Heberti Martin, Pal. stratigr. de l'Infracrétien de la Côte d'Or, Méni. Soc. géol. France, ser. 2, Vol. VII. 1860/63, p. 79, Pl. II. fig. 1—4 [L. Titei Moore inclus?].

Frankreich, Rhaetisch.

L. minuta Winkler (non d'Orbigny) 1861 vide *L. clavellata*.

L. perecaudata v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 407. — v. Dittmar, Contortazone, 1861, p. 171 [*L. alpina* Winkler (non d'Orbigny), Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 15, Taf. I. fig. 8, Oberkeuper, Zeitschr. D. G.G. XIII. 1861, p. 473, Taf. VII. fig. 3, L. Deffneri Oppel et Suess, Aequival. d. Koessener Schichten Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, p. 546, Taf. II. fig. 9, *L. complanata* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 62, Pl. VIII. fig. 1, 2, *L. claviformis* Stoppani, l. c. 1863, p. 132, Pl. XXX. fig. 30, 31 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 227 [*L. Chaussoni* Renier, Not. géol. et pal. sur les Alpes Vaud. I. Infracrétien, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, T. VIII. 1864, p. 28, Pl. I. fig. 1 inclus.]. — Capellini, Foss. Infracrétien, golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866/67, p. 62, Tav. IV. fig. 20, 21 (*L. claviformis*). — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 64, Taf. II. fig. 19 [*L. Deffneri*, l. c. Taf. II. fig. 20 inclus.]. — Di Stefano, Lo schistomarn. con Nyoph. vestita d. Punta d. Pietre Nere, Boll. Com. geol. Ital. XXVI. 1895, p. 19, Tav. II. fig. 27, 28. — Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1890, p. 217, Tav. VIII. fig. 16, 17 (*L. Biondii*). — Cecchia-Rispoli, Nuove osservaz. sulla fauna trias. d. Punta d. Pietre Nere, ibidem, XX. 1901, p. 143, Textfig.

Frankreich, Süddeutschland, Schweiz, Nordalpen, Apennin, Rhaetisch. — Südalpen, Karnisch, Rhaetisch. — Sizilien, Apulien, Karnisch.

L. praecincta Laube (1865) vide Palaeoneile praecincta.

L. Schafarziki Frech, Nachtr. zu Cephal. u. Zweischaltern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/2, 1905, p. 14, Textfig. 18 [*L. aff. sulcellatae* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 149, Taf. XVIII. fig. 8, 9 inclus.].

Südalpen, Bakony, Karnisch.

L. Schiavi Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 132, Pl. XXX. fig. 27—29.

Südalpen, Rhaetisch.

L. semicrenulata Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 191, Pl. XXI. fig. 20.

Neuseeland, Karnisch.

L. subelliptica Parona (1889) vide *L. tirolensis*.

L. (?) subzelima Krumbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 52, Taf. III. fig. 15—17. Indonesien, Norisch.

L. sulcellata Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 84, Taf. VIII. fig. 15 (Nucula). — v. Hauser, Beitr. z. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 561, Taf. II. fig. 11, 12 (Nucula). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 147, Taf. XVIII. fig. 10 [*L. sulcellata* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 68, Taf. XIX. fig. 5 (= Phaenodesmia Klipsteiniana) exclus.].

Südalpen, Karnisch.

L. sp. ind. aff sulcellatae (Wissm.) Bittner, Lam. v. St. Cassian l. c. 1895, p. 149 vide *L. Schafarziki*.

L. *tirolensis* v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 212, Taf. VIII. fig. 15, 16. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 36. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 663 [L. subelliptica Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 114, Tav. IX. fig. 10 et Anodontophora ovalis Parona, l. c. p. 127, Tav. IX. fig. 19 inclus.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 152, Taf. XVIII. fig. 21—23.

Nordalpen, Südalpen, Karnisch.

L. cf. *tirolensis* (Woehrm.) Simionescu, Fauna trias. Desli Caira, Acad. Rom. IV. Boucarest, 1910, p. 483, Pl. I. fig. 20.

Dobrudscha, Ladinisch.

L. *Titei Moore*, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 504, Pl. XV. fig. 25. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 171.

England, Rhaetisch.

L. *Wissmanniana* Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 148, Taf. XVIII. fig. 11.

Südalpen, Karnisch.

L. (an *Palaeoneilo*?) *Zelima d'Orbigny*, Prodrome, I. 1849, p. 198 [Nom. nov. pr. Nucula subovalis Graf zu Münster (non Goldfuss) Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 84 Taf. VIII. fig. 12.] — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 149, Taf. XVI. fig. 37 [Leda Zelima Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 69, Taf. XIX. fig. 8 (= L. dubia Mstr.) exclus.].

Südalpen, Karnisch.

L. (an *Palaeoneilo*?) sp. ind. Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 95, Taf. VIII. fig. 5, 6.

Bakony, Anisisch.

L. (?) sp. ind. Willekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 156, Taf. VI. fig. 16.

Südalpen, Ladinisch.

L. :*Phaenodesmia*?! sp. ind. Krumbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913; p. 51, Taf. III. fig. 19.

Indonesien, Norisch.

Gen. **Palaeoneilo** Hall.

P. *Aguilerae* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 24, Pl. IV. fig. 2, VI. fig. 5, VII. fig. 10.

Mexico, Karnisch.

P. *Boesei* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 23, Pl. IV. fig. 3 VII. fig. 8.

Mexico, Karnisch.

P. *Broili* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 16, Pl. II fig. 3 VI. fig. 2, VII. fig. 3.

Mexico, Karnisch.

P. *Burkarti* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 18, Pl. III. fig. 2, VI. fig. 6, VII. fig. 4.

Mexico, Karnisch.

P. *circularis* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 27, Pl. IV. fig. 6, VII. fig. 5.

Mexico, Karnisch.

P. *cordiformis* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 28, Pl. V. fig. 1.

Mexico, Karnisch.

P. *Cordobae* Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 21, Pl. II. fig. 6.

Mexico, Karnisch.

- P. costata** Burckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 32, Pl. V. fig. 7, VII. fig. 15. Mexico, Karnisch.
- P. curvirostris** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 8, Pl. I. fig. 7, 8. Burma, Rhaetisch.
- P. Damesi** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 144, Taf. XVI. fig. 36. Südalpen, Karnisch.
- P. elliptica* Bittner, (1895), Broili (1904), Wagen (1907), Scalia (1909), Paulcke (1915) vide Ctenodonta elliptica
- P. excentrica** Krumbeck, Ob. Trias v. Buru, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 50, Taf. III. fig. 11—14. Indonesien, Noriseh.
- P. faba** Wissmann, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 85, Taf. VIII. fig. 16 (Nucula). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 135, Taf. XVI. fig. 17. Südalpen, Karnisch.
- P. cf. faba** (Wissm.) Mansuy, Contrib. a la carte géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 69, Pl. XVII. fig. 15—18. Tonkin, Karnisch.
- P. fibularis** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 5, Pl. I. fig. 1—3. Burma, Rhaetisch.
- P. Freehi** Burckhardt, Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 19, Pl. II. fig. 4. Mexico, Karnisch.
- P. Humboldti** Burckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 26 Pl. IV. fig. 5, VII. fig. 9. Mexico, Karnisch.
- P. (?) incerta** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 9, Pl. IX. fig. 40. Burma, Rhaetisch.
- P. inflata** Burckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 25, Pl. IV. fig. 1, VI. fig. 4, VII. fig. 11. Mexico, Karnisch.
- P. lediformis** Burckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 31, Pl. V. fig. 6, VII. fig. 14. Mexico, Karnisch.
- P. lineata** Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 153, Taf. CXXIV. fig. 17 (Nucula). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 83, Taf. VIII. fig. 9 (Nucula). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 63, Taf. XIX. fig. 1 (Nucula). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 133, Taf. XVI. fig. 1—16 [Nucula sp. ind. v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, Taf. XVII. fig. 21 inclus.]. — Gortani, Nuov. foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleont. VIII. 1902, p. 88. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 202, Taf. XXIV. fig. 19—21. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 9 (Nucula). — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 67 (Ctenodonta).
- Südalpen, Bakony, Karnisch.
- P. lineata** (Gdf.) var. **minutissima** Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 13, Textfig. 10 (Ctenodonta?). Bakony, Anisisch.
- P. cf. lineata** (Gdf.) Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 17. Bakony, Karnisch.
- P. longa** Burckhardt, Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 14, Pl. II. fig. 1. Mexico, Karnisch.

- P. lunaris** Böh m., Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 40, Taf. IV. fig. 18. — K i t t l, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 32, Taf. III. fig. 5. Bäreninsel, Ellesmereland, Karnisch.
- P. mexicana** Bur eck h a r d t , Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 20. Pl. VII. fig. 16, 17. Mexico, Karnisch.
- P. nanimensis** H e a l e y , Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 7, Pl. I. fig. 4—6. Burma, Rhaetisch.
- P. Ordonezi** Bur eck h a r d t , Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 33, Pl. V. fig. 5, VII. fig. 13. Mexico, Karnisch.
- P. otamitensis** T r e e h m a n n , Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 190, Pl. XXI. fig. 21. Neuseeland, Karnisch.
- P. Peneckei** B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 153, Taf. XVIII. fig. 16—20 [Typ. Leda cf. elliptica (G d f.) Penecke, Aus d. Trias v. Kärnten, Verh. G. R. A. 1884, p. 384.]. Südalpen, Karnisch.
- P. praeacuta** v. K l i p s t e i n , Östl. Alpen, 1843, p. 263, Taf. XVII. fig. 18 (Nucula). — L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Win, XXV. 1865, p. 68, Taf. XIX. fig. 7 (Leda). — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 143, Taf. XVI. fig. 32—35. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe, Palaeontograph. L. 1904, p. 202, Taf. XXIV. fig. 18. — F r e c h , Nachtr. zu Cephal. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1905, p. 14, 16, Textfig. 17/3 (Ctenodonta). — G a l d i e r i , Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 95, Tav. II. fig. 23. Südalpen, Karnisch.
- P. cf. praeacuta** (Klipst.) T o m m a s i , Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 37. — T r e e h m a n n , Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXII. 1917, p. 190, Pl. XXI. fig. 22. Südalpen, Bakony, Apennin (Salerno), Karnisch.
- P. quadrata** Bur eck h a r d t , Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 30, Pl. V. fig. 4. Mexico, Karnisch.
- P. rectangularis** Bur eck h a r d t , Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 30, Pl. V. fig. 3, VI. fig. 3, VII. fig. 12. Mexico, Karnisch.
- P. subcarinata** B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 136, Taf. XVI. fig. 18. Südalpen, Karnisch.
- P. tenella** B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, Taf. XVI. fig. 25. — F r e c h , Nachtr. zu Cephal. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1905, p. 14, Textfig. 16 (Ctenodonta). Südalpen, Bakony, Karnisch.
- P. tenuilineata** v. K l i p s t e i n , Östl. Alpen, 1843, p. 263, Taf. XVII. fig. 20 (Nucula). — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 135, Taf. XVI. fig. 19—24 [Nucula subobliqua Laubé (non d'Orbigny), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 65, Taf. XIX. fig. 3 inclus.]. — W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe etc. ibidem, XVIII/2, 1907, p. 105, Taf. XXXIV. fig. 27 (P. cf. tenuilineata). Südalpen, Bakony, Karnisch.
- P. Tobiesenii** Böh m., Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 40, Taf. IV. fig. 21, 22. Bäreninsel, Karnisch.

- P. triangularis Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 22, Pl. III. fig. 3, VII. fig. 6, 7.
Mexico, Karnisch.
- P. Villadae Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 19, Pl. II. fig. 5.
Mexico, Karnisch.
- P. Waitzi Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, l. c. p. 29, Pl. V. fig. 2.
Mexico, Karnisch.
- P. Whitechurchii Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 8, Pl. I. fig. 9.
Mexico, Karnisch.
- P. zacatecana Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 15, Pl. II. fig. 2, VII. fig. 1, 2.
Mexico, Karnisch.
- P. sp. ind. Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 41, Taf. IV. fig. 19, Textfig. 7.
Bäreninsel, Karnisch.
- P. (an Ctenodonta?) sp. ind. I. Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 9, Pl. I. fig. 10.
Burma, Rhaetisch.
- P. (an Ctenodonta) sp. ind. II. Healey, l. c. p. 9, Pl. I. fig. 11.
Burma, Rhaetisch.
- P. sp. ind. I. Bureckhardt, Trias sup. de Zacatecas, Bol. Ist. Geol. Mexico. No. 21, 1905, p. 33, Pl. III. fig. 4.
Mexico, Karnisch.
- P. sp. ind. II. Bureckhardt, l. c. Pl. III. fig. 5.
Mexico, Karnisch.

Gen. **Phaenodesmia** Bittner.

Zur Kenntnis der Nuculiden und Arciden von St. Cassian, Verh. G. R. A. 1864, p. 188. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 145.

- Typ. P. Klipsteiniana Bittner (1895).
- P. arcolata Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 146, Taf. XVIII. fig. 14.
Südalpen, Karnisch.
- P. Beneckeii Tornquist, Recoaro u. Schio, IV. Zeitsch. D. G. G. LII. 1900, p. 141, Taf. IV. fig. 6.
Südalpen, Anisisch.
- P. Klipsteiniana Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 145, Taf. XVIII. fig. 12 [Typ. Leda sulcellata Laube (non Wissmann), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 68, Taf. XIX. fig. 5, Nucula sulcellata var. v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 263, Taf. XVII. fig. 19 inclus.].
Südalpen, Karnisch.
- P. Laubearia Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 146, Taf. XVIII. fig. 15. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 201, Taf. XXIV. fig. 15—17. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 105.
Südalpen, Karnisch.
- P. regia Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 31, Taf. II. fig. 11.
Ellesmereland, Karnisch.
- P. similis Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 146, Taf. XVIII. fig. 13.
Südalpen, Karnisch.

Fam. Arcidae Lam.

Len. **Arca** Lam.

- A. Azzarolae Stoppani**, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 60, Pl. VII. fig. 13—16. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 169. — Ooster, Rhaetische Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 71, Taf. II. fig. 16, 17.
Südalpen, Westschweiz, Rhaetisch.
- A. (an Macrodon?) Badiana Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 131, Taf. XV. fig. 21.
Südalpen, Kärrnisch.
- A. bassinensis Rossi**, in Parona, Contrib. a studio dei Megalodonti, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XXX. 1888, p. 4. — Del Campana Foss. dol. princ. d. valle del Brenta, Boll. Soc. geol. Ital. XXVI. 1907, p. 471, Tav. XV. fig. 5.
Südalpen, Hauptdolomit.
- A. bavarica* Winkler (1861), v. Dittmar (1864), Ooster (1869), Goetel (1916), vide Grammatodon bavaricum.
- A. (an Grammatodon?) canalicula v. Guembel**, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 406. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 169 (deest imago!).
Nordalpen, Rhaetisch.
- A. concentrica* Münter (1841) vide Hoferia duplicata.
- A. (?) cultrata Stoppani**, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 60, Pl. VII. fig. 11, 12. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 170.
Südalpen, Rhaetisch.
- A. Dannenbergi* v. Klipstein (1843) vide Cucullaea Dannenbergi.
- A. esinensis* Stoppani (1859) vide Macrodon esinensis.
- A. formosa* v. Klipstein (1843) vide Cucullaea formosissima.
- A. formosissima* d'Orbigny (1849) vide Cucullaea formosissima, v. Alberti (1864) vide Macrodon Beyrichii.
- A. impressa* Münter (1841), v. Dittmar (1864) vide Cucullaea impressa.
- A. inflata** Öberg, Trias först. fr. Spetsbergen, Svenska Vet. Akad. Handl. XIV/14, 1877, p. 17, Taf. V. fig. 7.
Spitzbergen, Anisisch.
- A. (?) lata** Graf zu Münter, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, Taf. VII. fig. 6.
Südalpen, Karnisch.
- A. Lycettii* Moore (1861) vide Grammatodon Lycettii.
- A. minuta* Goldfuss [non Gmelin] (1838) vide Cucullaea minutissima.
- A. minutissima* d'Orbigny (1848), v. Alberti (1864) vide Cucullaea minutissima.
- A. (an Macrodon?) nuda** Graf zu Münter, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, Taf. VIII. fig. 7.
Südalpen, Karnisch.
- A. (an Macrodon?) cf. nuda** (Mst.) Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 131, Taf. XV. fig. 20. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 32, Taf. III. fig. 12, 13.
Südalpen, Karnisch.
- A. (?) Pichleri** v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1864, p. 406. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 170 (deest imago!).
Nordalpen, Rhaetisch.
- A. pumila* v. Dittmar (1864) vide Grammatodon pumilus.
- A. (an Macrodon?) punctata** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 130, Taf. XIV. fig. 14.
Südalpen, Karnisch.
- A. (an Macrodon?) sp. ind., aff. punctatae** (Bittn.) Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, Taf. VI. fig. 15.
Südalpen, Ladinisch.

- A. rhaetica* v. Guembel (1861), v. Dittmar (1864) vide Parallelodon hettangiensis.
A. rudis Stoppani (1865), Ooster (1869) vide Macrodon rudis.
A. rugosa Münster (1841) vide Cucullaea rugosa.
A. Schmidii Geinitz (1842), v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 323, Taf. II, fig. 16 vide Unicardium Schmidii.
A. socialis Giebel (1856) vide Macrodon Beyrichii.
A. Songavatii Stoppani (1865) vide Macrodon Songavatii.
A. strigillata Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 145, Taf. CXXII. fig. 10, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 81, Taf. VIII. fig. 2 = Gen. ind. sp. ind., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 121 (Fam. Pholadomyidae an Anatinidae?).
A. tirolensis Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 206, Taf. XXV. fig. 1. Südalpen, Karnisch.
A. triasina F. Römer (1851), Giebel (1856), v. Seebach (1861), v. Eck (1862), v. Alberti (1864) vide Macrodon Beyrichii.

Gen. Arcoptera Bittner.

- Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 126.
 Typ. *A. elegantula* Bittner (1895).
A. ampla Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 208, Taf. XXV. fig. 6—8. Südalpen, Karnisch.
A. areata Broili, Fauna d. Pachycardientuffe et. Palaeontograph. L. 1904, p. 208, Taf. XXV. fig. 14—17. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 103, Taf. XXXIV. fig. 24. Südalpen, Karnisch.
A. canaliculata Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 716, Taf. XXIII. fig. 11, 12. — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 14 (Arcoptera an Catella?). Dinariden, Anisisch.
A. elegantula Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 126, Taf. XIV. fig. 12 (var. *tenella*, fig. 3 inclus.). Südalpen, Karnisch.
A. impressa Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 161, Taf. VI. fig. 25. Südalpen, Ladinisch.
A. indica Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 87, Pl. XII. fig. 4. Himalaya, Anisisch.
A. laterareata Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 209, Taf. XXV. fig. 9, 10. Südalpen, Karnisch.
A. Schlosseri Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 102, Taf. XXXIV. fig. 23. Südalpen, Karnisch.
A. vixareata Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 209, Taf. XXV. fig. 11—13. Südalpen, Karnisch.
A. cf. vixareata (Broili) Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 101, Taf. XXXIV. fig. 22. Südalpen, Karnisch.
A. (an Hoferia?) nov. sp. ind. Waagen, l. c. p. 104, Taf. XXXIV. fig. 25. Südalpen, Karnisch.

Gen. Cucullaea Lam.

- C. acuta* Capellini (1868) vide Parallelodon hettangiensis.
C. Aspasia d'Orbigny, Prodrome. I. 1849, p. 199, Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 61, Taf. XVIII. fig. 11 = sp. non val., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 122.

- C. Alingeri* L a u b e (1865) vide *Pichleria Alingeri*.
C. Beyrichii v. S t r o m b e c k, Über *C. Beyrichii* aus d. Muschelk., Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 451 vide *Macrodon Beyrichii*.
C. Canavarii Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 237, Tav. VII. fig. 30.
Apennin, Rhaetisch.
- C. castellanensis* C a p e l l i n i, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 60, Tav. IV. fig. 17.
Apennin, Rhaetisch.
- C. (an Macrodon?) Cherieana* B ö h m, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 39, Taf. IV. fig. 24.
Bäreninsel, Karnisch.
- C. Dannenbergii* v. K l i p s t e i n, Östl. Alpen, 1843, p. 257, Taf. XV. fig. 27.
Südalpen, Karnisch.
- C. (an Macrodon?) formosissima* d'Or b i g n y, Prodrome I. 1849, p. 200 [Nom. nov. pr. *Arca formosa* v. *Klipstein*, Östl. Alpen, 1843, p. 264, Taf. XVII. fig. 22]. — B i t t n e r, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 119, Taf. XV. fig. 3—7. — De T o n i, Fauna trias. di Valdepena, Mena. Ist. geol. Padova, II. 1913, p. 184, Tav. XV. fig. 3 (*Macrodon formosus*). — Pa u l c k e, Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 213.
Südalpen, Karnisch, Ladinisch. — Schweiz, Röthidolomit.
- C. hemisphaerica* v. K l i p s t e i n, Östl. Alpen, 1843, p. 264, Taf. XVII. fig. 24 (*Arca*).
Südalpen, Karnisch.
- C. hettangiensis* (R e t q.) M e r c i a i (1908) vide *Parallelodon hettangiensis*.
- C. impressa* G r a f z u M ü n s t e r, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 82, Taf. VIII. fig. 4 (*Arca*). — L a u b e. Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 60, Taf. XVIII. fig. 9. — B i t t n e r, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 118, Taf. XV. fig. 1, 2. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 163, Taf. V. fig. 36, 37 (*Macrodon*) [Non *C. Beyrichii* v. Strombeck]. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc., ibidem, L. 1904, p. 205, Taf. XIV. fig. 31—33. — Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 95, Taf. VI. fig. 6. — W i l c k e n s, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 157, Taf. VI. fig. 22.
Südalpen, Karnisch, Ladinisch.
- C. cf. impressa* (M s t r.) v. D i t t m a r, Contortazone, 1864, p. 170 (*Arca*).
Nordalpen, Rhaetisch.
- C. cf. impressa* (M s t r.) T o m m a s i, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 33.
Südalpen, Karnisch.
- C. italica* M e r c i a i, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 239, Tav. VII. fig. 32.
Apennin, Rhaetisch.
- C. minutissima* d'Or b i g n y, Prodrome, I. 1849, p. 175 [Nom. nov. pr. *Arca minuta* Goldfuss (non Gmelin), Petr. Germ. II. 1838, p. 145, Taf. CXXII. fig. 9] (*Arca*). — v. A l b e r t i, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 98.
Süddeutschland, Unt. Muschelkalk.
- C. cf. minutissima* d'Orb. T o m m a s i, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 33.
Südalpen, Karnisch.
- C. Murchisoni* C a p e l l i n i, Foss. infralias. d. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2. Vol. V. 1866, p. 60, Tav. IV. fig. 13—16. — M e r c i a i, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 237, Tav. VII. fig. 29.
Apennin, Rhaetisch.

- C. nana* v. Eichwald, Naturhist. Bem. etc. 1851, p. 128, Taf. I. fig. 9 = ? Pichleria Auingeri Laubé, teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 128.
- C. nuculiformis** Geinitz, Petref. d. Zechsteins und Muschelkalkes, Neues Jahrb. f. Min. 1842, p. 577. Taf. X. fig. 11. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 100.
- Deutschland, Lettenkohle.
- C. nuculiformis** Schmid et Schleiden (non Geinitz), Geol. Verhältn. d. Saaletales bei Jena, 1846, Taf. IV. fig. 3, Schmid, Das ostthüring. Röth, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1881, p. 141, Auernbach, Gora Bogdo, 1871, p. 47. Taf. I. fig. 12 vide Pseudocorbula nuculiformis.
- C. polyglypha* Laubé (1865) vide Pichleria polyglypha.
- C. Porroi** Tommasi, Revis. funa dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 103, Tav. XVI. fig. 27, XVII. fig. 1.
- Südalpen, Hauptdolomit.
- C. rugosa** Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols IV. 1841, p. 82, Taf. VIII. fig. 3 (Area). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 61. Taf. XVIII. fig. 7. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 119 (= sp. incert.).
- Südalpen, Karnisch.
- C. Seisiana** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 206, Taf. XXV. fig. 2.
- Südalpen, Karnisch.
- C. sp. ind. aff. Seisianae** (Br.) Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 96, Taf. VI. fig. 20.
- Südalpen, Ladinisch.
- C. strigillata* Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 34 = Macrodon sp. ind. aff. imbricario Bittn.
- C. (an Macrodon?) Tschapitana** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 205. Taf. XXIV. fig. 34, 35.
- Südalpen, Karnisch.
- C. Ugolini Merciai**, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Ital. sci. nat. Pisa. XXIV. 1908, p. 238, Tav. VII. fig. 31.
- Apennin, Rhaetisch.
- C. (an Macrodon?) sp. ind.** Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel. Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 40, Taf. IV. fig. 20.
- Bäreninsel, Karnisch.

Gen. **Grammatodon** Meek et Hayden.

(Subgen. **Catella** Healey inclus.).

- G. bavaricum** Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XII. 1861, p. 475, Taf. VII. fig. 2 (Area). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 169 (Area). — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 72, Taf. II, fig. 15 (Area). — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 12. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 181 (Area).
- Nordalpen, Schweiz, Karpathen, Rhaetisch.
- G. Lyetti Moore**, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 501, Pl. XVI. fig. 7 (Area). — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new. ser. II/4, 1908, p. 11, Pl. I. fig. 15—19.
- England, Burma, Rhaetisch.
- G. pumilus** v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 170, Taf. III. fig. 3 (Area). — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 12.
- Nordalpen, Rhaetisch.

Subgen. **Catella** Healey,

Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 13.
 Typ. *C. laticlava* Healey (1908).
C. laticlava Healey, l. c. p. 13, Pl. I. fig. 20—23.
 Burma, Rhaetisch.

Gen. **Hoferia** Bittner.

Zur Kenntnis d. Nuculiden u. Arciden v. St. Cassian, Verh. G. R. A. 1894, p. 190. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 123.

Typ. *Lucina duplicata* Münsster-Goldfuss (1838).

H. compressa Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 207, Taf. XXV. fig. 5.
 Südalpen, Karnisch.

H. duplicata Graf zu Münsster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 227, Taf. CXXXVI. fig. 12 (*Lucina*). — Graf zu Münsster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 90, 142, Taf. VIII. fig. 28 (*Lucina*). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 36, Taf. XV. fig. 3. (*Lucina*). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 123, Taf. XIV. fig. 6—8, XXIV. fig. 6, 7 [*Area concentrica* Münsster, l. c. p. 82, Taf. VIII. fig. 5 inclus.]. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 207, Taf. XXV. fig. 3, 4.
 Südalpen, Karnisch.

H. cf. duplicata (Mstr.) Mansuy, Contrib. à la carte géol. [de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 68, Pl. XVII. fig. 26.
 Tonkin, Karnisch.

H. emarginata Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 125, Taf. XIV. fig. 9.
 Südalpen, Karnisch.

H. exsul Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 19, Taf. VII. fig. 34. — Bakony, Karnisch.

H. magna Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 125, Taf. XIV. fig. 10.
 Südalpen, Karnisch.

H. cf. magna Bittner, l. c. p. 125.
 Südalpen, Ladinisch.

H. (?) Marianii Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 156, Taf. VI. fig. 17, 21.
 Südalpen, Ladinisch.

H. simplex Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 124, Taf. XIV. fig. 4 (var. *obliqua*, fig. 5) [*? Isocardia Mandelslohi* v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 260, Taf. XVII. fig. 5 inclus.].
 Südalpen, Karnisch.

H. (?) Tommasii Mariani, Contr. a. studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 242, Tav. X. fig. 1 [*Myophoria* sp. ind. Mariani, Appunti di Paleontol. Lomb., ibidem, XXXVI. 1896, p. 129, Tav. II. fig. 5 inclus.] (*Myophoria*). — Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 157. — Di Stefano, La dolomia princ. di Palermo etc. Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 72, Tav. IX. fig. 8 (*Myophoria*).
 Südalpen, Ladinisch. — Sizilien, Hauptdolomit.

Gen. **Macrodon** Lyett.

M. Beyrichii v. Strombeck, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes im nordwestl. Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 451, Taf. VII A (*Cucullaea*). — v. Eok, Form. d. bunten Sandst. etc. in Oberschles., 1865, p. 100 [*Area triasina* Römer, Neue Verst.

aus d. Muschelk. v. Willebadessen, Palaeontograph. I. 1851, p. 298, 315, Taf. XXXV. fig. 5, XXXVI. fig. 14—16, Giebel, Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 46, Taf. IV. fig. 8, v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 602, v. Eck, Der Opatowitzer Kalkstein etc., ibidem, XIV. 1862, p. 303, v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 100, Area socialis Giebel, l. c. p. 46, Taf. V. fig. 2 inclus.]. — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 47, Taf. I. fig. 11 (Area triasina). — Noetling, Entwicklung d. Trias i. Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 325, Taf. XIV. fig. 5. — Blanckenhorn, Trias am Nordrande d. Eifel, Abhandl. z. Geol. Spezialkte. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 76, 102. — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 104, Tav. II. fig. 1. — Philipp, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 177, 208, Taf. VI. fig. 6 [Area formosissima v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 99 inclus.]. — Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 715. — Philipp, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 6. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 28, Taf. VI. fig. 33. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XI. fig. 1, 2 (= Area socialis Giebel). — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 86. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 615, Taf. XXXIV. fig. 1—3 (M. impressus).

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit. — Südalpen, Dinariden, Anisisch. — Astrachan (Bogdo), Skythisch.

M. Buchii Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 39, Taf. IV. fig. 11, 14.

Bäreninsel, Karnisch.

M. Curionii Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 121, Taf. XV. fig. 16.

Südalpen, Karnisch.

M. cf. Curionii (Bittn.) Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 191, Pl. XXI. fig. 12, 13.

Neuseeland, Karnisch.

M. Duneri Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 39, Taf. IV. fig. 25.

Bäreninsel, Karnisch.

M. elongatus Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 95, Taf. VIII. fig. 13.

Bakony, Anisisch.

M. esinensis Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 88, Pl. XVII. fig. 15—17 (Area). — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 164, Taf. V. fig. 38, 39. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 121, Taf. XV. fig. 17, 18. — Vinassa de Regny, Foss. del Montenegro I. Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, Vol. X. 1903, p. 223 (464), Tav. II. fig. 22. — Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 158, Taf. VI. fig. 23, 24. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 31, Tav. III. fig. 10, 11. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 166, Taf. XXXIV. fig. 4.

Südalpen, Dinariden, Ladinisch, Karnisch. — Norddeutschland, Muschelkalk.

M. formosus De Toni (1913) vide Cucullaea formosissima.

M. imbricarius Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 120, Taf. XV. fig. 8—12 [Nom. nov. pr. M. strigilatus Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 63, Taf. XVIII. fig. 8.]. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 163 (cf. M.

- strigilatus L b e.). — Bittner, Lam. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 230, Taf. VII. fig. 4. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pontan. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 93. Südalpen, Karnisch, Ladinisch. — Apennin (Salerno), Karnisch.
- M. cf. imbricarius (Bittn.) Willekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 159. Südalpen, Ladinisch.
- M. sp. ind. aff. imbricario (Bittn.) Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 100 [Typ. M. imbricarius Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 203, Taf. XXIV. fig. 26.] Südalpen, Karnisch.
- M. sp. ind. ex aff. imbricario (Bittn.) Mansuy, Contrib. à la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 68, Pl. XVIII. fig. 5. Tonkin, Karnisch?
- M. sp. ind. aff. imbricario (Bittn.) Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 68, Tav. IX. fig. 3, 4 (sp. ind. aff. strigilato). Sizilien, Hauptdolomit.
- M. impressus Salomon (1895) vide Cucullaea impressa, Ahlburg (1906), Assmann (1915) vide M. Beyrichii.
- M. juttensis Pichler, Zur Geol. v. Tirol, Verh. G. R. A. 1890, p. 94 (Area). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 120, Taf. XV. fig. 13—15 [M. strigilatus v. Woehrmann (non Laube), Fauna d. Carditaschichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 210, Taf. VIII. fig. 8, 9, Raibler Schichten, ibidem, XLIII. 1893, p. 662 inclus.]. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 19, Taf. VIII. fig. 12. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, ibidem, 1904, p. 31, Textfig. 46. — Galdieri, Trias d. Giffoni, Atti Acad. Pont. Napoli, XXXVIII. 1908, p. 94, Tav. II. fig. 22. Nordalpen, Bakony, Apennin (Salerno), Karnisch.
- M. Klipsteini Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 204, Taf. XXIV. fig. 27—29. Südalpen, Karnisch.
- M. Latemari Tommasi, Fauna del calc. bianco del Latemar etc. Atti Acad. d. Agiati, Rovereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 81, Tav. I. fig. 4. Südalpen, Ladinisch.
- M. (an Cucullaea?) Laubei Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 204, Taf. XXIV. fig. 30. Südalpen, Karnisch.
- M. mediodepressus Krumbbeck, Ob Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 54, Taf. III. fig. 20. Indonesien, Norisch.
- M. (?) parvus Hoffmann, Fauna d. Hauptdol. etc. d. Ofen-Kovacsier Geb. Mitt. aus Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 185, Taf. XII. fig. 4. Ungarn (Ofener Geb.), Hauptdolomit.
- M. rufus Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 258, Pl. LX. fig. 1 (Area). — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. i. Bern, 1869, p. 72, Taf. II. fig. 14 (Area). — Tommasi, Revis. fauna d. dolom. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 103, Tav. XVII. fig. 2. Südalpen, Schweiz, Rhaetisch, Hauptdolomit.
- M. cf. rufus (Stoppa) Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/3, 1907, p. 82, Textfig. 16. Bakony, Hauptdolomit.
- M. scaber Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 99, Taf. XXXIV. fig. 21. Südalpen, Karnisch.
- M. solitarius Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 98, Taf. VIII. fig. 11. Bakony, Anisisch.

M. Songavatii Stoppanni, Pal. Lomb. II. Couches à A.v. contorta, 1865, p. 258, Pl. LX. fig. 2. — **T'ommasi**, Revis. fauna d. dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 103, Tav. XVII. fig. 3. Südalpen, Hauptdolomit, Rhaetisch.

M. strigilatus Laubbe (non Goldfuss) 1865 vide M. imbricarius, v. Woehrmann (1889, 1893) vide M. juttensis, Parona, Studio monograph. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 110, Tav. IX. fig. 4, 5, v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 178 = M. sp. ind. aff. imbricario Bittn. teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 120.

M. Sturi Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 121, Taf. XV. fig. 19.

Nordalpen, Karnisch.

M. (?) subalpinus Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 111, Tav. IX. fig. 6. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 662.

Südalpen, Karnisch.

M. Taramellii Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 112, Tav. IX. fig. 7 = sp. non val., teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 662.

Gen. **Macrodonella** Assmann.

Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 616.

Typ. **M. lamellosa Assmann** (1915).

M. lamellosa Assmann, l. c. p. 616, Taf. XXXIV. fig. 5, 6, Textfig. 4. Schlesien, Muschelkalk.

Gen. **Parallelododon** Meek.

P. hettangiensis (Tereque) Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 59, Tav. IV. fig. 11, 12 (Cucullaea acuta). — Merciai, Foss. Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 236, Tav. VII. fig. 27, 28. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtrr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 180 [Area rhaetica v. Guembel, Geogn. Beschr. v. Bayern, Ob. Abt. d. Keupers, 1861, p. 52 (406), v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 170 inclus.].

Apennin, Nordalpen, Karpathen, Rhaetisch, sonst Lias.

Gen. **Pichleria**, Bittn.

Zur Kenntn. d. Nuucliden u. Arciden v. St. Cassian, Verh. G. R. A. 1894, p. 189. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 127.

Typ. Cucullaea Auingeri Laubbe (1865).

P. Auingeri Laubbe, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 62, Taf. XVIII. fig. 16. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 127, Taf. XIV. fig. 11—13.

Südalpen, Karnisch.

P. Canavarii Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 127, Taf. XXIV. fig. 13.

Südalpen, Karnisch.

P. obesula Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 129, Taf. XIII. fig. 27.

Südalpen, Karnisch.

P. polyglypha Laubbe, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 62, Taf. XVIII. fig. 12 (Cuculæa). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 128, Taf. XIII. fig. 23—26.

Südalpen, Karnisch.

Subordo: **Heterodonta** Neymayer.**A. Integripalliata.**

Fam. Trigoniidae Lam. em. v. Woehrm.

Gen. **Cardinia** Ag.

- C. concinna (Sow.) Vaughan, in Reynolds et al., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 204, Pl. XVIII. fig. 4, Textfig. 4.
England, Rhaetisch, sonst Lias.
- C. (?) goettingensis Pflücker, Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 419, Taf. VII. fig. 7. — Ooster, Rhaet Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 69, Taf. IV. fig. 2
Deutschland, Schweiz, Rhaetisch.
- C. keuperiana v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 181 [Nom. nov. pr. C. sublaevis v. Guembel (non d'Orbigny, 1847), Bayer. Alpengeb. 1861, p. 407]. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXIV. fig. 15, 29.
Nordalpen, Rhaetisch. — Thüringen, Lettenkohle.
- C. Listeri (Sow.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 68, Taf. IV. fig. 1.
Schweiz, Rhaetisch.
- C. mactroides Levallois, Couches de jonction du Trias et du Lias etc., Bull. Soc. géol. France, sér. 2, Vol. XXI. 1864, p. 395. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 234.
Frankreich, Rhaetisch.
- C. Muensteri d'Orbigny (1849) vide Anodontophora Muensteri.
- C. (?) ovula Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 32, Taf. II. fig. 12, 13.
Ellesmereland, Karnisch.
- C. problematica v. Hauer (1857) vide Trigonodus problematicus C. sp. ind. Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nörd. Vorarlberg, 1853, p. 105, 107, Taf. IV. fig. 34—36 vide Myoconcha Curionii, fig. 37 vide Myoconcha lombardica.

Gruenewaldia v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc., Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 215 [Typ. *Myophoria decussata* Mstr.] = gen. non val., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 104.
G. decussata (Mstr.) v. Woehrmann, l. c. p. 216, Taf. IX. fig. 4—6 vide *Myophoria* Woehrmanni.

Gen. **Heminajas** Neumayr.

Morphol. Einteilung d. Bivalven, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 789. — v. Woehrmann, Über d. system. Stellung d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 6. — Waagen, Lam. d. Frombachtuffe, Verh. G. R. A. 1906, p. 387. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 140.

Typ. *Myophoria fissidentata* v. Woehrmann (1899).

H. *Balatonis* Frech, Nachtr. zu Cephal. u. Zweischaltern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1905, p. 7, Textfig. 9 (*Myophoria*). — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 8 (*Myophoria*). — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 39 (*Myophoria*). — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 142.
Bakony, Skythisch.

H. *fissidentata* v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 213, Taf. VIII. fig. 17—19 (*Morphoria*) [*Myophoria elongata* v. Hauer (non Wissmann), Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, Taf. III. fig. 6—9, *Myacites linearis* Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 384, Taf.

LXV, fig. 14 inclus.]. — *Neumayr*, Morphol. Einteilg. d. Bivalven, Denkschr. Akd. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 789. — v. *Woehrmann et Koken*, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 181, Taf. VI. fig. 3—7 [non 1, 2 = H. Woehrmanni] (*Myophoria*) [*Trigonodus Balsami Parona*, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 125, Tav. IX. fig. 11—15 inclus.]. — v. *Woehrmann*, Syst. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 2—7, Taf. I. fig. 1, 2 (*Myophoria*). — v. *Woehrmann*, Raibler Schichten, ibidem, p. 664. (*Myophoria*). — *Broili*, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 215, Taf. XXVII. fig. 37, 38, 41, 42 (*Myophoria*). — v. *Arthaber*, Alpine Trias, Leth. Mes. I/3, 1906, Taf. XLII. fig. 3 (*Myophoria*).

Südalpen, Karnisch.

H. Geyeri Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 46, Taf. XXIX. fig. 9—13 (var. lata, l. c. p. 48, Taf. XXX. fig. 1—4 inclus.).

Südalpen. — Karnisch.

H. Woehrmanni Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiser-alm, Abhandl. G. R. A. XVII/2, 1907, p. 42, Taf. XXIX. fig. 2—8 [*Myophoria fissidentata* *Woehrmann et Koken*, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 181, Taf. VI. fig. 1 (non 3—7) inclus.].

Karnisch, Südalpen.

H. Woehrmanni var. Broili Waagen, l. c. p. 46 [*Typ. Myophoria fissidentata* *Woehrmann et Koken*, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 181, Taf. VI. fig. 2 (caet. exclus.), *Broili*, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 215, Taf. XXVII. fig. 39, 40.].

Karnisch, Südalpen.

H. Woehrmanni var. Neumayri Waagen, l. c. p. 44, Taf. XXIX. fig. 1, 14, XXX. fig. 5, XXVIII. fig. 13 [*Trigonodus Sandbergeri Tommasi*, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 47, Tav. IV. fig. 1, 2 inclus.].

Südalpen, Karnisch.

Lyrodon curvirostris Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 198, Taf. CXXXV. fig. 15a, b vide *Myophoria elegans*, fig. 15c, d. vide *Myophoria intermedia*.

L. deltoideus Goldfuß (1838) vide *Myophoria cardissoides*.

L. Gaytani v. Klipstein (1843) vide *Trigonia Gaytani*.

L. Goldfussi v. Eichwald (1851) vide *Myophoria vestita*.

L. Kefersteini Goldfuss (1837) vide *Myophoria Kefersteini*.

L. lineatus Goldfuss (1838) vide *Myophoria lineata*.

L. Okeni Eichwald (1851) vide *Myophoria Kefersteini*.

L. vulgaris Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 196, Taf. CXXV. fig. 16a, b vide *Myophoria vulgaris*, fig. 16c vide *Myophoria transversa*, fig. 16d, e vide *Myophoria simplex*.

Gen. **Myophoria** Bronn.

Leth. geogn. II. 1837, p. 168, III/3, 1856, p. 66. — v. Grünwaldt, Über d. Verst. d. schles. Zechsteingeb., Zeitschr. D. G. G. III. 1851, p. 246. — *Keferstein*, Über einige deutsche devon. Conchylien etc. ibidem, IX. 1857, p. 149. — v. Seebach, Conehylienfauna d. Weimar. Trias, ibidem, XIII. 1861, p. 605 [*Neeschizodus Giebeli*, Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 39 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 104. — Frech, Über *Mecynodon u. Myophoria*, Zeitschr. D. G. G. XLI. 1889, p. 131. — *Neumayr*, Morphol. Einteilg. d. Bivalven, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 787. — v. *Woehrmann*, System. Stellg. d. Triagoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 2. — *Koken*, Leitfossilien, 1896, p. 202, 523, 590. — Frech, Neue Zweischalen etc. aus d. Bakonyer Trias,

Pal. Bal. I/1, 1904, p. 3. — W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 144 [Subgen. Leviconcha W a a g ., Tropiphora W a a g ., Elegantinia W a a g ., Costatoria W a a g ., l. c. p. 149 inclus.]. — R ü b e n s t r u n k , Beitr. z. Kenntn. d. deutsch. Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 100. — C o s s m a n n , Sur l'évolution des Trigoniens, Annales de Paléontol. VII/2, 1912, p. 63.

M. acuticostata Broilli, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 216, Taf. XVIII. fig. 24—26. — W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 76.

Südalpen, Karnisch.

M. alata v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 109, Taf. II. fig. 2 = sp. incert., teste v. S e e b a c h , Zur Kritik d. Gattg. Myophoria etc. Nachrichten kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen, 1867, p. 384; Zeller, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle, Zentralbl. f. Min. 1907, p. 45, R ü b e n s t r u n k , Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 235, Taf. VIII. fig. 21.

Deutschland, Muschelkalk.

M. alta G a b b , Palaeont. of California, I. 1864, p. 33, Pl. VI. fig. 33. Nevada, Californien, ?

M. ampezzana Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 37, Taf. IV. fig. 4.

Südalpen, Dachsteinkalk.

M. (?) arkosiae Martin , Etage rhétien, 1865, p. 235, 280, Pl. III. fig. 5, 6.

Frankreich, Rhaetisch.

M. Balatonis Frech (1904), v. Arthaber (1906) vide Hemianjas Balatonis.

M. Balsami Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 258, Pl. LX. fig. 3—5. — Tommasi, Revis. fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 104, Taf. XVII. fig. 4.

Südalpen, Hauptdolomit, Rhaetisch.

M. bicarinata Stoppanni, Pal. Lomb. I. Petrif. d'Esino, 1860, p. 86, Pl. XVII, fig. 10—14 [M. inornata et M. carinata Stoppanni, Studii geol. e pal. s. Lombardia, 1857 p. 382 inclus.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 90.

Südalpen, Ladinisch.

M. bicostata Picard (1858) vide M. transversa.

M. Blainvillei v. Klipstein (1843) vide Pleurophorus Blainvillei.

M. cardissooides v. Zieten , Verst. Württembergs, 1830, p. 78, Taf. LVIII. fig. 4 (Trigonia). — v. Alberti, Trias, 1834, p. 55, 202. — Bronn, Leth. geogn. II. 1837, III/3, 1856, p. 173, Taf. XIII. fig. 9. — Quenstedt , Der Jura, 1852, p. 525, Taf. XLIII. fig. 21 (Trigonia). — v. Schauroth , Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 514. — v. Schauroth , Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent. ibidem, XXXIV. 1859, p. 322. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 116 [Lyrodon deltoideus Goldfuss , Petref. Germ. II. 1838, p. 197, Taf. CXXXV. fig. 13 inclus.]. — Weiss, Myoph. cardissooides bei Saarlouis, Zeitschr. D. G. G. XXII. 1870, p. 469. — Quenstedt , Handbuch d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 789, Taf. LXII. fig. 34 (Trigonia). — Philippi , Vorkommen v. M. cardissooides im ob. Muschelkalk d. Eyachtal, Neues Jahrb. f. Min. 1896, II. p. 195. — Bittner, Beitr. z. Palaeontol. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 709. — R ü b e n s t r u n k , Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 113, Taf. VI. fig. 1, 2 (var. transiens, l. c. p. 121, Taf. VI. fig. 3, elongata p. 123, Taf. VI. fig. 4 inclus.). — Assmann , Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 619, Taf. XXXIV. fig. 15.

Deutschland, Muschelkalk. — Südalpen, Skythisch.

- M. cf. cardissoides (Ziet.) Langenhan**, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 38, 39, 41.
 Deutschland, Muschelkalk.
- M. Caroli Rivai Tommasi**, Revis. fauna d. dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 105, Tav. XVII. fig. 8—13.
 Südalpen, Hauptdolomit.
- M. chenopus Laubbe**, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiens, XXV. 1865, p. 58, Taf. XVIII. fig. 4. — Frech, Über Myophoria u. Mecynodon, Zeitschr. D. G. G. XLI. 1889, Taf. XI. fig. 1. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 99, Taf. XI. fig. 15—17 [M. Whateleyae v. Woehrmann (non Buch), Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 214 (ex parte) inclus.]. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 16, Taf. VII. fig. 4.
 Südalpen, Nordalpen, Bakony, Karnisch.
- M. costata Zenker**, Beitr. z. Naturgesch. d. Urwelt, 1833, p. 55, Taf. VI. fig. A, 1—9 (Donax). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 608, Taf. XIV. fig. 10 (M. fallax.) — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 113 (M. fallax). — v. Eck, Üb. d. Form. d. bunt. Sandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 39. — v. Seebach, Z. Kritik d. Gattg. Myophoria, Nachr. kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen, 1867, p. 380 (M. fallax). — Richter, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 446. — Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 354, Taf. I. fig. 9 (M. fallax). — Schmid, Das ostthüring. Röth, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1881, p. 140. — Skuphos, Partnachsichten in Vorarlberg. Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 175, Taf. V. fig. 25, 26 (male!). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 116. — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I, 1895, p. 58. — Philippi, Kontin. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 10. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 6, Textfig. 1, 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3. 1906. Taf. XXXIV. fig. 11. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 31, Taf. VII. fig. 40. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. II. fig. 1—3. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten, Pal. Bal. I/1, 1907, p. 40. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 34 (282), Taf. V (XL) fig. 1. — Bübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 214, Taf. VIII. fig. 8 [M. Goldfuss Berger (non Alberti), Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 168, Taf. III. fig. 4 (non 5) inclus.]. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 622, Taf. XXXIV. fig. 25. Deutschland, Buntsandstein. — Nordalpen, Südalpen, Bakony, Skythisch.
- M. costata (Zenk. (fallax Seeb.)) var. subrotunda Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 81, Taf. VIII. fig. 29, 30. — v. Wittenburg, l. c. p. 34 (382), Taf. V (XL), fig. 2.
 Südalpen, Bakony, Skythisch.
- M. costulata Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 116, Taf. XII. fig. 24—27.
 Nerdalpen, Skythisch.
- M. curvirostris v. Schlotheim**, Petrefaktenkunde, 1820, p. 129, Nachtr. I. 1823, p. 112, Taf. XXXVI. fig 7 (Trigonellites.) — Bornemann, Verst. im span. Muschelkalk, Zeitschr. D. G. G. VIII. 1856, p. 165 (Trigonia). — v. Hauser, Pal. Notizen, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 153. — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin, ibidem, XXXIV. 1859, p. 321, Taf. II. fig. 14. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 609, Taf.

XIV. fig. 11. — v. Eck, Rüdersdorf, etc. Abhandl. z. Geol. Spez. Kte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 57, 89. — Ombooni, Foss. trias. d. Veneto, Atti Ist. Venet. sci. etc. Vol. VIII. ser. 5, 1882, p. 8. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 115. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandsteins etc. 1906, p. 31, Taf. VII. fig. 41. — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koenigs Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 43 (282), Taf. V (XL), fig. 4. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 217, Taf. VIII. fig. 9 [M. Goldfuss Berger (non Alberti), Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 168, Taf. III. fig. 5 (non 4) inclus.]. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 622, Taf. XXXIV. fig. 23, 24.

Deutschland, Röth, Muschelkalk. — Spanien, Muschelkalk. — Südalpen, Skythisch, Anisisch (?).

M. curvirostris Bronn (1837) vide *M. intermedia*, Catullo (1848) vide *M. vulgaris*.

M. cf. curvirostris (Schloth.) v. Loczy, Wissensch. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Széchenyi in Ostasien, III. 1899, p. 153, Taf. IX. fig. 27.

M. decussata Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 185, Taf. CXXXIII. fig. 5 (Cardita). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 86, Taf. VIII. fig. 20 (Cardita). — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 198. — Laubbe, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 58, Taf. XVIII. fig. 6. — Frech, Über Mecynodon u. Myophoria, Zeitschr. D. G. G. XLI. 1889, p. 135, Taf. XI. fig. 6. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 104, Taf. XII. fig. 1—8. — Bittner, Lam. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 232. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 215, Taf. XXVII. fig. 21—23. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIX. fig. 7. — Waggen, Fauna d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 76. — Scalia, Il gruppo del Mite. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 298, Tav. IX. fig. 19.

Non *M. decussata* Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 46, Tav. IIIa. fig. 4, teste Bittner, Verh. G. R. A. 1891, p. 51 = *M. Whateleyae* Buch, teste v. Woermann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 666, an *M. vestita* Alberti, teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 102.

Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Sizilien, Karnisch.

M. sp. ind. aff. decussata (Mstr.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 84, Pl. XI. fig. 7.

Himalaya, Anisisch.

M. elegans Dunker, Über d. im Kasseler Muschelk. gef. Mollusken Programm Gewerbeschule Kassel, 1849, p. 15 (Lyriodon). — Dunker, Über d. im Muschelkalk Oberschlesiens gef. Mollusken, Palaeontograph. I. 1851, p. 300, Taf. XXXV. fig. 1 (Lyriodon). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 110, Taf. II. fig. 3 [Lyriodon curvirostre Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 198, Taf. CXXXV. fig. 15a, b (caet. exclus., teste Rübenstrunk), Neoschizodus curvirostris Giebel, Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 43, Taf. IV. fig. 1, 3, 12, 15 inclus.]. — Richter, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 449. — Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 363, Taf. V. fig. 10. — Frech, Über Mecynodon u. Myophoria, Zeitschr. D. G. G. XLI. 1898, p. 135, Taf. XI. fig. 5. — Philippi, Grignageb. Zeitschr. D. G. G. XLVII. 1895, p. 728. — Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld

Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 168, Taf. VI. fig. 10. — v. Loezey, Wissenschaft. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Széchenyi i. Ostasien, III. 1899, p. 149, Taf. IX. fig. 12. — Tornquist, Recooro u. Schio, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 139, Taf. III. fig. 3. — Benecke, Myophoria inflata im schwäb. Raeth, Neues Jahrb. f. Min. 1900/I, p. 128, Taf. XI. fig. 2. — v. Linストow, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1903, p. 144. — Philipp Kontinent. Trias, Leth. nes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 8. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 30, Taf. VI. fig. 39. — Langenhan Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 28, 34, 35. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 95. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 227, Taf. VIII. fig. 13—17 [Trigonia curvirostris Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 1858, p. 28, Taf. I. fig. 1 inclus.]. — Hohenstein, Mittl. Muschelkalk am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 234 (62). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 622, Taf. XXXIV. fig. 21, 22.

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit. — Südalpen, Anisisch. — Yunnan (China), Karnisch (?)

M. sp. ind. aff. elegans Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Trias v. Catolinen, Zeitschr. D. G. G. LXXXI. 1919, p. 157 (Monatsber.). Spanien, Obertrias.

M. elongata v. Hauer (1857) vide Heminajas fissidentata, v. Seebach (1861) vide *M. ovata* var. *elongata*.

M. Emmrichi Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 16, Taf. II. fig. 13. — v. Dittmar, Contortaozne, 1864, p. 172 [*M. postera* Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 507, Pl. XVI. fig. 8—10, Trigonia sp. ind. Quenstedt, Der Jura, 1856, p. 28, Taf. I. fig. 4, 5 inclus.]. — Ooster, Rhaet, Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 96, Taf IV. fig. 4. — De-Sefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 101. — Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 43 [*M. postera* Lyett, British foss. Trigoniae, Palaeontogr. Soc. London, 1879, p. 215, Pl. XLI. fig. 6—9 inclus.]. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 185.

England, Schweiz, Nordalpen, Apennin, Rhaetisch.

M. cf. Emmrichi (Winkl.) Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 43, Pl. IX. fig. 35, 36. — Goetel, l. c. p. 185. — Burnia, Karpathen, Rhaetisch.

M. (?) Ewaldi (Bornem.) v. Alberti (1864) vide Isocyprina (?) Ewaldi,

M. exigua Berger, Verst. d. Schaumkalkes im Thüringer Wald, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 200, Taf. II. fig. 8—10. (= ? *M. orbicularis*).

Norddeutschland, Muschelkalk.

M. fallax v. Seebach (1861, 1867), v. Alberti (1864), Lepsius (1879), Walther (1907) vide *M. costata*.

M. fissidentata v. Woehrmann (1889, 1893), v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLV. 1892, p. 181, Taf. VI. fig. 3—7, Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, v. 215, Taf. XXVII. fig. 37, 38, 41, 42 vide Heminajas fissidentata, v. Woehrmann et Koken, l. c. Taf. VI. fig. 1 vide Heminajas Woehrmanni, Taf. VI. fig. 2, Broili, l. c. Taf. XXVII. fig. 39, 40 vide Heminajas Woehrmanni var. Broili, Tommasi (1890) vide Trigonodus problematicus.

M. Fritschii Pröscholdt (1877) = sp. non val. (ident. c. *M. costata* Zenk. [*M. fallax* Seeb.], teste Passarge, Das Röth im östl. Thüringen, 1891, p. 53.

M. Gaytani Laub e (1865) vide Trigonia Gaytani.

M. gibba Richter (1869) vide *M. orbicularis* var. *gibba*.

M. Goldfussi (v. Alberti), v. Zietzen, Verst. Württembergs., 1830, p. 94, Taf. LXXI. fig. 4 (male!) (Trigonia). — v. Alberti, Trias, 1834, p. 93, 100, 132. — Brönn, Leth. geogn. II. 1837, p. 72, Taf. XI. fig. 7. III/3, 1856, p. 70, Taf. XI. fig. 7. — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 199, Taf. CXXXVI. fig. 3 (Lyrodon). — v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenformt. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 125. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weintar. Trias, ibidem, XIII. 1861, p. 607, Taf. XIV. fig. 9. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 112, Taf. II. fig. 4 [M. Whateleyae (non v. Buch), p. 114, Taf. III. fig. 5 inclus.]. — Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 797, Taf. LXII. fig. 30 (Trigonia). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 665. — Tommasi, Fauna calc. conch. di Lombardia, 1894, p. 111. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII. 1895, p. 103, 116, Taf. XI. fig. 24—27 [M. Whateleyae v. Alberti, l. c. 1864, Taf. II. fig. 5 inclus.]. — Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 219, Tav. VIII. fig. 13. — Philipp, Fauna d. Trigonodus dol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 168, Taf. XI. fig. 10. — Philipp, Kont. Trias, Leth. nes, I/1, 1903, Taf. V. fig. 11. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 47, Textfig. 66—69. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 3. — Zeller, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle etc. Zentralbl. f. Min. 1907, p. 44. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 44, 114. — Mansuy, Contrib. à la ete. géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 70, Pl. XVII. fig. 22, 23. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben etc. Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 87. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 206, Taf. VIII. fig. 2—7. — Hohenstein, Mittl. Muschelkalk am südl. Schwalzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 231 (59), Taf. II. fig. 13.

Deutschland, Ob. Muschelkalk bis Mittl. Keuper. — Südalpen, Anisisch. — Bakony, Sizilien, Tonkin, Karnisch.

M. Goldfussi Berger, Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 168, Taf. III. fig. 4 vide *M. costata*, fig. 5 vide *M. curvirostris*, Berger, Verst. d. Schaumkalkes am Thüringer Wald, ibidem, 1860, p. 198, Taf. II. fig. 6, 7 vide *M. sp. ind. ex aff. Goldfussi*.

M. sp. ind. aff. Goldfussi (Alb.) Tornquist, Außeralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1108.

Sardinien, Muschelkalk.

M. sp. ind. ex aff. Goldfussi (Alb.) Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, l. c. p. 225 [Typ. *M. Goldfussi* Berger, Verst. d. Schaumkalkes am Thüringer Wad, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 198, Taf. II. fig. 6, 7].

Norddeutschland, Unt. Muschelkalk.

M. harpa Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II 1838, p. 29, Taf. CXLI. fig. 13 (Cardium). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 89 Taf. VII. fig. 30 (Trigonia). — Dröbigny, Prodrome, I. 1849, p. 198 (Trigonia). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 55, Taf. XVIII. fig. 1. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 91, Taf. XII. fig. 15—19. — Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 349.

Südalpen, Karnisch, Ladinisch? — Dinariden, Ladinisch.

M. Haueri Parona (1889) vide Trigonodus carniolicus.

- M. heslingtonensis** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 211, Pl. XXII. fig. 9.
Neuseeland, Karnisch.
- M. inaequicostata** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 254, Taf. XVI. fig. 18. — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 198. — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 57, Taf. XVIII. fig. 3 [M. Whateleyae v. Haue (non v. Buch), Beitr. z. Kenntn. d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 554 (ex parte), Taf. V. fig. 8—10 (non 4—7) inclus.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 94, Taf. XI. fig. 1—14. *M. Whateleyae* v. Woehrmann (non v. Buch), Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 214, Taf. IX. fig. 1—3 inclus.]. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 15. — Cheechia-Rispoli, Nuove osservaz. s. fauna trias. della Punta d. Pietre, Nere, Boll. Soc. geol. Ital. XX. 1901, p. 139, Textfig. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 70, Tav. IX. fig. 1, 2. — Mansuy, Paléontol. du Yunnan oriental, Mem. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 122, Pl. XXII. fig. 4. — Mansuy, Contrib. à l'étude des faunes paléozoïques et trias. du Tonkin, ibidem, II/5, 1913, p. 29, Pl. IV. fig. 12. — Mansuy, Foss. terr. més. de Sam Nena, ibid. VII/1.
Non *M. inaequicostata* Newton, (1900) [= *M. sp. ind. aff. inaequicostatae*].
- Nordalpen, Südalpen, Bakony, Apulien, Yunnan, Tonkin, Karnisch. — Sizilien, Hauptdolomit.
- M. cf. inaequicostata** (Klipst.) Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 48, Textfig. 73, 74.
Bakony, Hauptdolomit.
- M. cf. inaequicostata** (Klipst.) Mansuy, Contrib. à la cte. géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 69, Pl. XVII. fig. 21, XVIII. fig. 1—4. — Mansuy, Contrib. à la géol. du Tonkin, Paléont. Mémi. Serv. géol. Indochine, 1912, p. 66, Pl. XII. fig. 5. — Mansuy, Faunes paléozoïques et trias. de l'Annam, Mémi. Serv. géol. de l'Indochine, II/3, 1913, p. 25.
Tonkin, Annam, Karnisch?
- M. sp. ind. aff. inaequicostatae** (Klipst.) Newton, On marine triassic Lamellibr. Malay Peninsula, Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 134, Pl. XII. fig. 9, 10 (*M. inaequicostata*).
Malacca, Ob. Trias.
- M. sp. ind. aff. inaequicostatae** (Klipst.) Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 57, Tav. I. fig. 19.
Apennin (Salerno), Karnisch.
- M. incurvata** v. Seebach, Zur Kritik d. Gattg. Myophoria, Nachr. kgl. Ges. Wiss. Göttingen, 1867, p. 383, . — v. Linstow, Organ, Reste d. Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. 1903, p. 144. — Schmidt, Wellengeb. v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. Stat. Landesamt. i. Württemberg, No. 3, 1907, p. 60. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 190, 199, Taf. VII. fig. 19 [*Trigonia vulgaris* Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, Taf. LXII. fig. 32 inclus.].
Deutschland, Muschelkalk.
- M. inflata** Emmerich, Geogn. Beobacht. i. d. östl. bayr. Alpen, Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 49. — Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 16. — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, (Foss. de l'Azzarola), 1861, p. 58, Pl. VII. fig. 4, 5. — Winkler, Oberkouper, Zeitschr. D. G. G. XIII, 1861, p. 476, Taf. VII. fig. 7. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 17. [*Trigonia postera* Quenstedt, Der Jura, 1856, p. 28, Taf. I. fig. 2, 3. *Neoschizodus posterus* (Qu.) Oppel et Suess, Äquivalente d. Kössener Schichten in Schwaben, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, p. 544, Taf. II. fig. 6,

M. elegans v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 110, Taf. II. fig. 6 inclus.]. — *Pflücker*, Das Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 413 (Trigonia). — *Lepsius*, Das westl. Südtirol, 1878, p. 368, Taf. V. fig. 9. — *Benecke*, Myophoria inflata im schwäb. Rhaet, Neues Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 218, Taf. XI. fig. 1—3 [M. postera v. *Guembel*, Geol. v. Bayern, I. 1861, p. 690. Textfig. 6 inclus.]. — *Vaugham*, in *Reynolds et V.*, The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 204 (M. postera). — *Langenhan*, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 2 (M. postera). — *Rübenstrunk*, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 232, Taf. VIII. fig. 18 (M. postera). — *Goetel*, Rhaet. Stufe d. sub tatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 182 [M' postera *Moore*, Rhaetic beds, l. c. p. 507, Pl. XVI. fig. 10 (non 8, 9), Trigonia postera *Renavier*, Not. géol. et pal. s. l. Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 62, Pl. I. fig. 4, M. postera *Ooster*, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 69, Taf. IV. fig. 3 inclus.].

Deutschland, England, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.

M. inornata *Tommasi*, Riv. Fauna Raibl. Friuli. Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2. T. VIII. 1890, p. 46 = sp. non val., teste v. *Wohrmann*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 666.

M. intermedia v. *Schaueroth* Schaltiere d. Lettenkohlenform., Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 127, Taf. VII. fig. 3. — v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 111. — v. *Seebach*, Zur Kritik d. Gattg. Myophoria, Nachr. kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen, 1867, p. 388. — v. *Linstow*, Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. XXIV. 1903, p. 140, Taf. XII. fig. 6 [M. vulgaris v. *Alberti* (ex parte), l. c. p. 106, Taf. I. fig. 12, *Philippi*, Fauna d. unt. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde., Württ. 1898, p. 167, Taf. VI. fig. 8 inclus.]. — *Zeller*, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle etc. Zentralbl. f. Min. 1907, p. 44. — *Langenhan*, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 11. — *Zeller*, Lettenkohle u. Keuper i. Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 90. — *Rübenstrunk*, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 186, Taf. VII. fig. 16—18 [M. curvirostris *Bronn*, Leth. geogn. II. 1837, p. 171, Taf. XI. fig. 6c (caet. exclus.), *Lyrodon curvirostris* *Goldschmid*, Petref. Germ. II. 1838, Taf. CXXXV. fig. 15c, d (caet. exclus.), M. vulgaris v. *Alberti*, l. c. Taf. I. fig. 12, *Philippi*, l. c. Taf. VI. fig. 8 inclus.]. — *Wurm*, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 94, Taf. VI. fig. 1—3. — *Assmann*, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 621. — *Paulcke*, Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 213.

Deutschland, Ob. Muschelkalk, Keuper. — Aragonien, Muschelkalk. — Schweiz, Röthidolomit.

M. intermedia (*Schaueroth*) var. *crassa* *Wurm*, l. c. p. 96, Taf. VI. fig. 4.

Spanien (Aragonie), Muschelkalk.

M. isosceles *Stoppani* (1863), *Dumontier* (1864) vide *Schizodus isosceles*.

M. Kefersteini *Graf zu Münnster*, in *Kefersteins „Deutschland“* VI. 1828, p. 254 (Trigonia). — *Goldschmid*, Petref. Germ. II. 1838, p. 199, Taf. CXXXVI. fig 2 (Lyrodon). — *Curioni*, Sulla successione normale dei diversi membri del terreno triassico della Lombardia, Giorn. Ist. Lomb. Milano, VII. 1855, p. 226, Tav. II. fig. 15 (Trigonia). — v. *Hauer*, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 550, Taf. IV. fig. 1—6 [*Cryptina Raibiana* *Boué*, Aperçus. la constitution géol. d. prov. Illyriennes, Mém. Soc.

- géol. France II/1, 1835, p. 47, Pl. IV. fig. 8, M. Raibiana Brönn, Leth. geogn. II/3, 1850, p. 75, Merian, in Escher, Geol. Beobacht. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, p. 96, 100, 105, Lyrodon Okeni Eichwald, Naturhist. Bemerk. etc. II. Méni. Soc. Natur. Moscou, IX. 1851, p. 126, Pl. I. fig. 6 inclus.]. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 115, Tav. X. fig. 4—6. — Frech, Üb. Myophoria u. Meeyndon, Zeitschr. D. G. G. XLI, 1889, p. 134, Taf. XI. fig. 8. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII 1890, p. 37, Tav. III. fig. 2, 3. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 179. — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 89, Tav. IX. fig. 7—13. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 214, Taf. XXVII. fig. 34—36. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XL. fig. 3. — Waagen, Lam. d. Frombachtuffe, Verh. G. R. A. 1906, p. 388. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 49, Taf. XXX. fig. 6—16, XXXI. fig. 1—13 [var. multiradiata Taf. XXXI. fig. 6, 8, var. formalis, Taf. XXX. fig. 13, XXXI. fig. 3, var. Okeni Eichwald, Taf. XXX. fig. 14—16, var. tenuis, var. nuda, Taf. XXXI. fig. 7, var. perversa, Taf. XXXI. fig. 11 (syn. e. var. Gornensis Deecke, Beitr. z. Kenntn. d. Raibl. Schichten d. lomb. Alpen, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. II. 1885, p. 474), var. lombardica (Typ. M. Kefersteini Parona, l. c. Tav. X. fig. 5) inclus.]. — Südalpen, Karnisch.
- M.** Kefersteini (Mstr.) an Sandbergeri (Stur)? Weigelin, M. Kefersteini aus d. Gipskeuper v. Sindelfingen, Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde Würt. LXIX. 1913, p. 257, Taf. VI. fig. 1—9. — Würtemberg, Gipskeuper.
- M.** Kefersteini (Mstr.) var. turgida Compteur, Der mittl. Keuper d. Umgeb. v. Apolda, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, LXXVII. 1904, p. 99, Textfig. 3. — Norddeutschland, Mittelkeuper.
- M. cf.** Kefersteini (Mstr.) Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleont. XVI. 1910, p. 29, Tav. I. fig. 33. — Apennin, Rhaetisch.
- M. cf.** Kefersteini (Mstr.) var. multiradiata (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 102, Pl. XIII. fig. 5—9. — Himalaya, Karnisch.
- M. sp. ind. aff.** Kefersteini (Mstr.) Compteur, Der mittl. Keuper d. Umgeb. v. Apolda, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, LXXVII. 1904, p. 98, Textfig. 2. — Norddeutschland, Keuper.
- M.** Kokeni Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 101, Taf. XI. fig. 22, 23 [Nom. nov. pr. M. Whateleyae v. Woehrmann et Koken (non v. Buch), Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 183]. — Broili, Fauna d. Pachycardienstufte etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 216, Taf. XXVII. fig. 19, 20. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 77. — Südalpen, Karnisch.
- M.** Kreitneri v. Loeszy, Wiss. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Szechenyi i. Ostasien, III. 1899, p. 156, Taf. IX. fig. 25, 26. — Yunnan (Südehina), Karnisch.
- M.** ladina Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 38, Taf. IV. fig. 3. — Südalpen, Karnisch.
- M.** laevigata v. Ziethen, Verst. Württembergs, 1830, p. 94, Taf. LXXI. fig. 2, 6 (Trigonia). — v. Alberti, Trias, 1834, p. 87, 94, 130. — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 197, Taf. CXXXV. fig. 12 (Lyrledon). — v. Grünewaldt, Verst. d. schles. Zechsteingeb. Zeitschr. D. G. G. III. 1851, p. 249, Taf. X. fig. 3. — Giebel, Verst. im Muschelkalk v. Lieskau,

1856, p. 40, Taf. III. fig. 1, 9, 10 (Neoschizodus). — v. Schauert, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 322. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 115. — Schmid, Üb. d. unt. Keuper d. östl. Thüringens, Abhandl. Geol. Spezialkste. v. Preußen, I/2, 1874, p. 63. — Lepsius, Das westl. Südtirol, 1878, p. 356. — Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 798, Taf. LXII. fig. 31 (Trigonia). — Frech, Üb. Myophoria u. Mecynodon, Zeitschr. D. G. G. XLI. 1889, p. 134, Taf. XI. fig. 3, Textfig. — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 165, Taf. V. fig. 42 [M. bicarinata Stoppiani, Pal. Lomb. I. Pétr. d'Esino, 1859, p. 86, Pl. XVII. fig. 10—14 inclus.]. — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 60. — Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. vom Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkd. Würt. 1898, p. 165, Taf. VI. fig. 1, 6, 7, (var. clargata, Taf. VI. fig. 3, var. rotunda, Taf. VI. fig. 4, var. ovalis, Taf. VI. fig. 5. inclus.). — Bittner, Beitr. Pal. triad. Ablag. zentralas. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 709, Taf. XIV. fig. 22—26. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes. Pal. Bal. I/1, 1901, p. 82, 86, Taf. IX. fig. 1, 2. — Frech, Neue Zweischaler etc. d. Bakonyer Trias, ibidem, 1904, p. 7, Textfig. 3. — Frech, Nachtr. z. Ceph. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, ibidem, 1905, p. 9, Textfig. 12. — Walther. Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsdst. u. Muschelk. etc. 1906, Taf. VI. fig. 36. — Langengagan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 43. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 38, Taf. VII. fig. 4. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Boil. Bd. XXV. 1908, p. 89. — v. Wittensburg, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. d. Werfener Schichten Südtirols, Zentralbl. f. Min. 1908, p. 77, Textfig. 10. — v. Wittensburg, Werfener Schichten Südtirols, Kokens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 34 (282), Taf. V (XL) fig. 3, 11, 12. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 124, Taf. VI. fig. 5—9. — Mansuy, Missien Zeil dans le Laos etc. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 44. — Mansuy, Contrib. à la géol. du Tonkin, ibidem, p. 57, Pl. X. fig. 5. — Hohenstein, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII. 1913, p. 56 (228), Taf. II. fig. 3, 4. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 618, Taf. XXXIV. fig. 13, 14.

Non M. laevigata Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 122, Tav. X. fig. 7 [= ? Myophoricardium lineatum v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 665].

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit. —

Südalpen, Skythisch bis Ladinisch. —

Bakony, Skythisch. — Bokhara, Skythisch.

— Laos, Mitteltrias. — Tonkin, Obertrias.

M. laevigata (Zieh.) var. **Bronni Dunker**, Über d. im Kasseler Muschelkalk gef. Mollusken, Programm Gewerbeschule Kassel, 1848/49, p. 14. — Frech, Üb. Mecynodon u. Myophoria, l. c. p. 134, Taf. XI. fig. 3. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, l. c. p. 135, Taf. VI. fig. 12 [Trigonia laevigata v. Ziehen, 1830, l. c. Taf. LXXI. fig. 6 inclus.].

Deutschland, Muschelkalk.

M. laevigata (Zieh.) var. **elargata** Philippi, l. c. Taf. VI. fig. 4. — Rübenstrunk, l. c. p. 136, Taf. VI. fig. 13.

Süddeutschland, Trigonodusdolomit.

M. laevigata (Zieh.) var. **elongata** Philippi (non Giebel) l. c. Taf. VI. fig. 2. — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, l. c. p. 59, Tav. III. fig. 20. — Philipp, Pal. Unters-

- Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 53, Taf. II. fig. 4. — Rübenstrunk, l. c. p. 134, Taf. VI. fig. 11.
Deutschland, Röth bis Trigonodusdolomit. — Südalpen, Skythisch.
- M. laevigata** (Zieeth.) var. *ovalis* Philipp, l. c. Taf. VI. fig. 5. — Rübenstrunk, l. c. p. 136, Taf. VI. fig. 14.
Süddeutschland, Trigonodusdolomit.
- M. laevigata** (Zieeth.) var. *ovata* Philipp, l. c. 1904, p. 53, Taf. II. fig. 3.
Südalpen, Skythisch.
- M. laevigata** (Zieeth.) var. *rotunda* Philipp, l. c. 1898, p. 165, Taf. VI. fig. 4. — Rübenstrunk, l. c. p. 136, Taf. VI. fig. 15.
Süddeutschland, Trigonodusdolomit.
- M. laevigata** (Zieeth.) var. *transiens* Rübenstrunk, l. c. p. 133, Taf. VI. fig. 10.
Süddeutschland, Muschelkalk.
- M. cf. laevigata** (Zieeth.) Bittner, Verst. d. Süd-Ussurigebl. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 20, Taf. III. fig. 17—26. — v. Loezy, Wissenschaftl. Ergebni. d. Reise d. Grafen B. Széchenyi in Ostasien, III. 1899, p. 150, Taf. IX. fig. 23, 24. — L. Wagen, Werfener Schichten i. d. Salt Range, Zentralbl. f. Min. 1900, p. 286.
Ussuribucht, Salt Range, Skythisch. — Yunnan, Karnisch?
- M. sp. ind. aff. laevigatae** (Zieeth.) Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 839 [Typ. *M. laevigata* Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 58, Tav. IV. fig. 9, 10]
Apennin, Rhaetisch.
- M. sp. ind. ex aff. laevigatae** (Zieeth.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 83, Pl. XI. fig. 6.
Himalaya, Anisisch.
- M. liasicia** Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta (Foss. Azzarola), 1861, p. 59, Pl. VII. fig. 9, 10 (non 6—8). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 173. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 69, Taf. IV. fig. 5. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, Nov. Déc. 1916, p. 183 (var. exaltata, p. 184, inclus.).
Non *M. liasicica* Stoppanni, l. c. Pl. VII. fig. 6—8 = *M. Emmrichi* Winkl., teste v. Dittmar, l. c. p. 173, = nov. sp. ind., teste Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. ser. Vol. II. No. 4, 1908, p. 45.
Nordalpen, Südalpen, Schweiz, Karpathen, Rhaetisch.
- M. lineata** Münster (1841), Laubé (1865), Frech (1889)
vide Myophoriopsis lineata.
- M. malayensis** Newton, On marine triass. Lam. Malay Peninsula, Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 134, Pl. XII. fig. 15.
Malacca, Obertrias.
- M. microasiatica** Bittner, Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XL. 1891, p. 114, Taf. II. fig. 6, Textfig.
Anatolien, Norisch.
- M. Middlemissii** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser., V/1, 1913, p. 104, Pl. XIII. fig. 10—12.
Himalaya, Karnisch.
- M. Misani** Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 44, Taf. IV. fig. 14, 15. — v. Woermann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 665.
Südalpen, Karnisch.
- M. modiolina** Dunker, Über d. im Kasseler Muschelkalk gef. Moll. Progr. Gewerbeschule Kassel, 1849, p. 15 = *Myoconcha gastrochaena*, teste v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 130.
- M. multiradiata** Emmrich (1853) vide Cardita multiradiata.
- M. mutica** Richter, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 451, Taf. VII. fig. 7, 8 = sp. non val., teste Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 159.

- M. Napengensis** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 37, Pl. VI. fig. 1—29. — Mansuy, Mission Zeil dans le Laos, Mem. Serv. geol. Indochine, I/4, 1912, p. 51, Pl. IX. fig. 16. Burma, Laos (Indochina), Rhaetisch.
- M. cf. Napengensis** (Healey) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. Geol. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 248, Taf. XVII. fig. 12. Sumatra, Norisch.
- M. Nathorsti** Böhm, Obertrias. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 41, Taf. V. fig. 1—3, 7—9, 17, 20, 21, 27. Bäreninsel, Karnisch.
- M. nuggetensis** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 210, Pl. XXII. fig. 10. Neuseeland, Karnisch.
- M. omanica** Dientner, Note on some fossils from the sedimentary rocks of Oman, Rec. Geol. Surv. India, XXXVI. 1908, p. 156, Pl. XXIV. fig. 1—3. Oman (Arabia), Karnisch.
- M. orbicularis** Bronn, Lethaea geogn. II. 1837, p. 174, Taf. XIII. fig. 11 [ill. prim. in v. Schlotheim, Nachtr. z. Petrefaktenkunde, 1823, Taf. XXXIII. fig. 7, 8, XXXIV. fig. 4]. — Bronn, ibidem, III/3, 1856, p. 72, Taf. XIII. fig. 11. — Berger, Verst. d. Schaumkalkes am Thüringerwald, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 196. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 618, Taf. I. fig. 14 [Lucina plebeia Giebel, Verst. v. Lieskau, 1856, p. 49, Taf. III. fig. 4 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 118, Taf. IV. fig. 2. — Richter, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 454, Taf. VII. fig. 13—20. — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 12. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. u. Muschelk. etc. 1906, p. 30, Taf. VI. fig. 37. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 42, 46—48, 51. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 145, Taf. VII. fig. 1, 2 (abnorm.) [M. exigua Berger, l. c. 1860, p. 199, Taf. II. fig. 8—10, M. plebeia Richter, l. c. p. 453, Taf. VII. fig. 12—14 inclus.]. — Tornquist, Außeralpine Trias auf d. Balearen, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVI. 1909, p. 908. — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 97, Taf. VI. fig. 5. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/3, Heft 3, p. 619, Taf. XXXIV. fig. 17—19. Deutschland, Aragonien, Muschelkalk. — Balearen, Buntsandstein.
- M. orbicularis** (Br.) var. **gibba** Richter, l. c. p. 453, Taf. VII. fig. 9—11 (M. gibba). — v. Eck, Rüdersdorf, Abhandl. z. Geol. Spezialte. p. Preußen I/1, 1872, p. 89. — Walther, Zwölf Taf. etc. 1906, p. 30, Taf. VI. fig. 37. — Rübenstrunk, l. c. p. 154, Taf. VII. fig. 4. Deutschland, Muschelkalk.
- M. orbicularis** (Br.) var. **ovataesimilis** Rübenstrunk, l. c. p. 153, Taf. VII. fig. 3 [Lyriodon orbiculare Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 196, Taf. CXXXV. fig. 10 inclus.]. Deutschland, Muschelkalk.
- M. cf. orbicularis** (Br.) Benecke, Über ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. 1868, p. 42, Taf. IV. fig. 14. Südalpen, Anisisch.
- M. ornata** Gerafz zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 88, Taf. VIII. fig. 21. — Orbigny, Prodrome, I. 1849 p. 198. — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 56, Taf. XVII. fig. 2. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 93, Taf. XII. fig. 20—22 [Cardita elegans v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 255, Taf. XVI. fig. 21 inclus.]. —

Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 214, Taf. XXVII. fig. 16—18. — W a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 75, Taf. XXXIII. fig. 17 [var. postera, fig. 18, inclus.].
Südalpen, Karnisch.

M. ornata N e w t o n (1900) non M s t r. vide M. sp. ind. aff. ornatae.
M. sp. ind. ex aff. ornatae (M s t r.) B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 94, Taf. XII. fig. 23.
Südalpen, Karnisch.

M. sp. ind. aff. ornatae (M s t r.) Newton, On marine triassic Lam. Malay Peninsula, Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 134, Pl. XII. fig. 12—14 (M. ornata).
Malacca, Obertrias.

M. etamitensis T r e c h m a n n , Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 210, Pl. XXII. fig. 8.
Neuseeland, Karnisch.

M. ovata Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 197, Taf. CXXXXV. fig. 11. — G i e b e l , Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 42, Taf. IV. fig. 6a (Neoschizodus). — B r o n n , Leth. geogn. III/3, 1856, p. 72, Taf. XIII. fig. 10 (male!). — v. S e e b a c h , Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 617. — v. A l b e r t i , Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 118. — B e n e c k e , Üb. ein. Muschelkalk-Ablagerungen d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 12, Taf. I. fig. 4. — L e p s i u s , Das westl. Südtirol, 1878, p. 355, Taf. I. fig. 7. — T o m m a s i , Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 58, Tav. III. fig. 19. — B i t t n e r , Beitr. z. Pal. triad. Ablag. zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 708, Taf. XIV. fig. 20, 21 [Trigonia orbicularis? v. H a u e r , Üb. d. von Bergr. F u e h s i . d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850, p. 8, Taf. IV. fig. 2 inclus.]. — B i t t n e r , Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 82. — F r e e h , Nachtr. z. Cephal. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, ibidem, 1905, p. 8, Textfig. 10, 11. — W a l t h e r , Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 29, Taf. VI. fig. 34. — L a n g e n h a n , Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 40, 44, 50. — R ü b e n s t r u n k , Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 137, Taf. VI. fig. 16. — v. W i t t e n b u r g , Untertriad. Aufsamml. an d. Tepliaia, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1911, p. 1084. — A s s m a n n , Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 619, Taf. XXXIV. fig. 16.

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit. — Südalpen, Bakony, Sibirien (Gouv. Jenisseisk), Bokhara, Skythisch.

M. ovata (G d f.) var. elongata' G i e b e l , Lieskau, l. c. 1856, p. 42, Taf. V. fig. 3. (Necschizodus elongatus). — v. S e e b a c h , l. c. p. 616, Taf. I. fig. 13 (M. elongata). — W a l t h e r , l. c. 1906, p. 29, Taf. VI. fig. 35. — L a n g e n h a n , l. c. Taf. IX. fig. 49. — R ü b e n s t r u n k , l. c. p. 144, Taf. VI. fig. 19.
Deutschland, Röth, Muschelkalk.

M. ovata (G d f.) var. orbicularis similis R ü b e n s t r u n k , l. c. p. 144, Taf. VI. fig. 18 [M. ovata v. S c h a u r o t h , Krit. Verz. d. Verst. d. Trias int. Vicent., Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859. Taf. II. fig. 15 inclus.].
Norddeutschland, Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

M. ovata (G d f.) var. trigona v. Z i e t h e n , Verst. Würtemberg, 1830, p. 94. Taf. LXI. fig. 4 (Mactra). — R ü b e n s t r u n k , l. c. p. 143, Taf. VI. fig. 17 [Necschizodus ovatus G i e b e l , Lieskau, 1856, p. 42, Taf. VI. fig. 6, R i c h t e r , Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 454 inclus.].
Deutschland, Muschelkalk.

M. sp. ind. aff. ovatae (G d f.) B i t t n e r , Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. III/2, 1899, Trias Brach. a. Lam. 1899, p. 67, Pl. I. fig. 25—29.
Himalaya, Skythisch?

M. pes anseris v. **Schlothheim**, Petrefaktenkunde, 1820, p. 191, Nachtr. 1823, p. 112, Taf. XXXVI, fig. 4 (Trigonellites). — **Bronn**, Leth. geogn. II. 1837, p. 172, Taf. XI, fig. 8, III/3, 1856, Taf. XI, fig. 8. — **Goldsfuss**, Petref. Germ. II. 1838, p. 199, Taf. CXXXVI, fig. 1 (Lyrodon). — v. **Strombeck**, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkbild. im NW. Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 596. — v. **Strombeck**, Üb. d. Vorkommen v. M. pes anseris, ibidem, X. 1858, p. 84. — **Roth**, ibidem, XI. 1859, p. 4. — v. **Strombeck**, Über d. Triassschichten etc. auf d. Schafweide bei Lüneburg, ibidem, XII. 1860, p. 381. — v. **Seebach**, Conchylienf. d. Weimar. Trias, ibidem, XIII. 1861, p. 610. — v. **Alberti**, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 109. — v. **Sandberger**, Beobacht. i. d. Würzburger Trias, Würzburger Naturwiss. Zeitschr. V. 1864, p. 219. — v. **Sandberger**, Gliederung d. Würzburger Trias, ibidem VI. 1867, p. 174, 178. — v. **Eek**, Rüdersdorf, Abhandl. Geol. Spezialk. v. Preußen, I/1, 1872, p. 121, 123. — **Quenstedt**, Handb. d. Petrefaktenkde. 3. Aufl. 1885, p. 798, Textfig. 289 (Trigonia). — v. **Linstow**, Organ. Reste d. Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. 1903, p. 139. — **Philippi**, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, p. 50, Textfig. — **Langenhahn**, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX, fig. 27, XXV. fig. 30. — **Grupe**, Der unt. Keuper im südl. Hannover, A. v. Koenen - Festschr. 1907, p. 112. — **Rübenstrunk**, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 202, Taf. VII, fig. 20, 21, VIII, fig. 1.

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

M. pes anseris (**Schloth.**) var. **keuperina** **Compteur**, Der mittlere Keuper d. Umgeb. v. Apolda, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, LXXVII. 1904, p. 99, Textfig. 4—7.

Norddeutschland, Unterkeuper.

M. pieta **Lepsius**, Das westl. Südtirol, 1878, p. 357, Taf. I, fig. 10. — **Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 116. Südalpen, Hauptdolomit, Rhaetisch.

M. cf. pieta (**Lepsius**) **Tommasi**, Revis. fauna dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 104, Taf. XVII, fig. 5, 6. Südalpen, Hauptdolomit.

M. (?) plana v. **Wohrmann et Koken**, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 183, Taf. VIII, fig. 4. Südalpen, Karnisch.

M. plebeia **Richter** (1869) vide **M. orbicularis**.

M. pleurophorooides **Berger**, Verst. d. Schaumkalkes am Thüringer Wald, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 200, Taf. II, fig. 11—15 = **Cypocardia Escheri Giebel**, teste v. **Seebach**, Zur Kritik d. Gattg. Myophoria etc. Nachr. kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen 1867.

M. postera **Moore**, On the zone of the Lower Lias and the Av. contorta-zone, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, Pl. XVI, fig. 8, 9 = **M. nov. sp. ind.**, teste **Benecke**, **M. inflata** int schwäb. Rhaet. Neues Jahrb. f. Min. 1900, I, p. 219 (= ? Trigonia sp. innom. **Quenstedt**, Der Jura, 1857, Taf. I, fig. 4, 5) = **M. Emmrichi** **Winkl.**, teste v. **Dittmar**, Contortazone, 1864, p. 172. — fig. 10 = **M. inflata** **Emmr.**, teste **Goebel**, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 182. — **Pflücker** (1868), **Oester** (1869), **Vaughan** (1904), **Langenhahn**, **Rübenstrunk** (1909) vide **M. inflata**, **Lyett** (1879) vide **M. Emmrichi**.

M. praeorbicularis **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 86, Taf. IX, fig. 3—9. — **Frech**, Nachr. zu Cephal. u. Zweischaltern d. Bakonyer Trias, ibidem, 1905, p. 4, Textfig. 4. — **Frech**, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 39. Bakony, Skythisch.

M. proharpax **Frech**, Neue Zweischalter etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 17, Textfig. 17. Bakony, Anisisch.

M. prolixa *Tommasi*, Revis. fauna dol. prine. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 105, Tav. XVII. fig. 7.

Südalpen, Hauptdolomit.

M. radiata v. *Loezy*, Wissenschaftl. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Széchenyi i. Ostasien, III. 1899, p. 155, Taf. IX. fig. 21, 22. — *Mansuy*, Etude géol. du Yunnan orient. Paléontol. Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 121, Pl. XXII. fig. 2. — *Mansuy* Contrib. à la géol. du Tonkin, Paléontol. ibidem, I/4, 1912, p. 56, 70, Pl. X. fig. 4.

Yunnan, Tonkin, Karnisch?

M. Raibliana *Boué* (1835), *Bronn* (1850) vide *M. Kefersteini*.

M. reducta *Koken*, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 36, Taf. IV. fig. 7. Südalpen, Karnisch.

M. Reziae *Stoppani*, Pal. Lomb III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 129, Pl. XXX. fig. 5. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 173 (Schizodus), — *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 229 (Schizodus). — *Lepsius*, Das westl. Südtirol, 1878, p. 364. Südalpen, Ruacitisch.

M. sp. ind. aff. Reziae (*Stoppani*) *Goetel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 185. Karpathen, Rhaetisch.

M. Richthofeni *Stur* (1868) vide *Myophoriopsis Richthofeni*.

M. rotunda v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 117, Taf. II. fig. 7. — *Rübenstrunk*, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 157.

Non *M. rotunda* *Richter*, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 452 (= *M. vulgaris*). Süddeutschland, Ob. Muschelkalk, Trigonodus dol.

M. Sandbergeri *Stur*, Beitr. z. Kenntn. d. geol. Verhältn. d. Umgeb. v. Raibl, Jahrb. G. R. A. XVIII. 1868, p. 117 [Typ. *M. Kefersteini Sandberger* (non *M. str.*), Die Stellung d. Raibler Schichten i. fränkischen u. schwäb. Keuper, Neues Jahrb. f. Min. 1866, p. 34]. — *Comptier*, Der mittl. Keuper i. d. Umgeb. v. Apolda, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, LXXVII. 1904, p. 98. — *Waagen*, Lam. d. Frontbachtuffe, Verh. G. R. A. 1906, p. 389. — *Waagen*, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abh. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 72. — *Zeller*, Lettenkohle u. Keuper i. Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. XXV. 1908, p. 93.

Deutschland, Gipskeuper.

M. Schmidtii *Weigelin*, *M. Kefersteini* aus d. Bleiglanzbank d. Gipskeupers etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1913, p. 263, Taf. VI. fig. 10—12. — *Hohenstein*, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII. 1913, p. 230 (58).

Süddeutschland, Ob. Muschelkalk

M. simplex v. *Schlotheim*, Petrefaktenkde., 1820, p. 192, (Trigonellites). — *Goldfuss*, Petref. Germ. II. 1838, p. 197 Taf. CXXXV. fig. 14a (non b = *M. vulgaris*). — v. *Stronbeck*, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes im NW. Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 133 (Trigonia). — v. *Seebach* Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 614, Taf. XIV. fig. 12. — v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 107. — *Richter*, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 434. — v. *Linstow*, Organ. Reste d. Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1903, p. 129, 152, Taf. XII. fig. 14, 15. — *Rübenstrunk*, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 179, Taf. VII. fig. 11—13 [Lyrodon vulgaris Goldfuss, l. c. Taf. CXXXV. fig. 16d, e (caet. exclus.) inclus.]. — *Assmann*, Brach. u. Lam. d. ober schles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI, Heft 3, p. 622.

Non *M. simplex* v. *Schauroth* (1855) [= *M. vulgaris*.] Deutschland, Muschelkalk, Unterkeuper.

- M. cf. simplex** (Schloeth.) Philipp, Pal. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI, 1904, p. 54, Taf. II. fig. 5. Südalpen, Skythisch.
- M. (?) solitaria** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII /, 1895, p. 117, Taf. XXIV. fig. 27. Südalpen, Karnisch.
- M. (an Schizodus?)** Stenonis Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 129, Pl. XXX. fig. 6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 174 (Schizodus). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 229 (Schizodus). — De Stefanii, Rhaet. Foss. d. Apuanischen Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 101 (Meiocardia). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 186, Taf. IX. fig. 6. Südalpen, Karpathen, Apennin, Rhaetisch.
- M. Struckmanni** v. Strombeck, Üb. d. Vorkommen von M. pes anseris etc. Zeitschr. D. G. G. X. 1858, p. 85. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, ibidem, XIII. 1861, p. 612. — Schmidt, Unt. Keuper d. östl. Thüringens, Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, I/2, 1874, p. 62, Textfig. 11. — v. Linstow, Organ. Reste d. Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1903, p. 153, Taf. XII. fig. 8, 9. — Gruppe, Der untere Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschrift, 1907, p. 113, Taf. IV. fig. 1, 2. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 234, Taf. VII. fig. 19. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 9, 10. Deutschland, Lettenkohle.
- M. subvestita** Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 58, Taf. IV. fig. 1—5. — Jaworski, Nuculamergel v. Misol, Palaeontol. v. Tintor, II/5, 1915, p. 112, Taf. XLIV. fig. 20, 21. Indonesien, Norisch.
- M. Szechenyi** v. Loezy, Wissenschaftl. Ergebni. d. Reise d. Grafen B. Szechenyi i. Ostasien, III. 1899, p. 153, Taf. IX. fig. 14—19. Yunnan (China), Karnisch.
- M. Tennei** Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 42, Taf. IV. fig. 23, 26, 28, 30. Bäreninsel, Karnisch.
- M. tenuis** Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 42, Pl. VII. fig. 1—3. Burma, Rhaetisch.
- M. (?) Tommasii** Marianii (1908) vide Hoferia Tommasii.
- M. transversa** Bornemann, Organ. Reste d. Lettenkohlengruppe Thüringens, 1856, p. 11, Taf. I. fig. 1, 2 (Trigonia). — v. Schäuroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 126, Taf. VII. fig. 2. — Picard, Über d. Keuper bei Schlotheim etc. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, XI. 1858, p. 432, Taf. IX. fig. 7 (M. bicostata). — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 611. — v. Alberti, Überblick üb. d. Trias, 1864, p. 109. — v. Seebach, Zur Kritik d. Gattg. Myophoria etc. Nachr. kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen, 1867, p. 381. — v. Eck, Rüdersdorf etc. Abh. z. geol. Spezialkte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 88. — Wagner, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes bei Jena, ibidem, N. F. XXVII. 1897, p. 76, 80. — v. Linstow, Organ. Reste d. Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1903, p. 145. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 7. — Zeller, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle etc. Zentralbl. f. Min. 1907, p. 44. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 112. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 182, Taf. VII. fig. 15 [Lyrodon vulgaris Goldfuss, Petref. Germi. II. 1838, Taf. CXXXV. fig. 16c (caet. exclus.) inclus.]. — Hohenstein, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII. 1913, p. 231 (59), Taf. XIII (II), fig. 6. — Assmann, Brach. u. Lam.

- d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 621, Taf. XXXIV. fig. 20. (*M. vulgaris* var. *transversa*). — Deutschland, Röth bis Unterkeuper.
- M. transversa* (Bornem.) var. *acuteostata* Zeller**, Keuper u. Lettenkohle in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 91 [Typ. *Lyrodon vulgaris* Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 198, Taf. CXXXV. fig. 16c, Bornemann, l. c. p. 11, Taf. I. fig. 1, 2].
- Deutschland, Lettenkohle.
- M. transversa* (Bornem.) var. *dolomitica* Zeller**, l. c. p. 91, Taf. II. fig. 2.
- Süddeutschland, Lettenkohle.
- M. transversa* (Bornem.) var. *finalis* Zeller**, l. c. p. 92, Taf. I. fig. 3 [Typ. *M. transversa* v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohle, l. c. p. 126, Taf. VII. fig. 2].
- Süddeutschland, Grenzdolomit.
- M. transversa* (Bornem.) var. *subkeuperina* Zeller**, l. c. p. 92 (deest imago!).
- Süddeutschland, Bunter Keuper.
- M. transversa* (Bornem.) var. cf. *Struckmanni* (Strub.) Zeller**, l. c. p. 91.
- Süddeutschland, Lettenkohle.
- M. trigonoides* Berger**, Verst. d. Schaumkalkes am Thüringer Wald, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 192, Taf. II. fig. 1—5 = *M. laevigata*, teste Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 159.
- M. Urd* Böhm**, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 43, Taf. V. fig. 28, 29, 31, 32 (?), Textfig. 8.
- Bäreninsel, Karnisch.
- M. Verbeeki* Böttger**, Tertiärform. v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. III. 1880, p. 43, Taf. II. fig. 4 (Pholadonya). — Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, ibidem, Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 249, Taf. XVII. fig. 8—11 [*Trigonia dubia* Böttger, l. c. p. 47, Taf. III. fig. 1—3 inclus.].
- Sumatra, Norisch.
- M. vestita* v. *Alberti***, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 113, Taf. II. fig. 6. — Kilian, Mission d' Andalousie, II. Etudes paléontol. Méni. Acad. sci. Inst. de France, Paris, XXX. 1889, p. 603. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 103, Taf. XII. fig. 14 [*Lyrcodon Goldfussi* v. Eichwald, Naturhist. Bem. etc. 1851, p. 127, Taf. I. fig. 7 inclus.]. — Di Stefano, Lo schisto marnoso d. Punta delle Pietre Nere, Boll. Com. geol. Ital. XXVI. 1895, p. 26, Tav. I. fig. 10—19. — Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 218, Tav. VIII. fig. 12. — Czechia-Rispoli, Nuove osservazioni s. fauna trias. d. Punta delle Pietre Nere Boll. Soc. geol. Ital. XX. 1901, p. 139. — Zeller, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle etc. Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXX. 1908, p. 87. — Scalia, Fauna trias. sup. di Mte. Judica, Boll. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, Maggio 1908, p. 21. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVII. Napoli, 1908, p. 58, Tav. I. fig. 18. — Tornquist, Außeralpine Trias auf d. Balearen, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVI. 1908, p. 917. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 221, Taf. VIII. fig. 10—12. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 297, Tav. IX. fig. 16—18. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 36, Taf. IV. fig. 16. — Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Trias v. Catalcnien, Zeitschr. D. G. G. LXXI. 1919, Monatsber. p. 157.
- Deutschland, Keuper. — Südalpen, Apennin (Salerno), Sizilien, Apulien, Karnisch. — Andalusien, Catalonia, Obertrias.
- M. cf. vestita* (Alb.) Wurm**, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 98. Taf. VI. fig. 6.
- Aragonien, Muschelkalk.

- M. sp. ind. aff. vestitae** (A. l. b.) **Kilia n**, Mission d'Andalousie, Mém. Acad. sci. Paris, XXX. 1889, Pl. XXIV. fig. 1. — **Tornquist**, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, 1902, p. 816, 826 [M. Goldfussi. **Borne man n**, Boll. Com. geol. Ital. XII, 1881, p. 267, Tav. VI. fig. 1—6 inclus.]. Andalusien, Sardinien, Oberrias.
- M. Volzii** **F re e h**, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 48, Textfig. 70—72. Bakony, Hauptdolomit.
- M. vulgaris** v. **S ch l o t h e i m**, Petrefaktenkde. 1820, p. 192, Nachträge II, 1823, p. 112, Taf. XXXVI. fig. 5 (Trigonellites). — v. **Zie then**, Verst. Würtembergs, 1830, p. 87, Taf. LVIII. fig. 2 (Trigonellites). — **Bronn**, Léth. geogn. II. 1837, p. 170, Taf. XI. fig. 6. — **Goldfuss**, Petref. Germ. II. 1838, p. 196, Taf. CXXXV. fig. 16a, b (caet. exclus.) [Lyroden]. — **Catullo**, Mem. geogn. pal. Alpi Venete, 1848, p. 236, Tav. II. fig. 3 (M. curvirostris). — v. **Strombeck**, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes im NW. Deutschland, Zeitschr. D. G. G. I. 1849, p. 132, 151, 182, 209 (Trigonia). — v. **Schauroth**, Geogn. Verhältn. v. Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 514. — **Borne man n**, Verst. im span. Muschelkalk, Zeitschr. D. G. G. VIII. 1856, p. 165 (Trigonia). — **Bronn**, Leth. geogn. III/3, 1856, p. 67, Taf. XI. fig. 6. — v. **Schauroth**, Krit. Verz. d. Verst. im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 321 [M. simplex v. **Schauroth** l. c. 1855, p. 514, M. curvirostris Catullo, l. c. p. 52, Taf. II. fig. 3 inclus.]. — v. **Seebach**, Conchylienf. d. Weimar, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 612. — v. **Alberti**, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 106 [non Taf. I. fig. 12 = M. intermedia Schau roth]. — v. **Seebach**, Zur Kritik der Gattg. Myophoria etc. Nachr. kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen, 1867, p. 381. — **Ben ecke**, Üb. ein. Muschelkalk-Ablagerungen d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 42, Taf. III. fig. 6. — **Richter**, Myophorien d. thüring. Wellenkalkes, Zeitschr. D. G. G. XXI. 1869, p. 434, 439, 448. — v. **Eck**, Rüdersdorf etc. Abhandl. z. geol. Spezialkte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 57, 88, 114, 121. — **Pröscholdt**, Beitr. z. näh. Kenntn. d. unt. Muschelk. in Franken etc., 1879, p. 4, Taf. I. fig. 1—10. — **Tommasi**, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 110. — **Philippi**, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 7. — **Langenhahn**, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 29—33, 36. — **Walther**, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. etc. 1906, p. 30, Taf. VI. fig. 38. — **Zeller**, Beitr. z. Kenntn. d. Keupers etc. Zentralbl. f. Min. 1907, p. 44. — **Rübenstrunk**, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 171, Taf. VII. fig. 6—9. — **Hohenstein**, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 229 (57), Taf. XIII (II), fig. 1, 10. — **Assmann**, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 621, Taf. XXXIV. fig. 26.

Nec **M. vulgaris** v. **Alberti**, l. c. 1864, Taf. I. fig. 12, nec **Philippi**, Fauna d. Trigonodus dol. etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 167, Taf. VI. fig. 8 [= M. intermedia].

Deutschland, Röth bis Unterkeuper. — Südalpen, Anisisch.
— Spanien, Muschelkalk.

- M. vulgaris** (**Schloth.**) var. **cornuta** v. **Alberti**, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 108, Taf. II. fig. 1 (M. cornuta). — **Rübenstrunk**, l. c. p. 178, Taf. VII. fig. 10.

Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

- M. vulgaris** (**Schloth.**) var. **semigastata** **Hohenstein**, l. c. p. 230 (58) Taf. I (XIII), fig. 2, 9, 11.

Süddeutschland, Muschelkalk

- M. Whateleyae** v. **Buch**, Sur l'existence du Muschelkalk dans les Alpes de la Lombardie, Bull. Soc. géol. France, sér. 2, T. II. 1845, p. 348, Pl. IX. fig. 1—3 [Extr. in **Bronn** s. u. Leonhard's Jahrb. f. Min. 1845, p. 177]. — v. **Hauer**, Beitr. z.

Keuntn. d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 554, Taf. V. fig. 4—7 [non 8—10 = *M. inaequicostata Klipst.*] — *Parona*, Fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 119, Tav. X. fig. 1—3. — *Tommasi*, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, Anno VIII. 1890, p. 40 (ex parte). — v. *Woermann*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 665 (ex parte). — *Bittner*, Lant. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 100, Taf. XI. fig. 18—21. — v. *Arthaber*, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLI. fig. 5. — *Koken*, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 36, Taf. IV. fig. 5.

Nec *M. Whateleyae* v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 115, Taf. II. fig. 5 [= *M. Goldfussii Alb.*, teste *Bittner*, l. c. p. 103, *Philippi*, Fauna d. Trigonodusdol. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 209], nec *M. Whateleyae Woermann et Koken*, Fauna d. Raibl. Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 183 [= *M. Kokeni Bittn.*].

Südalpen, Karnisch.

M. sp. ind. aff. Whateleyae (Buech) Fiedler, Verst. aus d. Arlberg-schichten bei Bludenz, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, Briefl. Mitt. p. 9.

Nordalpen, Karnisch.

M. sp. ind. ex aff. Whateleyae (Buech) Deneer, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 105, Pl. XIII. fig. 13, 14. Himalaya, Karnisch.

M. Woermannii Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 106, Taf. XII. fig. 9—13. Nom. nov. pr. *Gruenewaldtia decussata* v. *Woermannii*, Fauna d. sog. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 216, Taf. IX. fig. 4—6. — *Bittner*, Lani. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 16, Taf. VII. fig. 3. — *Gortani*, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 88, Tav. IX. fig. 6.

Nordalpen, Südalpen, Bakony, Karnisch.

M. Woermannii (Bittn.) var. levicineta Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 33, Tav. III. fig. 14, 15.

Südalpen, Karnisch.

M. nov. sp. ind. Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 118, Tav. X. fig. 9 = sp. inval., teste v. *Woermannii*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 665.

M. (?) sp. ind. Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 43, Tav. III. fig. 9. — v. *Woermannii*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 665 [= *Trigonodus minutus Woermann et Kock*]. — *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 117. [= *M. sp. ind. aff. solitariae Bittn.*]

Südalpen, Karnisch.

M. (?) sp. ind. Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 166, Taf. V. fig. 43 = *Lima* sp. ind. aff. *Telleri Bittn.*, teste *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 193, 194.

M. (?) sp. ind. Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III Pt. 2. 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 8, Pl. I. fig. 9, 10.

Himalaya, Skythisch.

M. sp. ind. Newton, On marine triass. Lam. Malay Peninsula, Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 134, Pl. XII. fig. 16.

Malacca, Obertrias.

M. sp. ind. v. Linストウ, Organ. Reste d. Trias v. Lüneburg, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1903, p. 155, Taf. XII. fig. 16.

Deutschland, Lettenkohle.

M. (?) sp. ind. Toulou, Kalke vom Jägerhause bei Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 110, Taf. VII. fig. 60.

Nordalpen, Karnisch.

Gen. **Myophoriopsis** v. Woehrmann.[*Astartopis* v. Woehrmann, Hohenstein].(Subgen. **Pseudocorbula** Philippi inclus.)

v. Woehrmann, Fauna d. sogen. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 221, — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 108 [*Astartopis* v. Woehrmann, l. c. p. 222 (Typ. *Myophoria Richthofeni Stur*, 1868) inclus.]. — Hohenstein, Mittl. Muschelk. etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 234 (62).

Typ. *Lyrodon lineatus* Goldfuss (1838).

M. **Bassanii** Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 98, Tav. II. fig. 26, 27.

Apennin (Salerno), Karnisch.

M. **carinata** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 111, Taf. XIII. fig. 7—9 [Nom. nov. pr. M. *lineata* v. Woehrmann, Fauna d. sog. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 221, Taf. IX. fig. 17—19. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 12, Taf. VII. fig. 5. — Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 394, Taf. XII. fig. 12.

Nordalpen, Südalpen, Bakony, Karnisch.

M. cf. **carinata** (Bittn.) Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 350.

Dinariden, Ladinisch?

M. **intermedia** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 13, Taf. VII. fig. 1, 2.

Bakony, Karnisch.

M. **Kittlii** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 114, Taf. XIII. fig. 11, 12.

Südalpen, Karnisch.

M. **Iatedorsata** Krumbeek, Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 250, Taf. XVII. fig. 28.

Sumatra, Norisch.

M. **lineata** Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 199, Taf. CXXXVI. fig. 4 (*Lyrodon*). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 88, Taf. VII. fig. 29 (*Lyrodon*). — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 193 (*Myophoria*). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 111. — Laubbe, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 59, Taf. XVIII. fig. 5 (*Myophoria*). — Frech, Mecynodon u. *Myophoria*, Zeitschr. D. G. G. XL. 1889, Taf. XI. fig. 9 (male!) [*Myophoria*]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 111, Taf. XIII. fig. 1—6.

Nec M. *lineata* v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 221, Taf. IX. fig. 17—19 [= M. *carinata* Bittn.], nec M. *lineata* Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. tech Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 45 [= *Astarte Woehrmanni*, teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, l. c. p. 669].

Südalpen, Karnisch.

M. **Moermannii** Krumbeek, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 250, Taf. XVI. fig. 18.

Sumatra, Norisch.

M. **Richthofeni** Stur, Jahrb. G. R. A. XVII. 1868, p. 539 (*Myophoria*). — v. Woehrmann, Fauna d. sog. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 223, Taf. IX. fig. 20, 22. (*Astartopis*). — v. Woehrmann et Kokken, Fauna d. Raibl. Schichten vom Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 189, Taf. VIII. fig. 1—3 (*Astartopis*). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1893, p. 668 (*Astartopis*) [*Opis gracilis Parona*, Studio monogr. fauna Raibl.

Lombardia, 1889, p. 134, Tav. XII, fig. 9 inclus.]. — *Tommasi*, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 52 (Astartopis). — *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 112, Taf. XIII, fig. 10. — *Broili*, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 217, Taf. XXVII, fig. 3—14. — *Wagen*, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 77.

Nordalpen, Südalpen, Karnisch.

- M. Rosthorni Boué.** Aperçu sur la constitution géol. des prov. Illyriennes, Mém. Soc. géol. France, II/1, Paris, 1835, p. 47, Pl. IV, fig. 7 (Corbula). — v. *Hauer*, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 544, Taf. II, fig. 13—15. (Corbula). — v. *Woehrmann*, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 220, Taf. IX, fig. 14—16 (Astarte) [Corbula obscura Schafhäutl (non Sow.) Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 384, Taf. XLV, fig. 13, Corbula cordiformis Schafhäutl, Der weiße Jura etc. Neues Jahrb. f. Min. 1865, p. 799, Taf. VI, fig. 11, 12 inclus.]. — *Tommasi*, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 50. — v. *Woehrmann*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 668. — *Bittner*, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 113, Taf. XIII, fig. 13—17. — v. *Arthaber*, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XL, fig. 10.

Nordalpen, Südalpen, Karnisch.

Subgen. **Pseudocorbula** Philippi.

Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 168. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen-Festschr. 1907, p. 115. — Hohenstein, Mittl. Muschelk. etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII. 1913, p. 237 (65). Typ. Corbula gregaria Münter (1838).

- P. gregaria** Graf zu Münster, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 152, Taf. CXXIV, fig. 12 (Nucula). — v. Schaueroth, Geogn. Verh. v. Recaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 515 (Nucula?). — v. Schaueroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform., Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 119, Taf. VI, fig. 17 (Corbula) [Corbula dubia (Münster) Goldfuss, l. c. p. 250. Taf. CLI, fig. 13, Nucula exilie Dunker, Üb. d. im Muschelk. Oberschlesiens gef. Moll. Palaeontograph. I. 1851, p. 314, Taf. XXVI, fig. 18 inclus.]. — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. im Vicentin. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 323 (Corbula). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias. 1864, p. 122 (Corbula). — **Philippi**, Fauna d. Trigonodusdol. etc. l. c. 1898, p. 168. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XI, fig. 12. — Rübenstrunk, Deutsche Trias-Myophorien, Mitt. Bad. Geol. L. A. VI. 1909, p. 158. — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 117, Taf. VI, fig. 25, 26. — Hohenstein, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, l. c. 1913, p. 66, Taf. II. (XIII), fig. 15, 16, III (XIV) fig. 1. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschl. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 626.

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle. — Aragonien, — Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

- P. sp. ind. (cf. gregaria Mstr.)** Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Trias v. Catalonien, Zeitschr. D. G. G. LXXI. 1919, Monatsber. p. 158. Catalonien (Hispania), Obertrias.

- P. gregaroides** Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 173, Taf. II, fig. 6.

Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

P. imerassata G r a f z u M ü n s t e r , in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, Taf. CXXIV. fig. 11 (Nucula). — v. Schauroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 122, Taf. VI. fig. 18 (Corbula). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 123 (Corbula) [C. dubia v. Seebach, Conchylief. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 629 inclus.]. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 116. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/I, Heft 3, p. 623, Taf. XXXV. fig. 4, 5.

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

P. Keuperina Q u e n s t e d t , Petrefakterkunde, 1851, Taf. XLIV. fig. 17 (Celas). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 121, Taf. II. fig. 8 (Corbula). — F r a s s , Über Semionotus etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. XVII. 1861, p. 99, Taf. I. fig. 24—27 (Corbula). — Bla n k e n h o r n , D. Trias am Nordrand d. Eifel, Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 102 (Corbula). — La n g e n h a n , Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXIV. fig. 2 (Corbula). — Z e l l e r , Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 95.

Deutschland, Lettenkohle bis Mittelkeuper.

P. nucleiformis Z e n k e r , Naturgesch. d. Urwelt, 1833, p. 227 (Cucullaea). — S c h m i d e t S c h e i d e n , Die geogn. Verhältn. Thüringens, 1846, Taf. X. fig. 3 (Cucullaea). — v. Schauroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 123, Taf. VI. fig. 19 (Corbula). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 123 (Corbula). — La n g e n h a n , Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXIV. fig. 3 (Corbula). — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. 1906, p. 32, Taf. VII. fig. 45. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 116. — H o h e n s t e i n , Beitr. z. Kenntn. d. mittl. Muschelk. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 65 (237), Taf. XIV (III), fig. 3—5. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/I, Heft 3, p. 623, Taf. XXXV. fig. 1—3.

Deutschland, Röth bis Lettenkohle.

P. perlonga Gruppe, Der unt. Keuper im sügl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 117, Taf. IV. fig. 4, 5. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/I, Heft 3, p. 625, Taf. XXXV. fig. 7—9.

Deutschland, Muschelkalk, Unterkeuper.

P. plana H o h e n s t e i n , Mittl. Muschelkalk am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. XII/2, 1913, p. 238 (66), Taf. II. (XIII), fig. 14.

Süddeutschland, Muschelkalk.

P. Sandbergeri Philipp (1898), Gruppe (1907), Hohenstein (1913) vide P. subundata.

P. Schmidii Pröscholdt, Beitr. z. Kenntn. d. unt. Muschelk. in Franken etc. 1879, p. 11, Taf. I. fig. 13 (Corbula).

Norddeutschland, Muschelkalk.

P. (?) similis Pröscholdt, Beitr. z. näh. Kenntn. d. unt. Muschelk. in Franken etc. 1879, p. 17, Taf. I. fig. 18 (Corbula).

Norddeutschland, Muschelkalk.

P. subundata v. Schauroth, Geogn. Verh. v. Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 516, Taf. II. fig. 7 (Tapes). — v. Schauroth, Krit. Verz. d. Triasverst. im Vicentin. ibidem, XXXIV. 1858, p. 328 (Tapes). — v. Eck, Über d. Form. d. bunt. Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 102 (Miyacites). — Philipp, Pal. Geol. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 51 (Anoplophora). — Philipp, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 16. — Tornquist, Außeralp. Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII.

1904, p. 1110. — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 117 (P. Sandbergeri). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Hef. 3, p. 624, Taf. XXXV, fig. 6 [P. Sandbergeri Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. LIV. 1898, p. 171, Taf. V. fig. 5, 7, 8, Hohenstein, Mittl. Muschelk. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 65 (237), Taf. XIII (II), fig. 17, XIV (III), fig. 2, 6—11 inclus.].

Südalpen, Skythisch, Anisisch. — Deutschland, Muschelkalk bis Grenzdolomit. — Sardinien, Muschelkalk.

Neoschizodus Giebel (1859) vide Myophoria.

N. curvirostris Giebel, (1856) vide Myophoria elegans.

N. elongatus Giebel (1856) vide Myophoria ovata var. elongata.

Gen. **Pachycardia** v. Hauer.

Beitr. z. Kenntn. d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien XXIV. 1857, p. 546. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 16. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. ibidem, XVIII/2, 1907, p. 149.

Typ. *P. rugosa* v. Hauer (1857).

P. alunulata Kitte, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 718, Taf. XXIII, fig. 18. Dinariden, Anisisch.

P. (?) dubiosa De Tonni, Fauna trias. di Valdepena, Mem. Ist. geol. Univers. Padova, II. 1913, p. 186, Tav. XV, fig. 1. Südalpen, Ladinisch.

P. Haueri (v. Mojsisovics) Parona (1889), v. Woehrmann et Koken (1892) vide *P. rugosa*.

P. Plieningeri Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 213, Taf. XXVI, fig. 18—20, XXVII, fig. 1. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 13, 14. Südalpen, Karnisch.

P. rugosa v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 546, Taf. II, fig. 1—10. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 211, Taf. XXV, fig. 27—29, XXVI, fig. 1—17 [P. Haueri (v. Mojsisovics in litt.) Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 128, Tav. XII, fig. 8, v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 187, Taf. VI, fig. 8—14, v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 667 inclus.]. — Waagen, Lam. d. Frombachtuffe Verh. G. R. A. 1906, p. 386. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 6, Taf. XXV, fig. 1—17 XXVI, fig. 1—11, XXXIII, fig. 1 [var. subanodonta, Taf. XXV, fig. 9, 14, 15 inclus.]

Non Cardita rugosa v. Klipstein (1843) [= *P. Zittelii*]. Südalpen, Karnisch.

P. Zittelii Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 15, Taf. I, fig. 26 [Cardita rugosa v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 254, Taf. XVI, fig. 19, Corbis rugosa Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 39 inclus.]. Südalpen, Karnisch.

P. cf. Zittelii (Bitt.) Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 348. Dinariden, Ladinisch.

Gen. **Pomarangina** Diener.

Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. V/3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, 1908, p. 64. — Diener, Zur system. Stellung d. Pelecy-podengattg. Pomarangina, Zentralbl. f. Min. 1915, p. 129 [non Poma-

rangina K r u m b e c k , Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind., Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 256 = Krumbeckia D i e n .] — K r u m b e c k , Zur syst. Stellung d. Pelecy-podengattg. Pomarangina, ibidem, p. 419.

Typ. P. Haydeni D i e n e r (1908).

P. cordiformis M a n s u y , Sur la présence du genre Pomarangina dans le Trias du Tonkin, Mém. Serv. géol. Indochine, II/5, 1913, p. 34, Textfig. I [Nom. nov. pr. Neomegalodon dissimilis M a n s u y , Contrib. à la geol. du Tonkin, Paléontol., ibidem, I/4, 1912, p. 63, Pl. XI. fig. 8, XII. fig. 1]. Tonkin, Obertrias.

P. Haydeni D i e n e r , Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. V/3, 1908, Ladinie, carnie a. noric faunae of Spiti, p. 66, Pl. X. fig. 5, 6. Himalaya, Karnisch.

P. sp. ind. aff. Haydeni (D i e n .) K r u m b e c k (1914) vide Krumbeckia Krumbecki.

Gen. **Schizodus**, King.

W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 148.

Sch. alpinus Winkler (1850, Ooster (1869) vide Corbula alpina.

Sch. cloacinus Oppel et Suess (1856), Winkler (1861) vide Isocyprina (?) Ewaldi.

Sch. concentricus Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 503, Pl. XVII. fig. 19—21 (Axinus). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 174. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 229.

England, Nordalpen, Rhaetisch.

Sch. crowcombei ((Moore) Martin (1865) vide Pteromya crowcombeia.

Sch. depressus Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 503, Pl. XVII. fig. 17 (Axinus). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 175.

England, Rhaetisch.

Sch. elongatus (Moore) v. Dittmar (1864) vide Tapes elongata. *Sch. Ewaldi* Ooster (1869), Simonelli (1891), Vaughan (1904), Vinassa de Regny (1906) vide Isocyprina (?) Ewaldi.

Sch. isosceles S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 128, Pl. XXX. fig. 1—4 (Myophoria). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 173. — Dumortier, Dép. jur. bassin du Rhône, I. Infralias, 1864, p. 12 (Myophoria). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 229. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 64, Taf. II. fig. 25. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 840.

Frankreich, Schweiz, Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

Sch. Negrii Bittner, Neue Arten aus d. Trias v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLII. 1892, p. 86, Taf. V. fig. 3 [Sch. sp. ind. ex aff. Ewaldi (Born.) Bittner, Triaspref. v. Balia, ibidem, XLI. 1891, p. 115, Taf. II. fig. 5 inclus.]. Anatolien, Norisch.

Sch. posterus (Deffner) Martin (1865) vide Anodonta postera.

Sch. praecursor v. Dittmar (1864), Martin (1865) vide Taeniodon praecursor.

Sch. Reziae (Stoppani) v. Dittmar (1864) vide Myophoria Reziae.

Sch. simplex (Moore) Martin (1865) vide Pteromya simplex.

Sch. Stenonis v. Dittmar (1864), Martin (1865) vide Myophoria Stenonis.

Sch. triangularis Hebert, Rech. sur l'âge des grès à combustibles d'Helsingborg etc Ann. Soc. géol. Paris, 1869, p. 26, Pl. II. fig. 28. — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5. T. II. 1891, p. 235.

Schonen (Schweden), Apennin, Rhaetisch.

Gen. **Trigonia** Brug. (*Trigonellites* Schlotheim).

- T.? *Azzarolae Steppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 58, Pl. VI, fig. 1—3. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 173. Südalpen, Nordalpen, Rhaetisch.
- T. cardissoides* v. *Ziehen* (1830), *Quenstedt* (1852, 1885) vide *Myophoria cardissoides*.
- T. curvirostris* v. *Schlotheim* (1820, 1823) vide *Myophoria curvirostris*, *Quenstedt* (1858, 1885) vide *Myophoria elegans*.
- T. Gaytani** v. *Klipstein*, Östl. Alpen, 1843, p. 252, Taf. XVI, fig. 16 (*Lyriodon*). — d'Orbigny, *Prodrome*, I. 1849, p. 198. — Laubö, Fanua v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 60 (*Myophoria*). — v. Woehrmann, Über d. system. Stellg. d. Trigoniiden etc. Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 8. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 89, Taf. X, fig. 16—18. Südalpen, Karnisch.
- T. Goldfussi* v. *Ziehen* (1830), *Quenstedt* (1885) vide *Myophoria Goldfussi*.
- T. harpa* Münster (1841) vide *Myophoria harpa*.
- T. Kefersteini* Münster (1841), *Curioni* (1855) vide *Myophoria Kefersteini*.
- T. laevigata* v. *Ziehen* (1830). *Quenstedt* (1885) vide *Myophoria laevigata*.
- T. margaritifera** Böhni, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 43, Taf. IV, fig. 31—33. Bäreninsel, Karnisch.
- T. orbicularis* v. Hauer (1850) vide *Myophoria orbicularis*.
- T. pes anseris* v. *Schlotheim* (1820, 1823), *Quenstedt* (1885) vide *Myophoria pes anseris*.
- T. postera* Quenstedt (1856), Renevier (1865) vide *Myophoria inflata*.
- T. simplex* v. *Schlotheim* (1820), v. Strombeck (1849) vide *Myophoria simplex*.
- T. transversa* Bornemann (1856) vide *Myophoria transversa*.
- T. vulgaris* v. *Schlotheim* (1820, 1823), v. *Ziehen* (1830), v. Strombeck (1849) vide *Myophoria vulgaris*, *Quenstedt* (1885) vide *Myophoria incurvata*.

Gen. **Trigonodus** Sandberger.

in v. *Alberti*, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 125. — Neumann, Über d. Herkunft d. Unioniden, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XCIX. 1889, p. 23, 24. — v. Woehrmann, Üb. d. syst. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 14, 21. — Waagen, Lam. d. Frontbachtuffe, Verh. G. R. A. 1906, p. 389. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 15, 127.

Typ. *T. Sandbergeri* v. *Alberti* (1864).

T. Balsami Parona (1889) vide *Hentinajas fissidentata*.
T. Bittneri Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 27, Taf. XXVII, fig. 10—13, Textfig. Südalpen, Karnisch.

T. (?) brevidens Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. I. c. 1907, p. 34, Taf. XXVIII, fig. 10. Südalpen, Karnisch.

T. carniolicus Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. I. c. 1907, p. 30, Taf. XXVIII, fig. 1, 2 (var. lata), 3—5 [*Myophoria Haueri Parona*, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 121, Tav. X, fig. 8 inclus.]. Südalpen, Karnisch.

T. costatus v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 186, Taf. VII, fig. 9—12. — v. Woehrmann, Üb. d. system. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 25. — Broili, Fauna

d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 209, Taf. XXV. fig. 18—23. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 18, Taf. XXVII. fig. 1—3, 5, 6.

Südalpen. Karnisch.

- T. cristonensis** Meeck, Ann. Rep. chief of engineers, Washington, 1875, II, p. 1003 (Unio). — Cope, U. S. Geogr. Surv. W. of the 100th. Mer. IV. 1877, Pt. 2, p. 9, Pl. XXIII. fig. 2—5 (Unio). — White, Non marine foss. Moll. of N. America, Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. 1881/82, p. 19, Pl. III. fig. 5. (Unio). — v. Woehrmann, System. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 23.

New Mexico, Trias.

- T. Dieneri** Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 33, Taf. XXXIII. fig. 5.

Südalpen. Karnisch.

- T. Hornschuhii** Berger, Keuperform. v. Koburg, Neues Jahrb. f. Min. 1854, p. 412, Taf. VI. fig. 4, 5, 11 (Unio). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 126.

Norddeutschland, Keuper.

- T. intermedius** Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 26, Taf. XXVIII. fig. 11, XXXIII. fig. 3, 4, Textfig.

Südalpen. Karnisch.

- T. judicensis** Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Bell. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 220, Tav. VIII. fig. 19, 20.

Sizilien, Karnisch.

- T. keuperinus** Berger, D. Keuperform. v. Koburg, Neues Jahrb. f. Min. 1854, p. 412, Taf. VI. fig. 1—3 (Unio). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 126 (Trigonodus Sandbergeri). — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 102, Taf. II. fig. 1, 7, 8.

Deutschland, Keuper.

- T. (?) Marmolatae** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 174, Taf. V. fig. 53.

Südalpen, Ladinisch.

- T. minutus** v. Woehrmann, et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlermplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 187, Taf. VIII. fig. 5—7.

Südalpen. Karnisch.

- T. orientalis** Bittner, Verst. d. Süd-Ussurigebe. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 22, Taf. III. fig. 27.

Ussuribucht, Skythisch.

- T. postrablensis** Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 48, Textfig. 75.

Bakony, Hauptdolomit.

- T. sp. ind. aff. postrablensis** (Frech) Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 97, Taf. II. fig. 25.

Apennin (Salerno), Karnisch.

- T. praeco** Philippi, Fauna d. Trigonodus dol. v. Hühnenfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 163, Taf. VI. fig. 11.

Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

- T. problematicus** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 265, Taf. XVII. fig. 25 (Unio?). — v. Hauser, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 545, Taf. I. fig. 7—9 (Cardinia). — v. Woehrmann, Üb. d. syst. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 24, Taf. I. fig. 9, 10 (Myophoria fissidentata Tommasi (non v. Woehrmann), Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 41, Tav. III. fig. 5—8 inclus.). — v. Arthaber, Alpine Trids, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XLI. fig. 1. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 23, Taf. XXVIII. fig. 6—9, XXXIII. fig. 2.

Südalpen. Karnisch.

T. sp. ind. aff. problematico (Klipst.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new. ser. V/1, 1913, p. 106, Pl. XIII. fig. 18.
— Mansuy, Contrib. à l'étude des faunes paléoz. et trias. du Tonkin. Mém. Serv. géol. Indochine, II/5, 1913, p. 29, Pl. IV. fig. 13.

Himalaya, Tonkin, Karnisch.

T. Rablensis Gredler, Programmi d. k. k. Gymnasiums zu Bozen, 1862/63, p. 41 (Cypriocardia). — v. Guembel, Geognost. Mitt. aus d. Alpen, Sitzber. bayr. Akad. Wiss. München, X. 1873, p. 78, Ann. (Cypriocardia). — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 184, Taf. VII. fig. 1—3, 5—8. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 210, Taf. XXV. fig. 24—26. — v. Arthaber, Leth. mes. I/3, Alpine Trias, 1906, Taf. XLII. fig. 5. — Waggon, Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVII/2, 1907, p. 20, Taf. XXVII. fig. 4, 7—8. — Di Stefano, La dol. prine. di Palermito, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 69, Tav. IX. fig. 5, 6.

Südalpen, Karnisch. — Sizilien, Hauptdolomit.

T. (?) Roepperti Berger, Keuperform. v. Coburg, Neues Jahr. f. Min. 1854, p. 414, Taf. VI. fig. 12 (Unio). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 127.

Norddeutschland, Keuper.

T. Sandbergeri v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 126, Taf. II. fig. 10. [Thalassites sp. ind. Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkde. 1851, p. 563, Taf. XLVII. fig. 35, Unio keuperinus Berger, Keuperform. v. Coburg, Neues Jahrb. f. Min. 1854, p. 412, Taf. VI. fig. 1—3 inclus.]. — Philipp, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 13.

Non T. Sandbergeri Tommasi (1890) [= Heminajas Woehrmanni var. Neumayri Waggon].

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

T. Sandbergeri var. *dalmatina* Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 127, Taf. XXXIII. fig. 6—9.

Dinariden, Anisisch.

T. serianus Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 124, Tav. IX. fig. 16, 17.

Südalpen, Karnisch.

T. (?) superior Loretz, Petref. d. alpinen Trias aus d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 635, Taf. XXII. fig. 6. — Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 35.

Südalpen, Karnisch.

T. Vaceki Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 34, Taf. XXVIII. fig. 12, Textfig.

Südalpen, Karnisch.

T. sp. ind. Tegelmayeri, Beitr. z. Kenntn. d. Keupers im nördl. Thüringen, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, N. F. XIII. 1876, p. 434, Taf. VI. fig. 1.

Norddeutschland, Lettenkohle.

Fam. Nayadidae Lam.

Gen. **Anodonta** Cuvier.

A. dubia Fraas, Üb. Semionotus etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. XVII. 1861, p. 100, Taf. I. fig. 32—35 vide A. (?) postera.

A. lettica Quenstedt (1852, 1867) vide Anodontophora lettica.

A. liaso-keuperina Braun, Die Tiere in d. Pflanzenschiefern v. Baireuth, 1860, p. 7, Textfig. 3. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 176.

Süddeutschland, Rhaetisch.

A. (?) *postera* D e f f n e r et F r a a s , Juraversenkung, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 9. — v. Schloenbach, Beitr. z. gen. Niveau-bestimmung d zwischen Keuper u. Lias im Hannoverschen etc. auftretenden Sandst., ibidem, 1862, p. 156, Taf. III. fig. 3 [A. dubia Fr a a s , Über Semionotus etc. Würt. Naturw. Jahresh. XVII. 1861, p. 100, Taf. I. fig. 32—35 inclus.]. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 175 „Unsichere Bivalve“ Quenstedt, Jura, 1856, Taf. I. fig. 30, 31, Clidophorus Goldfussii var. genuina v. Schauroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1858, p. 113. Taf. VI. fig. 10, 11, A. dubia v. A l b e r t i , Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 140, Taf. III. fig. 11 inclus.]. — M a r t i n , Etage rhétien, 1865, p. 229 [Pholadomya corbuloides (D e s h.) Levallois, Couches de jonction du Trias et du Lias, Bull. Soc. géol. France, sér. 2, T. XXI. 1864, p. 393, Pl. VI. fig. 2—4 inclus.]. (Schizodus). — O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 65, Taf. II. fig. 27. — B l a n c e n h o r n , Die Trias am Nordrand d. Eifel, Abhandl. Geol. Spezialk. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 210 (76).

Frankreich, Schweiz, Nordalpen, Rhaetisch. — Deutschland, Oberkeuper, Rhaetisch.

Gen. **Unio** Philippson.

- U. cristonensis* Mee k (1875), Cope (1877), W h i t e (1882) vide Trigonodus cristonensis.
- U. dockumensis* S i m p s o n , Descr. of four triass. Unios from Texas, Proceed. U. S. Nat. Mus. Washington, XVIII. 1896, p. 384, Textfig. 5. Texas, Dockum beds.
- U. Dumble* S i m p s o n , Descr. of four triass. Unios from Texas, Proceed. U. S. Nat. Museum Washington, XVIII. 1896, p. 383, Textfig. 3. Texas, Dockum beds.
- U. gallinensis* Mee k, Ann. Rep. chief of engineers, Washington, 1875, II. p. 1003, Cope, U. S. Geogr. Surv. W. of the 100th. Mer. IV. 1877, Pt. 2, p. 9, Pl. XXIII. fig. 6 = Gen. ind. sp. ind., teste v. W e h r m a n n , System. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 23.
- U. graciliratus* S i m p s o n , Desc. of four triass. Unios fr. Texas, Proceed. U. S. Nat. Mus. Washington, XVIII. 1896, p. 384, Textfig. 4. Texas, Dockum beds.
- U. Grimmeri* (B i t t n e r mscpt.) W a a g e n , Lam. d. Pachycardien-tuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 316, Taf. XXXI. fig. 14—16. Dinariden, Karnisch.
- U. Hornschuhii* Berger (1854) vide Trigonodus Hornschuhii.
- U. keuperinus* Berger (1854) vide Trigonodus Sandbergeri et T. keuperinus.
- U. problematicus* v. K l i p s t e i n (1843) vide Trigonodus problematicus.
- U. Roepperti* Berger (1854) vide Trigonodus (?) Roepperti.
- U. subplanatus* S i m p s o n , Descr. of four triass Unios fr. Texas, Proceed. U. S. Nat. Mus. Washington, XVIII. 1896, p. 383, Textfig. 1, 2. Texas, Dockum beds.
- U. terrae rubrae* Mee k, Ann. Rep. chief engineer Washington, 1875, II. p. 1003, Cope, U. S. Geogr. Surv. W. of the 100th. Mer. IV. 1877, p. 9, Pl. XVIII. fig. 7 = Gen. ind. sp. ind., teste, W h i t e , Non marine foss. Moll. of N. America, Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. 1881/82, p. 19.
- U n i o n i n a* P o h l i g , Maritime Unionen, Palaeontograph. XXVII. 1880, p. 114 = Anoplophora Sandberger (Anodontophora Co ssman n). teste v. K o e n e n , Über d. Gattg. Anoplophora etc. Zeitschr. D. G. G. XXXIII. 1881, p. 680.
- U. Leukarti* P o h l i g , l. c. (1880) vide Anodontophora donacina.
- U. maritima* P o h l i g (1880) vide Anodontophora lettica.

Fam. Astartidae Gray.

Gen. **Astarte** Sow.

- A. Antonii* Giebel (1856), v. Seebach (1861), v. Alberti (1864), vide Schafhäutlia plana.
- A. cingulata** (Terquem) Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia. Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 51, Tav. III, fig. 23, 24. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 842. — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleont. XVI. 1910, p. 32, Tav. I, fig. 41. Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- A. Cochii** Capellini, Foss. infralias. d. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 50, Tav. III, fig. 21, 22. Apennin, Rhaetisch.
- A. consobrina** (Chapuis et De Walque) Capellini, Foss. infralias. d. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 51. Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- A. crenulata** Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 378, Taf. LXVIII, fig. 9. Nordalpen, Rhaetisch.
- A. irregularis* Principi (non Terquem) [1910] vide A. Pillai.
- A. longirostris** Schafhäutl, Beitr. z. näh. Kenntn. d. bayer. Voralpen, Neues Jahrb. f. Min. 1853, p. 319. — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 482, Taf. VII, fig. 12. Nordalpen, Rhaetisch.
- A. cf. longirostris** (Schafh.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun., Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 65, Taf. II, fig. 24. Schweiz, Rhaetisch.
- A. Pillai** Capellini, Foss. infralias. d. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 50 Tav. III, fig. 18—20. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 842. — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Paleont. XVI. 1910, p. 33, Tav. I, fig. 42, 43. (A. irregularis Terqu.). Apennin, Rhaetisch.
- A. rhactica* v. Guembel (1861) vide Lucina civatensis.
- A. Rosthorni* v. Woehrmann (1889, 1893), Tommasi (1890) vide Myophoriopsis Rosthorni.
- A. subaequilatera** Dunker, Über d. im Muschelkalk Oberschles. gef. Mollusken, Palaeontograph. I. 1851, p. 313, Taf. XXXVI, fig. 10, 11. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 124. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- A. triasina** Roemer, Neue Verst. aus d. Muschelkalk von Willebadessen, Palaeontograph. I. 1851, p. 312, Taf. XXXVI, fig. 1—6. — Quenstedt, Petrefaktenkde. 1852, Taf. XLVI, fig. 29. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 619 [Venus nuda Goldfuß, in v. Ziehen. Verst. Würtembergs, 1833, Taf. LXXXI, fig. 3 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 124. — Neumayr, Beitr. zu einer morphol. Einteilg. d. Bivalven, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 774. — Philippi, Fauna d. Trigondusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 163, Taf. VII, fig. 8. — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V, fig. 15. Deutschland, Muschelkalk.
- A. willebadensis** Roemer, Neue Verst. aus d. Muschelk. von Willebadessen, Palaeontograph. I. 1851, p. 314, Taf. XXXVI, fig. 7—9. — v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 620. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 124. Deutschland, Muschelkalk.
- A. (an Myophoriopsis?) Woehrmanni**, Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, T. VII. 1890, p. 51, Tav. IV, fig. 3—6. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 668. Südalpen, Karnisch.

A. sp. ind. Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 64, Pl. IX. fig. 10, 11.

Burma, Rhaetisch.

A. (?) nov. sp. ind. Krumbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 64, Taf. IV. fig. 16.

Indonesien, Norisch.

Gen. **Cardita** Brug.

[*Palaeocardita* Conrad, Amer. Journ. Conch. II. 1867, p. 11 (Typ. *Cardium austriacum* v. Haue r, 1853), *Stoliczka*, Cretaceous fauna of S. India, Pal. Ind. III. Pelecypoda, 1871, p. 280 (Typ. *Cardita crenata* Goldfuss, 1838), *Neumann*, Beitr. zu einer morphol. Einteilg. d. Bivalven Denkschr. Akad. Wiss. Wien, LVIII. 1891, p. 762, 775 = Gen. inval., teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 35 inclus.]

C. austriaca v. Haue r, Über d. Gliederung d. Trias etc. in d. nordöstl. Alpen, Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 734. — Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 16. — Winkler, Der Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 481, Taf. VII. fig. 9. — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 53, Pl. VI. fig. 1—8 (non 9, 10). — Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 377, Taf. XLV. fig. 8. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 183 [*Cardium pentagonum* Stoppani, l. c. 1861, p. 47, Pl. IV. fig. 14, 15, *C. cloacinum* Stoppani (non Quenst.), l. c. 1863, p. 125, Pl. XXIX. fig. 10 inclus.]. — Renevier, Not. géol. et pal. s. les Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne. VIII. 1865, p. 61. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 231. — Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1868, p. 54, Tav. IV. fig. 2. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 66, Taf. II. fig. 36. — De Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verhandl. G. R. A. 1882, p. 101. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 104. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLIX. fig. 10. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 187.

Frankreich, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Bakony, Apennin, Karpathen, Rhaetisch.

C. sp. ind. aff. austriaceae (Haue.) Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 60, Tav. I. fig. 20. Apennin (Salerno), Karnisch.

C. Benecke Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 39, Taf. IV. fig. 18—20, XXIV. fig. 12. — Galderi, Malacofauna trias. di Giffoni, Atti Acad. sci. fis. e nat. Napoli, 1905, Vol. XII. ser. 2, No. 17, p. 16, Textfig. 16. — Scalia, Fauna Trias sup. Mte. Judica, Boll. Acad. Gioenia sci. nat. Catania, Maggio 1908, p. 21. — Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 61, Tav. I. fig. 21. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 300, Tav. IX. fig. 26.

Südalpen, Apennin (Salerno), Sizilien, Karnisch.

C. buruca Krumbeck (1913) vide *C. globiformis*.

C. compressa Cornalia (1847) vide *C. crenata*.

C. Cordellai Bittner, Neue Arten aus d. Trias v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLII. 1892, p. 86, Taf. V. fig. 2.

Anatolien, Norisch.

C. crenata Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 185, Taf. CXXXIII. fig. 6. — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 86, Taf. VIII. fig. 19. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 42, Taf. XV. fig. 11. [C. compressa Cornalia, Not. geo. min. valli Tirole mer. 1847, p. 45, Tav. III. fig. 11, C. tenuis v. Kliest, Oestl. Alpen, 1843, p. 255, Taf. XVI. fig. 22, Cardium

dubium Graf zu Münster, l. c. p. 85, Taf. VIII. fig. 27 inclus.]. — Stoliezka, Cretaceous fauna of Southern India, Pal. Ind. 1871, Pt. III. Pelecypoda, p. 280 (Palaeocardita). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 34, Taf. IV. fig. 5—13. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 218, Taf. XXVII. fig. 27, 28. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 8. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 77. Nec C. crenata Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, 1890, p. 50, nec v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 667 [= C. Guembeli Pichl.].

C. cf. *crenata* (Gdf.) Bassani, Foss. nella dol. trias. di San Lorenzo (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 12, Tav. I. fig. 20, 21 [Cardium apiculatum Costa, Note geol. e pal. sui Mti. Picentini, ibidem, ser. 2, Vol. I. 1864, p. 236, Tav. V. fig. 19—21, VI. fig. 10, C. elatum Costa, l. c. p. 253, Tav. VI. fig. 11, C. obliquum Costa, l. c. p. 253, Tav. VI. fig. 12 inclus.].

Apennin (Salerno), Rhaetisch.

C. *dolomitica* Di Stefano, La dol. prino. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 73, Tav. VIII. fig. 20.

Sizilien, Hauptdolomit.

C. elegans v. Klipstein (1843) vide Myophoria ornata.

C. *globiformis* Böttger, Tertiaerform, v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. III. 1880, p. 38, 46, Taf. I. fig. 21—23, Taf. II. fig. 12—16. — Wanner, Neues über d. Perm-, Trias- u. Juraform d. Indoaustral. Archipels, Zentralbl. f. Min. 1910, p. 738. — Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 251, Taf. XVII. fig. 20—26. — Jaworski, Nuculamerget, v. Misol, Pal. v. Timor, II/5, 1915, p. 115, Taf. XLV. fig. 1, 2 [C. buruea Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru, l. c. II/1, 1913, p. 60, Taf. IV. fig. 6—13 inclus.].

Sumatra, Indonesien, Norisch.

C. *Guembeli* Pichler, Neues Jahrb. f. Min. 1875, p. 277. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 218, Taf. IX. fig. 10—13 (C. crenata var. Guembelii). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, ibidem XLIII. 1893, p. 667 (C. crenata var. Guembelii). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 38, Taf. IV. fig. 14—16, XXIV. fig. 11. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 104, Taf. II. fig. 3. — Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 62, Tav. I. fig. 22. — Renz, Stratigraph. Unters. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 564.

Nordalpen, Südalpen, Aargau, Apennin (Salerno), Corfu, Karnisch.

C. cf. *Guembeli* (Pichl.) Renz, Neue Vorkommen v. Trias in Griechenland etc. Zentralbl. f. Min. 1904, p. 262,

Corfu, Karnisch.

C. Hoeninghausii v. Klipstein (1843) vide Opis (Coelopis) Hoeninghausii.

C. *latemarensis* Philipp, Geol. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 96, Taf. VI. fig. 25—30. — Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 64, Tav. I. fig. 23.

Südalpen, Ladinisch. — Apennin (Salerno), Karnisch.

C. *lorica* Stoppa, Pal. Comb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 57, Pl. VI. fig. 22, 23. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 183.

Südalpen, Rhaetisch.

C. *Luerae* Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 57 Pl. VI. fig. 26. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 184.

Südalpen, Rhaetisch.

- C. cf. Luerae (Stoppp.) Frech**, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachträge, Pal. Bal. I/1, 1907, p. 92, Textfig. 27.
Bakony, Rhaetisch.
- C. minuta Winkler**, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 479, Taf. VII. fig. 8. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 184 [Cardium phaseolus Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 56, Pl. V. fig. 1, 2 inclus.].
Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.
- C. munita Stoppani**, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 56, Pl. VI. fig. 11—18. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 182 [C. multiradiata Winkler (non Emmerich), Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 16, Der Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 480, Taf. VII. fig. 10 inclus.]. — Capellini, Foss. infralias. d. golfe d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 55, Tav. IV. fig. 3. — Desfaenzi, Rhaet. Foss. d. Apuanischen Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 101. — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 15. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 834.
Nordalpen, Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
- C. multiradiata Emmerich**, Geogn. Beobacht. aus d. bayer. Alpen, Jahrb. G. R. A. IV. 1853, p. 48 (Myophoria). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 181, Taf. III. fig. 6, 7. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 231. — Benecke, Üb. Trias u. Jura i. d. Südralpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 158. — Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 55, Tav. IV. fig. 4. — Oester, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 66, Taf. II. fig. 35. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Craocvie, sér. A, Nov. Dec. 1916, p. 189. Non C. multiradiata Winkler (1859, 1861). [= C. munita.]
Nordalpen, Südralpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch.
- C. quadrata Trechmann**, Trias of New Zealand, Quart. Juorn. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 212, Pl. XXI. fig. 11.
Neuseeland, Karnisch.
- C. (?) papiracea v. Dittmar**, Contortazone, 1864, p. 183, Taf. III. fig. 4.
Nordalpen, Rhaetisch.
- C. petalooides Costa**, Nota ad una commun. di G. Napoli, Ann. Acad. aspir. nat. ser. 3, Vol. IV. 1864, p. 35, Tav. A. fig. 7 (Cardium). — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 66, Tav. II. fig. 1.
Apennin (Salerno), Karnisch.
- C. Pichleri Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1 1895, p. 38, Taf. IV. fig. 17, XXXIV. fig. 8—10. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 13, Taf. VII. fig. 6, 7. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, ibidem, 1904, p. 30, Textfig. 44.
Nordalpen, Südralpen, Bakony, Karnisch.
- C. Quenstedti Stoppani**, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 57, Pl. VI. fig. 24, 24 [Bivalve indet. Quenstedt, Der Jura, 1856, Taf. I. fig. 26 inclus.]. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 183.
Süddeutschland, Südralpen, Rhaetisch.
- C. rugosa v. Klipstein** (1843) vide Pachycardia Zittelii.
- C. singularis Healey**, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 67, Pl. IX. fig. 16—20.
Burma, Rhaetisch.
- C. spinosa Winkler**, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 481, Taf. VII. fig. 11. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 184 [C. aspera Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 53, Pl. V. fig. 24—28 = C. subaspera Martin, Etage rhétien, 1865, p. 232 inclus.].
Nordalpen, Südralpen, Rhaetisch.

- C. strigillata* v. *Klipstein* (1843) vide *Laubeia strigillata*.
C. subaspera *Martin* (1865) vide *C. spinosa*.
C. Talegli Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 56, Pl. VI, fig. 19, 20. — v. *Dittmar*, Contortazone, 1864, p. 184. — *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 232. — *Capellini*, Foss. infralias d. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2. T. V. 1866, p. 56, Tav. IV. fig. 5.
 Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
C. cf. Talegii (Sopp.) *Goetel*, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 188.
 Karpathen, Rhaetisch.
C. trapezoidalis *Krumbbeck*, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 147, Taf. IV. fig. 15, Textfig. 11. — *Jaworski*, Nuculamergel v. Misol, Pal. v. Timor, II/5, 1915, p. 117, Taf. XLV. fig. 5
 Indonesien, Norisch.
C. (?) ursina *Kittl*, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norw. Arct. Exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 33, Taf. II. fig. 5.
 Ellesmereland, Karnisch.
C. Willei *Kittl*, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norw. Arct. Exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 34, Taf. II. fig. 14.
 Ellesmereland, Karnisch.
C. Zamboninii *Galdieri*, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXVIII, Napoli 1908, p. 67, Tav. I. fig. 24.
 Apennin (Salerno), Karnisch.
C. sp. ind. *Stoppani*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1860, p. 7, Pl. VI. fig. 21.
 Südalpen, Rhaetisch.
C. sp. ind. *Böhm*, Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Acad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 47, Taf. V. fig. 22.
 Bäreninsel, Karnisch.
C. (?) sp. ind. *Krumbbeck*, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 253, Taf. XVII. fig. 2.
 Sumatra, Norisch.
Cleidophorus alpinus *Winkler* (1859, 1861) vide *Myacites Quenstedti*.
Cleidophorus Goldfussi var. genuina et var. plicata v. *Schauroth*, (1857) vide *Myoconcha Goldfussii*.
Cleidophorus Goldfussi v. *Schauroth* (1859) et var. *elliptica* (1857) vide *Myoconcha Mülleri*.

Gen. **Myoconcha** Sow.

Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 158. — *Philippi*, Fauna d. Trigondusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkd. Würt. 1898, p. 159. — *Waagen*, Lam. d. Frombachtuffe, Verh. G. R. A. 1906, p. 389. — *Waagen*, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 154, 161.

- M. acquatensis** *Parona*, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 133, Tav. XI. fig. 8. — *Waagen*, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 82, Taf. XXXII. fig. 18, 19, Textfig.
 Südalpen, Karnisch.
M. Appeli *Kittl*, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 718, Taf. XXIII. fig. 23.
 Dinariden, Anisisch.
M. auriculata *Brioli*, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 197, Taf. XXIII. fig. 25.
 Südalpen, Karnisch.
M. Bassanii *Tommasi*, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 31, Taf. II. fig. 8, 9. [sp. non val., teste v. *Woehrmann*, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 667.]
 Südalpen, Karnisch.

- M. sp. ind. aff. Bassanii** (Tomm.) Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonnyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 14, Taf. VII. fig. 25. Bakony, Karnisch.
- M. Beyrichii** Noetling, Entwicklung d. Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 328, Taf. XIV. fig. 6. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 613, Taf. XXXIII. fig. 16, 17. Norddeutschland, Muschelkalk.
- M. bicostata** Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI. Heft 3, p. 610, Taf. XXXIII. fig. 11. Norddeutschland, Muschelkalk.
- M. Bornei** Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 37, Taf. VI. fig. 10. Südalpen, Karnisch.
- M. Broili** Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 78, Taf. XXXII. fig. 1 [Nom. nov. pr. M. Maximiliani Leuchtenbergensis Broili (non v. Klipstein), Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 195, Taf. XXIII. fig. 12—16]. Südalpen, Karnisch.
- M. Brunneri** v. Hauer, Pal. Not. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 151, Taf. I. fig. 6. — Benecke, Üb. Trias u. Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 159. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 162, Taf. V. fig. 27—32 (var. angulosa, Taf. V. fig. 33, 34, var. inflata, Taf. V. fig. 35 inclus.). — Mariani, Contrib. allo studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 6, 21. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 30, Tav. III. fig. 8, 9. Südalpen, Ladinisch, Karnisch.
- M. cf. Brunneri** (Hau.) Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 612. Norddeutschland, Muschelkalk.
- M. (?) canstattensis** v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 133, Taf. III. fig. 1. — Philippi, Fauna d. Trigonodus dol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkd. Würt. 1898, p. 210 [= ? Anodontophora lettica Qu.]. Süddeutschland, Keuper.
- M. cornalbas** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 259, Pl. LX. fig. 7 (Mytilus). — Bassani, Foss. dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 9, Tav. I. fig. 14 (Mytilus). — Tommasi, Rev. fauna del. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 101, Tav. XVI. fig. 21—23. Südalpen, Apennin, Hauptdolomit, Rhaetisch.
- M. cornalbae** Stopp. var. alternicostata Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 67, Tav. IX. fig. 7. Sizilien, Hauptdolomit.
- M. curionii** v. Hauer (1857), Parona (1889), Broili (1904) vide Pleurophorus Curionii.
- M. curvata** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 198, Taf. XXIII. fig. 28—30, XXIV. fig. 1. — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 83, Taf. XXXII. fig. 5. Südalpen, Karnisch.
- M. eeki** Tornquist, Recoaro u. Schio, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 368, Taf. XX. fig. 9. [M. gastrochaena Römer, Geol. v. Oberschlesien, 1870, p. 128, Taf. X. fig. 5 inclus.]. Deutschland, Muschelkalk. — Südalpen, Ladinisch.
- M. elliptica** v. Schauoth, Schaltiere d. Lettenkohlenformi. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 112, Taf. VI. fig. 11 (Clidophorus). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 133, Taf. II. fig. 4. Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.
- M. epigonus** Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 36, Taf. VI. fig. 9. Bakony, Skythisch.

M. gastrochaena D u n k e r , Über d. im Muschelkalk Oberschles. gef. Moll., Palaeontograph. I. 1851, p. 296, Taf. XXXV. fig. 13 (non 12) [Modiola]. — G i e b e l , Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 34, Taf. V. fig. 1. — v. S e e b a c h , Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 628, Taf. II. fig. 3. — v. A l b e r t i , Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 130, Taf. III. fig. 3. — v. E c k , Formt. d. bunt. Sandst. etc. im Oberschlesien, 1865, p. 57, 102. — B e n e c k e , Üb. ein. Muschelkalk-Ablag. d. Süd-alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 42, Taf. III. fig. 3. — v. E c k , Rüdersdorf etc. Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 91, Taf. I. fig. 7. — W a l t h e r , Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. v. Jena, 1906, p. 27, Taf. VI. fig. 28. — L a n g e n h a n , Verst. d. deutsch. Trias, Taf. II. fig. 9—12. — Z e l l e r , Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 105. — A s s m a n n , Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 609, Taf. XXXIII. fig. 6, 9, 10.

Nec **M. gastrochaena** D u n k e r , l. c. 1851, Taf. XXXV. fig. 12 (= M. Goldfussi), nec R ö m e r , Geol. v. Oberschlesien, 1870, p. 128, Taf. X. fig. 5 (= M. Eckii), nec P h i l i p p i (1898) [= M. Goldfussi].

Deutschland, Röth bis Grenzdolomit. — Südalpen, Anisisch.

M. nov. sp. ind. aff. gastrochaenae (D u n k.) A s s m a n n , Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, l. c. p. 612, Taf. XXXIII. fig. 13. Deutschland, Röth.

M. sp. ind. ex aff. gastrochaenae (D u n k.) W i l c k e n s , Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 150, Taf. VI. fig. 8. Südalpen, Ladinisch.

M. Goldfussi D u n k e r , Programm d. höh. Gewerbeschule i. Cassel, 1849, p. 11, 15 (Modiola). — v. E c k , Rüdersdorf etc. Abhandl. Geol. Spezialkte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 90, Taf. I. fig. 6 [Myophoria modiolaria] D u n k e r , l. c. p. 15, Clidophorus(?) Goldfussi v. S c h a u r o t h , Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1850, p. 112, Taf. VI. fig. 10, 12 (non 11), Modiola gastrochaena D u n k e r , Üb. d. im Muschelkalk Oberschlesiens gef. Moll. Palaeontograph. I. 1881, p. 296, Taf. XXXV. fig. 12 (non 13) inclus.]. — P h i l i p p i , Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 5. — A s s m a n n , Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 611, Taf. XXXIII. fig. 12 [M. gastrochaena Philippi], Fauna d. unt. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. LV. 1898, p. 163, Taf. V. fig. 4 inclus.].

Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.

M. Goldfussi (D k.) var. *hispanica* W u r m , Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 114, Taf. VI. fig. 22, 23. Aragonien, Muschelkalk.

M. grandis S t u r , Geol. d. Steiermark, 1871, p. 248 vide Anodontophora lettica.

M. grandis W a g n e r , Beitr. z. gen. Kenntn. d. Muschelkalkes bei Jena, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 27, 1897, p. 53 (deest imago!).

Norddeutschland, Muschelkalk.

M. gregaria B i t t n e r , Lant. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 29, Taf. VII. fig. 20—23. — F r e c h , Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, ibidem, 1904, p. 22, Textfig. 27, 28. — G a l d i e r i , Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 90, Tav. II. fig. 19.

Bakony, Ladinisch. — Apennin (Salerno), Karnisch.

M. laevis P h i l i p p i (1898) vide Pleurophorus laevis.

M. loeschianni F r e c h , Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 83, Textfig. 17.

Bakony, Hauptdolomit.

- M. lombardica** v. **Hauer**, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibl. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XXIV. 1857, p. 559, Taf. VI. fig. 1—8 [Cardinia sp. ind. Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, p. 105, 107, Taf. IV. fig. 37, Modiola sp. ind. Curioni, Sulla success. norm. dei diversi membri del terreno trias. nella Lombardia, 1855, Tav. II. fig. 14 inclus.]. — Parona, Studio mongr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 129, Tav. XI. fig. 1—7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLI. fig. 6. — Wagen, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 83, Taf. XXXII. fig. 14—16. Südalpen, Karnisch.
- M. Maximiliani Leuchtenbergensis** v. **Klipstein**, Östl. Alpen, 1843, p. 256, Taf. XVII. fig. 1 (Mytilus). — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 200. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 43, Taf. XVI. fig. 3. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 41, Taf. IV. fig. 1—3. — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, ibidem, XVIII/2, 1907, p. 79, Taf. XXXII. fig. 20. Non M. Maximiliani Leuchtenbergensis Broili (1904) [= M. Broili]. Südalpen, Karnisch.
- M. cf. Maximiliani Leuchtenbergensis** (**Klipst.**) **Wilckens**, Pal. Untersuchg. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 149. Südalpen, Ladinisch.
- M. (?) Meyrati Ooster**, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 74, Taf. III. fig. 12. Schweiz, Rhaetisch, an Lias?
- M. Mülleri Giebel**, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 35, Taf. IIIa, fig 2, 14, VI. fig. 9 (Mytilus). — Salomon, Mar-molata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 161, Taf. V. fig. 26. [M. Thielau v. Seebach, Conchylienf. d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 626, Taf. II. fig. 2, v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 131, Taf. III. fig. 2, v. Eck, Form, d. bunt. Sandst. etc. in Oberschlesien, 1865, p. 101 [Cleidophorus Goldfussi v. Schauroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 320, Taf. II. fig. 13 inclus.], v. Eck, Rüdersdorf etc. Abhandl. Geol. Spezial-kte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 92, Taf. I. fig. 5, (var. elongata, fig. 5a) [Cleidophorus Goldfussi var. elliptica v. Schauroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 112, Taf. VI. fig. 11 inclus.]. — Galdieri, Trias d. Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 91, Tav. II. fig. 20. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 612, Taf. XXXIII. fig. 14, 15. Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle. — Südalpen, Ladinisch. — Apennin (Salerno), Karnisch.
- M. cf. Mülleri** (**Gieb.**) **Ahlburg**, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L.A. N. F. Heft 50, 1906, p. 26 (M. cf. Thielau). Norddeutschland, Röth.
- M. Paronai Tommasi**, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 102, Tav. I. fig. 16. Südalpen, Anisisch.
- M. parvula** v. **Woehrmann et Koken**, Fauna d. Raibl. Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 177, Taf. VIII. fig. 10, 11. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 196, Taf. XXIII. fig. 20, 22 (caet. exclus. = M. Woehrmanni.). Südalpen, Karnisch.
- M. cf. parvula** (**Woehrm. et Kok.**) **Toulou**, Schichten m. Gerv. Bouei vom Gaumannmüllerkoogel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 393, Taf. XII. fig. 8. Nordalpen, Karnisch.

- M. pavida** Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 95, Taf. VII. fig. 24. Bakony, Anisisch.
M. psilonoti (Quenst.) Capellini (1866) vide Avicula psilonoti.
- M. cf. psilonoti** (Quenst.) Renevier, Not. géol. et pal. Alpes Vaud. Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1864, Pl. I. fig. 6. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 74, Taf. II. fig. 32. Schweiz, Rhaetisch, an Lias?
- M. ptychitum** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 717, Taf. XXIII. fig. 19—21. Dinariden, Anisisch.
- M. Quenstedti** Giebel, Lieskau, 1856, p. 36 (deest imago!) [Mytilus]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 132. Norddeutschland, Muschelkalk.
- M. radians** Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, p. 258, Pl. LX. fig. 6 (Mytilus). — Bassani, Foss. nella dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 9, Tav. I. fig. 13 (Mytilus). — Tommasi, Revis. fauna dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 102, Tav. XVI. fig. 24, 25. Südalpen, Hauptdolomit.
- M. recta** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 197, Taf. XXIII. fig. 26, 27. — Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 81, Taf. XXXII. fig. 3. Südalpen, Karnisch.
- M. sp. ind. ex aff. rectae** (Broili) et *parvulae* (Bittn.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, Beitr. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, p. 49, Taf. III. fig. 9, 10 (Modiola?). Indonesien, Norisch.
- M. retroflexa** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 198, Taf. XXIV. fig. 2. Südalpen, Karnisch.
- M. Roemeri** v. Eck, Rüdersdorf, Abhandl. z. geol. Spezialk., v. Preußen, I/1, 1872, p. 91, Taf. I. fig. 8 [M. Goldfussi Berger (non Dunker), Verst. im Röth v. Hildburghausen, Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 169, Taf. III. fig. 9, non M. gastrochaena Römer, Geol. v. Oberschlesien, 1870, p. 128, Taf. X. fig. 5 = M. Ecki inclus.]. — Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 27. — Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 161 (Pleurophorus). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 609, Taf. XXXIII. fig. 7, 8. Deutschland, Röth, Muschelkalk.
- M. rugulosa** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 717, Taf. XXIII. fig. 22. Dinariden, Anisisch.
- M. Scaliai** Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 92, Tav. II. fig. 21. Apennin (Salerno), Obertrias.
- M. Schaurothi* Tornquist (1900) vide Pleurophorus Schaurothi.
- M. Taramelli** Tommasi, Revis. fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 102, Tav. XVI. fig. 26. — Waggon, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 161. (M. an Modiola?). Südalpen, Hauptdolomit.
- M. Taegeri** Frech, Leitfoss. d. Wurfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 83, Textfig. 18. Bakony, Hauptdolomit.
- M. Thielai* v. Seebach (1861), v. Alberti (1864), v. Eck (1865) vide M. Müller.

M. sp. ind. aff. Thielauui (S e e b.) v. L o e c z y , Wiss. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Szechenyi, III. 1899, p. 148, Taf. X fig. 2, Textfig. 21 (Pleurophorus).

Yunnan, Karnisch.

M. Weissenbaehensis T o u l a , Schichten m. Gerv. Bouei v. Gau-mannmüllerkogel, Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 393, Taf. XII. fig. 9.

Nordalpen, Karnisch.

M. Woehrmanni W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiser-almt, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 80, Taf. XXXII. fig. 2, 4, 17 [Nom. nov. pr. M. parvula Broilli (non v. Woehr-mann et K o k e n), Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 196, Taf. XXIII. fig. 17, 18, 19, 21, caet. exclus.].

Südalpen, Karnisch.

Gen. **Opis** Defr.

(Subgen. **Coelopis** Mun. Chalm., **Cryptocoelopis** Bittner, **Protopis** Kittl inclus.)

O. barnensis S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 52, Pl. V. fig. 19—21. Südalpen, Rhaetisch.

O. (?) cf. barnensis (S t o p p.) O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 70, Taf. II. fig. 7. Schweiz, Rhaetisch.

O. (?) bifrons S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1864, p. 53, Pl. V. fig. 22, 23. Südalpen, Rhaetisch.

O. cloacina Quenstedt (1856) vide Isocyprina (?) Ewaldi.
O. gracilis Parona (1889) vide Myophoriopsis Richthofeni.

O. ladina B i t t n e r , Lam. v. St.Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 32, Taf. III. fig. 19. Südalpen, Karnisch.

O. cf. ladina B i t t n e r , ibidem, p. 32 [= *O. Hoeninghausii* v. Woehrmann, (non v. Klipstein), Fauna d. Cardita-schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 223, Taf. IX. fig. 23]. Nordalpen, Karnisch.

O. Laubei B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 32, Taf. III. fig. 17, 18 [Nom. nov. pr. *O. Hoeninghausii*, Laubé (non v. Klipstein), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 41, Taf. XVI. fig. 1]. Südalpen, Karnisch.

Subgen. **Coelopis** Mun. Chalm.

C. affinis Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. XXV. 1865, p. 41, Taf. XVI. fig. 2. — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 31, Taf. III. fig. 22, 23. — Broilli, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 218, Taf. XVII. fig. 2. — W a a g e n , Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 78, Taf. XXXIII. fig. 19. Südalpen, Karnisch.

C. Hoeninghausii v. K l i p s t e i n , Östl. Alpen, 1843, p. 254, Taf. XVI. fig. 20 (Cardita). — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 198. — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 30, Taf. III. fig. 20, 21.

Nec *Opis* Hoeninghausii Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV., 1865, p. 41, Taf. XVI. fig. 1 [= *O. Laubei* B i t t n.], nec v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 223, Taf. IX. fig. 23 [= *O. cf. ladina* B i t t n.]. Südalpen, Karnisch.

C. praeladina F r e e c h , Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 19, Textfig. 21. Bakony, Anisisch.

Subgen. **Cryptocoelopis** Bittner.

Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 34.
 Typ. Opis locularis Bittner (1895).
C. locularis Bittner, l. c. p. 33, Taf. III. fig. 24—27.
 Südalpen, Karnisch.

Subgen. **Protopis** Kittl.

Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 718.
 Typ. Opis triptycha Kittl (1903).
P. triptycha Kittl, l. c. p. 718, Taf. XXIII. fig. 15. — Waagen,
 Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A.
 XVIII/2, 1907, p. 96 (P. an Joannina?).
 Dinariden, Anisisch.

Gen. **Pleurophorus** King.

Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A.
 XVIII/2, 1907, p. 154, 160.

P. Anderssoni Böhm (1903) vide Palaeopharus Anderssoni.
P. angulatus Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 504. Pl. XV. fig. 12, 13.

England, Rhaetisch.

P. cf. angulatus (Moore, non Meek et Worth.) v. Loczy, Wissenschaftl. Ergebn. d. Reise d. Grafen B. Széchenyi i. Ostasien, III. 1899, p. 146, Taf. X. fig. 1, Textfig. 20.
 Yunnan, Karnisch.

P. Blainvillei v. Klipstein, Östl. Alpen; 1843, p. 253, Taf. XVI. fig. 17 (Myophoria). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 41, Taf. IV. fig. 4.
 Südalpen, Karnisch.

P. Curionii v. Haueur, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 561, Taf. VI. fig. 7—12 (Myoconcha) [Cardinia sp. ind. Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, p. 105, 107, Taf. IV. fig. 34—36, Curioni, Sulla succ. norm. d. div. membra d. terr. trias. nella Lombardia, Giorn. Ist. Lomb. Milano, VII. 1855, p. 223, Tav. II. fig. 9 inclus.]. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 131, Tav. XII. fig. 1—7 (Myoconcha). — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 196, Taf. XXIII. fig. 23, 24 (Myoconcha). — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLI. fig. 7 (Myoconcha). — Waagen, Lam. de Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 156, Taf. XXXII. fig. 6—13. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 296, Tav. IX. fig. 13.
 Südalpen, Sizilien, Karnisch.

P. cf. Curionii (Haue.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 112, Pl. XIII. fig. 21.
 Himalaya, Karnisch.

P. sp. ind. aff. Curionii (Haue.) Diener, ibidem, p. 85, Pl. XII. fig. 1.
 Himalaya, Anisisch.

P. elongatus Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 205, Pl. XXXV. fig. 18. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 68, Taf. II. fig. 40. Nec *P. elongatus* Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 504, Pl. XV. fig. 12, 13, Vaughan (1904) [= Cypricardia Marcigniana Mart.], nec Newton, On marine triass. Lam. Malaya Pennins. Proceed. Malacol. Soc. London, IV/3, 1900, p. 133, Pl. XII. fig. 8 [= Modiolopsis gonioides]
 Südalpen, Schweiz, Rhaetisch.

P. Goldfussi v. Schaueroth (1855) vide P. Schauerothi.
P. laevis Philippi, Fauna d. Trigonodus dol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 162, Taf. V.

- fig. 3 (Myoconcha). — Tornquist, Außeralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Wiss. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1110 (Myoconcha). — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 161.
Süddeutschland, Sardinien, Muschelkalk.
- P. perlongus* Böhm (1903) vide Palaeopharus perlongus.
- P. Roemeri* (Eck) Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe, Abhandl., G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 161 vide Myoconcha Roemeri.
- P. Schaurothi** Tornquist, Geol. u. Pal. v. Recoaro, IV. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 138, Taf. III. fig. 6 (Myoconcha) [Typ. P. Goldfussi v. Schaueroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 512, Taf. II. fig. 4, non 1858, p. 320]. — Waagen, Lam. d. Pachycardientuffe etc. Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 161.
- Südalpen, Anisisch.
- P. Stoppanii** Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 68, Taf. II. fig. 39. [Typ. P. sp. ind. Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, p. 205, Pl. XXXV. fig. 19.]
- Südalpen, Schweiz, Rhaetisch.
- P. zealandicus** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 212, Pl. XXI. fig. 6.
- Neuseeland, Karnisch.
- P. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. V/2, Fauna Himal. Foss. V/2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 10, Pl. I. fig. 12.
- Himalaya, Anisisch.
- P. (an Heminajas?) sp. ind.** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 86, Pl. XII. fig. 2.
- Himalaya, Anisisch.

Fam. Megalodontidae v. Zittel.

Gen. **Megalodon** Sow.

[Subgen. *Neomegalodon* v. Guembel, Die Dachsteinbivalve, l. c. p. 325. *Di-Stefano*, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 73 = Subgen. non val. teste Stoppani, l. c. p. 252, Hoernes, l. c. p. 93 inclus.].

- v. Guembel, Die Dachsteinbivalve etc. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, p. 325. — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, Appendix: Sur les grandes bivalves cordiformes aux limites sup. et infér. de la zone à Av. contorta, p. 219, 252. — Hoernes, Ein Beitrag z. Kenntn. d. Megalodonten, Verh. G. R. A. 1876, p. 46. — Hoernes, Mat. z. Monographie d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 92. — Hoernes, Über Analogien d. Schloßapparates von M., Diceas und Caprina, Verh. G. R. A. 1882, p. 180. — Boehm, Beziehungen von Pachyerisma, M. u. Caprina, Zeitschr. D. G. G. XXXIV. 1882, p. 610. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 86.
- M. ampezzanus** Hoernes, Monograph. d. Gattg. M., Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 124, Taf. VII. fig. 4. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 123, Textfig. 137, 138. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LVII. fig. 1.
- Südalpen, Dachsteinkalk, Rhaetisch.
- M. anceps** Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 36, Taf. XV. fig. 4 (Lucina). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 22, Taf. II. fig. 6, 7. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 100, Tav. III. fig. 1.
- Südalpen, Apennin (Salerno), Karnisch.
- M. Boeckhi** Hoernes, Megalodonten aus d. ob. Trias d. Bakony, Földt Közlöny, XXVIII. 1898, p. 183, Textfig. 3 (p. 147), XXIX.

- 1899, p. 355. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 108, Textfig. 123 [var. aequivalvis, l. c. Textfig. 124, 125 inc us.]. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LIII. fig. 1, 2 (var. aequivalvis, fig. 3). — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 87, Textfig. 19.
Südalpen, Bakony, Hauptdolomit, Dachsteinkalk.
- M. Buchii** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 259, Taf. XVII. fig. 4 (Isocardia). — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 97. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/I, 1895, p. 22. Südalpen, Karnisch.
- M. carinthiacus** (Boué) v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 669. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 105, Textfig. 119. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XL. fig. 8. — Frech, ibidem, Taf. LI. fig. 4. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 72. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 31, Taf. V. fig. 4, 5.
Südalpen, Bakony, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. carinthiacus** (Boué) Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, l. c. p. 29. Südalpen, Karnisch.
- M. cassianus** Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 118, Taf. I. fig. 7. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 135, Tav. XII. fig. 13. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 53. — Tausch, Fauna d. Grauen Kalke d. Südalpen, Abhandl. G. R. A. XV/2, 1890, p. 26, Taf. V. fig. 3. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, ibidem, XVIII/I, 1895, p. 22. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, ibidem, XVI/4, 1913, p. 29, Taf. III. fig. 10, XV. fig. 6, 7.
Südalpen, Karnisch.
- M. columbella** M. Hoernes, Über d. Gastropoden u. Acephalen d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, IX. 1855, p. 49, Taf. II. fig. 13 (Pachyerisma). — R. Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, ibidem, XLII. 1880, p. 99, Taf. I. fig. 4, 5 (non M. columbella v. Guembel, Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, p. 374, Taf. VI. fig. 1—11, cf. Hoernes, l. c. p. 100).
Nordalpen, Karnischer Hallstätter Kalk.
- M. complanatus** v. Guembel, Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, Taf. V. fig. 1—6. — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 101, Taf. I. fig. 8 [M. Guembeli Stoppanni, Pal. Lomb. III, Couches à Av. contorta, 1865, p. 252, Pl. LVI. fig. 1—3, caet. exclus. inclus.]. — Tommasi. Rev. fauna dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 108, Tav. XVIII. fig. 1—5. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 104, Textfig. 118. — Mariani, Foss. del Mte. Antelao, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XXXVIII. 1905, p. 570. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LII. fig. 4. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 101. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 74, Tav. IX. fig. 9—15, XII. fig. 4.
Nordalpen, Südalpen, Sizilien, Hauptdolomit, Dachstein-kalk. — Apennin (Salerno), Karnisch.
- M. compressus** v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 224, Taf. IX. fig. 1—3. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 115, Textfig. 130. Nordalpen, Bakony, Karnisch.
- M. cultridens** Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. III/2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 62, Pl. XI. fig. 1.
Himalaya, Rhaetisch?

- M. cuneus** Tommasi, Rivista fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 55, Tav. IV. fig. 7.
Südalpen, Karnisch.
- M. Damesi Hoernes**, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 121, Taf. II. fig. 2, III. fig. 1, IV. fig. 1, V. fig. 2, 3, VI. fig. 1, VII. fig. 2 [M. Damesi-Tofanae, p. 122, Taf. III. fig. 2, 5, IV. fig. 2, VI. fig. 2 inclus.]. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 117, Textfig. 133. — Del Campana, Contr. allo studio d. Trias sup. d. Montenegro, Rendic. Acad. Lincei, Roma, XIII/2, 1904, p. 555. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 88. — Galdieri, Trias d. Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 102, Tav. III. fig. 2.
Südalpen, Bakony, Dachsteinkalk, Rhaetisch. — Dinariden, Apennin (Salerno), Obertrias.
- M. dispar** Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 32 (deest imago). — Südalpen, Karnisch.
- M. dissimilis** Mansuy Contrib. à la géol. du Tonkin, Paléont. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 63, Pl. XI. fig. 8, XII. fig. 1 vide Pomarangina cordiformis.
- M. elymus** Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 82, Tav. XV. fig. 3—5.
Sizilien, Hauptdolomit.
M. eupalliatius Vigh (1914) vide Dicerocardium eupalliatum.
- M. globularis** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 209, Pl. XXI. fig. 17.
Neuseeland, Karnisch.
- M. gryphoides** v. Guembel, Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, p. 372, Taf. IV. fig. 1—3. — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 105. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 119, Textfig. 134, 135 [M. Tofanae Hoernes, l. c. Taf. V. fig. 1, caet. exclus. inclus.] (M. Tofanae var. gryphoides). — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LVI. fig. 1, LVII. fig. 3
Nordalpen, Dachsteinkalk, Rhaetisch.
- M. cf. gryphoides** (Guembel) Frech, l. c. p. 121, Textfig. 136.
Bakony, Dachsteinkalk, Rhaetisch.
- M. Guembeli** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 252, Pl. LVII. fig. 1—3, 5 caet. exclus. [Nom. nov. pr. M. triqueter v. Guembel (non Wulf.), Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, p. 362, Taf. I, II, III. fig. 1—3, caet. exclus.]. — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 105. — Bassani, Foss. nella dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, ser. 2, Vol. V. 1893, p. 11, Tav. I. fig. 19. — Tommasi, Revis. d. fauna d. dol. princ. di Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 166, Tav. XVII. fig. 14, 16—18. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakon. Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 102, Textfig. 114, 115. — Del Campana, Contr. allo studio d. Trias sup. d. Montenegro, Rendic. Acad. Lincei, Roma, XIII/2, 1904, p. 557. — Mariani, Foss. del Mte. Antelao, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1905, p. 570. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, Taf. LIV. fig. 2, 1906. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 86, Taf. XI. fig. 4, 5. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Paont. XXXVIII. 1908, p. 103. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 77, Tav. X. fig. 1—4.
Südalpen, Bakony, Sizilien, Apennin (Salerno), Dinariden, Dachsteinkalk, Hauptdolomit.
- M. cf. Guembeli** (Stopp.) Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, l. c. p. 103, Textfig. 116, var. nov. Textfig. 117.
Südalpen, Dachsteinkalk.

- M. sp. ind. aff Guembeli** (S t o p p.) T o m m a s i , Revis. fauna dol. princ. d. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 109, Tav. XVIII. fig. 6, 7. Südalpen, Hauptdolomit.
- M. Haueri Hoernes**, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 117, Taf. I. fig. 6. Südalpen, Karnisch.
- M. Hoernesi Frech**, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/I, 1904, p. 106, Textfig. 120, 121 (var. elongata, Textfig. 122 inclus.). — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. III. fig. 3. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 104, Tav. III. fig. 3, 4 (var. elongata Frech inclus.). Südalpen, Apennin (Salerno), Bakony, Karnisch.
- M. Hoernesi (Frech) var. bullata Koken**, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 30, Taf. IV. fig. 10. Südalpen, Karnisch.
- M. Hoernesi (Frech) var. rotunda Vigl**, Beitr. z. Kenntn. d. Trias im Kom. Esztergom, Földt. Közl. XLIV. 1914, p. 600, Taf. III. fig. 1. Ungarn (Graner Geb.), Obertria .
- M. infraliasicus (Stopf)** D e l C a m p a n a (1907) vide Lyodus cor.
- M. Klipsteinii Bittner**, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 22, Taf. II. fig. 8 [Isoocardia rimosa (M s t r.) var. elongata v. Klipstein, Ostl. Alpen, 1843, p. 261, Taf. XVII. fig. 10 inclus.]. Südalpen, Karnisch.
- M. Laeckoi Hoernes**, Megalodonten aus d. ob. Trias d. Bakony, Földt. Közl. XXVIII. 1898, p. 184, Textfig. 4 (p. 149), XXIX. 1899, p. 357. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/I, 1904, p. 110, Textfig. 127, 128 [? M. triquier v. Guembel (non Wulf.), Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, Taf. III. fig. 4—6, caet. exclus. inclus.]. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LIV. fig. 4, 5. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/I, 1907, p. 88. Südalpen, Dachsteinkalk. — Bakony, Hauptdolomit.
- M. ladakhensis Bittner**, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. III/2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 56, Pl. XII. fig. 2 [Nom. nov. pr. M. cf. gryphoides Lydekker (non v. Guembel), Geol. of the Kashmir and Chamba terr. Mem. Geol. Surv. India, XXII. 1883, p. 164, Pl. IV. fig. 1—4.]. Himalaya, Rhaetisch ?
- M. lenticularis Koken**, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 30, Taf. VI. fig. 4. Südalpen, Karnisch.
- M. Loczyi Hoernes** (1898), Frech (1904, 1907), v. Arthaber (1906), Galdieri (1908) vide M. Seccoi.
- M. Marianii Di-Stefano**, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1902, p. 79, Taf. XII. fig. 1—3, XIII. fig. 1, 2. Sizilien, Hauptdolomit.
- M. minutus v. Klipstein**, Ostl. Alpen, 1843, p. 261, Taf. XVII. fig. 11 (Isoocardia). — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 107. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 21. Südalpen, Khrnisch.
- M. Mojsvari Hoernes**, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 123, Taf. VII. fig. 3. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/I, 1904, p. 126, Textfig. 140. Südalpen, Dachsteinkalk, Rhaetisch .
- M. Mojsvari (Hoern.) var. incisa** Frech, l. c. 1904, p. 125, Textfig. 139. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, Taf. LVII. fig. 2. Nordalpen, Dachsteinkalk, Rhaetisch .

- M. Paronai Di-Sefano**, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 81, Tav. XI. fig. 1—6 [Nom. nov. pr. M. Secco Parona, Contr. allo studio dei Megalodonti, Atti Soc. Ital. sci. nat. XXX. Milano, 1888, p. 9, Tav. III. fig. 5, 6, caet. exclus.]. Südalpen, Sizilien, Rhaetisch.
- M. Pinellii Tommasi**, Riv. fauna Raibl. Friuli. Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1889, p. 56, Tav. IV. fig. 8. Südalpen, Karnisch.
- M. Poolei Böhm**, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 47, Taf. V. fig. 8, 19. Bäreninsel, Karnisch.
- M. rimosus Graf zu Münster**, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 208, Taf. CXC. fig. 5 (Isocardia). — Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 87, Taf. VIII. fig. 21 (Isocardia). — v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 261, Taf. XVII. fig. 10 (Isocardia). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 39, Taf. XV. fig. 9 (Pachyrisma). — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, ibidem, XLII. 1880, p. 109. — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 136, Tav. XII. fig. 12. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 53. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 19, Taf. II. fig. 1—15. Südalpen, Karnisch.
- M. cf. rimosus (Mstr.) v. Arthaber**, Trias v. Bithynien, Beitr. Pal. Oest. XXVII. 1915, p. 193, Taf. XVIII. fig. 6. — Tula, Schichten m. Gerv. Bouei v. Gaumannmüllerkogel, Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 395, Taf. XII. fig. 12. Anatolien, Nordalpen, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. rimoso (Mstr.) Frech**, Neue Zweischalen etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 20, Textfig. 22. Bakony, Anisisch.
- M. rotundatus Böhm**, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 48, Taf. V. fig. 15, 16. Bäreninsel, Karnisch.
- M. (?) rostratiformis Krumbeck**, Ob. Trias v. Buru, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 64, Taf. IV. fig. 17—22. Indonesien, Norisch.
- M. rostratus Laubé**, (non Isocardia rostrata Mstr.), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 40, Taf. XV. fig. 10 (syn. exclus.) [Pachyrisma]. — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, ibidem, XLII. 1880, p. 109. — Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 54. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 20, Taf. II. fig. 9—11. — Mariani, Contr. allo studio d. bivalvi di Esino, Atti Soc. Ital. sci. nat. XLVI. Milano, 1907, p. 240, Tav. IX. fig. 2. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 108, Tav. III. fig. 6. Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Apennin (Salerno), Ladinisch.
- M. cf. rostratus (Lbe.) Mansuy**, Faunes pal. et trias. de l'Annam et du Tonkin, Mém. Serv. géol. Indochine, II/3, 1913, p. 38, Pl. V. fig. 4. Tonkin, Karnisch.
- M. sp. ind. aff. rostrata (Lbe.) Parona**, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 137, Tav. XII. fig. 14 =? Myophoria Kefersteini, teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. LIII. 1893, p. 670.
- M. scutatus Schafhäutl**, Geogn. Unters. in d. südbayer. Alpen, 1851, p. 145, Taf. XXIII. XXIV. — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 109. — Frech, Neue Zweischalen etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 116, Textfig. 131, 132. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/2, 1906, Taf. LVI. fig. 2. Nordalpen, Rhaetisch.

M. cf. scutatus (Schafh.) Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 191.
Karpathen, Rhaetisch.

M. Seccoi Parona, Contributo allo studio dei Megalodonti, Atti Soc. Ital. sci. nat. XXX. Milano, 1888, p. 5, Tav. V (I), VI (II), VII (III), fig. 1—4 (5, 6 exclus. = M. Paronai). — Rassmuss, Stratigraphie d. Alta Brianza, Koken's Pal. Abh. N. F. X/5, 1912, p. 18 (356), Taf. II (XXXIX), fig. 1, 2. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 84, Tav. XI, fig. 7, XII, fig. 5, 6, XIII, fig. 3, 4, XIV, fig. 1—5, XV, fig. 1, 2 [M. Loczy Hoernes, Megalodonten aus d. ob. Trias d. Bakony, Földt. Közl. XXVIII. 1898, p. 176, Textfig. 1, (p. 140), 2 (p. 145), XXIX. 1899, p. 355, Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LIII, fig. 6, 7, R. Hoernes, in Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 72, 78, Textfig. 94, 95, Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 86, Taf. X, fig. 1—3 (var. elongata, fig. 4), Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 105, Tav. III, fig. 5 inclus.]. — Vigh, Beitr. z. Kenntn. d. Trias im Kom. Esztergom, Földt. Közl. XLIV. 1914, p. 600, Taf. III, fig. 2.

Südalpen, Granergeb., Bakony, Apennin (Salerno), Sizilien, Dachsteinkalk, Hauptdolomit.

M. sp. ind. aff. Seccoi (Par.) Rassmuss, l. c. p. 19 (357), Taf. II. (XXXIX), fig. 3, 4. Südalpen, Norischer Hauptdolomit.

M. Stoppanii Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 110 [Nom. nov. pr. M. columbella v. Gembel (non M. Hoernes)], Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, p. 374, Taf. VI, fig. 1—3]. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. 1904, p. 114, Textfig. 129.

Nordalpen, Dachsteinkalk?

M. subcolumbella Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913 p. 32, (deest imago!). Südalpen, Dachsteinkalk.

M. subtriqueter Fiedler, Verst. aus d. Arlbergschichten bei Bludenz, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, Briefl. Mitt. p. 9 (deest imago!). Nordalpen, Karnisch.

M. Tofanae Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 118, Taf. II, fig. 1, III, fig. 4, IV, fig. 3, VI, fig. 3, 4, 5 (non Taf. V, fig. 1? M. gryphoides). — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 117. — Marianini, Foss. del Mte. Antelao, Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1905, p. 570. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LVI, fig. 3.

Südalpen, Dachsteinkalk.

M. triqueter Wulfen, Abhandl. vom kärnthnerischen pfauen-schweifigen Helmintolith etc. 1793, p. 48, Taf. I, fig. 1, 2 (Cardium). — v. Gembel, Die Dachsteinbivalve, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XLV. 1862, p. 362, Taf. III, fig. 7, 8 (caet. exclus.). — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 110, Taf. I, fig. 2, 3. — Benecke, Über Trias u. Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 157. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 224, Taf. IX, fig. 24, 25. — Skuphoss, Entwicklg. u. Verbr. d. Partnachsichten, ibidem, XLIII. 1893, p. 176, Taf. V, fig. 16, 17 (non fig. 18, teste v. Woehrmann), Raibler Schichten, ibidem, p. 670). — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 98, Textfig. 107. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XLI, fig. 8. — Frech, ibidem, Taf. LI, fig. 3.

Nordalpen, Südalpen, Karnisch.

- M. triqueter** (Wulf.) var. *acuminata* Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, l. c. p. 100, Textfig. 111, 112. — Frech, in v. Arthaber, l. c. Taf. LIII. fig. 5. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 85, Taf. XI. fig. 6. Südalpen, Bakony, Hauptdolomit, Dachsteinkalk.
- M. triqueter** (Wulf.) var. *dolomitica* Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, l. c. 1904, p. 99, Textfig. 108, 109. — Frech, in v. Arthaber, l. c. 1906, Taf. LII. fig. 1, 2. Südalpen, Bakony, Karnischer Dachsteinkalk.
- M. triqueter** (Wulf.) var. *pannonica* Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, l. c. 1904, p. 101, Textfig. 110, 113. — Galdieri, Malacofauna trias. di Giffoni, Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, 1905, XII. ser. 2, No. 17, p. 14, Tav. I. fig. 21. — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 109, Tav. III. fig. 8. Bakony, Apennin (Salerno), Hauptdolomit.
- M. cf. triqueter** (Wulf.) Hoernes, Megalodonten aus d. ob. Trias d. Bakony, Földt. Közl. XXIX. 1899, p. 359. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 31. Bakony, Obertrias, — Südalpen, Karnisch.
- M. truncatus** Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 31, Taf. V. fig. 1. Südalpen, Dachsteinkalk.
- M. sp. ind.** Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 137, Tav. XII. fig. 10, 11. Südalpen, Karnisch.
- M. sp. ind.* Tommasi, Riv. fauna Raibl. del Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 58, Tav. IV. fig. 9, 10 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 671.
- M. (?) sp. ind.** Marianni, Note pal. sul Trias sup. d. Carnia occid. Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. XI. 1893, p. 30, Tav. II. fig. 7. Südalpen, Ladinisch.
- M. sp. ind.** Giattini, Foss. del Lovcen nel Montenegro, Riv. Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 66, Tav. V. fig. 4. Dinariden, Obertrias.
- M. sp. ind.** Tommasi, Revis. fauna dol. princ. Lombardia, Pal. Ital. IX. 1903, p. 110, Taf. XVII. fig. 15. Südalpen, Hauptdolomit.
- M. sp. ind.** Rasmussen, Stratigraphie d. Alta Brianza, Koken Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. X/5, 1912, p. 19, Taf. II. fig. 3, 4. Südalpen, Norischer Dachsteinkalk.
- M. (?) nov. sp. ind.** Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 66, Taf. IV. fig. 23. Indonesien, Norisch.
- Conchodus Stoppanni* (1865), Hoernes (1873, 1876, 1880), Tausch (1892) vide Lycodus.
- C. infraliasicus* Stoppanni (1865), Del Campana (1907) vide Lycodus cor.
- C. Schwageri* Tausch (1892) vide Lycodus. cor.

Gen. **Laubeia** Bittner.

- Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 23
Typ. Cardita strigillata v. Klipstein (1843).
- L. strigillata** v. Klipstein, Östl. Alpen, 1843, p. 255, Taf. XVI, fig. 23 (Cardita). — Laubei, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 35, Taf. XV. fig. 2 (Cyprina). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 26, Taf. II. fig. 13—18. Südalpen, Karnisch.

Gen **Lycodus** Schafhärtl.

Südbayerns Lethaea geogn. 1863, p. 376. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 62.

Syn. *Conchodus Stoppanni*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 246. — v. Guembel, Geogn. Mitt. aus d. Alpen, Sitzber. Akad. Wiss. München, III. 1873, p. 82. — Hoernes, Beitr. z. Kenntn. d. Megalodonten, Verh. G. R. A. 1876, p. 47. — Hoernes, Monogr. d. Gattg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII/2, 1880, p. 106. — v. Tausch, Üb. d. Bivalvengattg. Conchodus etc. Abhandl. G. R. A. XVII/1, 1892, p. 2.

Typ. *L. cor Schafhärtl* (1863) [= *Conchodus infraliasicus Stoppanni* (1865)].

- L. cor Schafhärtl**, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 376, Taf. LXXIII. LXXIV, fig. 1, LXXVIII. fig 2, 3. — v. Zittel, in v. Tausch, Üb. d. Bivalvengattg. Conchodus etc. Abhandl. G. R. A. XVII/1, 1892, p. 6 [*Conchodus infraliasicus Stoppanni*, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 246, Pl. XXXVIII. fig. 3—5, XXXIX. fig. 1—3, XL. fig. 1—5 inclus.]. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 64, Textfig. 90 [*Conchodus Schwageri* v. Tausch, l. c. p. 5, Taf. I. fig. 1—4, II. fig. 1, 2, III. fig. 1, 2 inclus.]. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, p. 328, Taf. XXVII. fig. 4. — Delcampana, Foss. d. dol. princip. d. valle del Brenta, Boll. Soc. geol. Ital. XXVI. 1907, p. 474, (*Megalodon infraliasicus*). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtat. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 190.

Nordalpen, Südalpen, Dachsteinkalk, Rhaetisch. — Karpathen, Rhaetisch.

- L. hungaricus** Hoernes, Megalodonten aus d. ob. Trias d. Bakony, Földt. Közl. XXIX. 1899, p. 352, Textfig. 1, 2 (*Conchodus*). Bakony, Dachsteinkalk.

- L. praeliasicus** Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 66, Textfig. 89, 91. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LVII. fig. 5. Nordalpen, Dachsteinkalk, Rhaetisch.

Pachyrisma columbella Hoernes (1855) vide *Megalodon columbella*.

P. rimosum Laubé (1865) bide *Megalodon rimosus*.

P. rostratum Laubé (1865) vide *Megalodon rostratus*.

Tauroceras tiara Schafhärtl., Beitr. z. näh. Kenntn. d. bayer. Voralpen, Neues Jahrb. f. Min. 1854, p. 550, Taf. VIII. fig. 19 = *Megalodon* sp. ind., teste Hoernes. Monogr. d. Gattg. *Megalodus*, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 110.

Fam. Isocardiidae Gray.

Gen. **Isocardia** Lam.

- I. astartiformis** Münster (1841) vide *Gonodon astartiformis*.
I. (?) Azzarolae Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 51, Pl. V. fig. 8, 9. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 179.

Südalpen, Nordalpen, Rhaetisch.

I. Buchii v. Klipstein (1843) vide *Megalodon Buchii*.

I. carinthiaca Boué (1835) vide *Physocardia carinthiaca*.

I. laticostata Münster (1841) vide *Gonodon laticostatus*.

I. Mandelslohi v. Klipstein (1843) vide *Hoferia simplex*.

I. minuta v. Klipstein (1843) vide *Megalodon minutus*.

I. parvula Stoppanni (1861) vide *Lucina* (?) *parvula*.

- I. (?) perstriata** v. Guembel, Geogn. Beschr. d. bayer. Alpengeb. 1861, p. 407. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 179 (Deest imago!).

- I. plana* Graf zu Münster (1841). = Gen. ind. sp. ind. teste Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1 1895, p. 13.
I. rimosa Münster (1841) vide Megalodon rimosus.
I. rimosa var. elongata v. Klipstein (1843) vide Megalodon Klipsteinii Bittn.
I. rostrata Münster (1841) vide Gonodon rostratus.
Craspedodon Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. 1901, p. 8 vide Conocardia.

Gen. **Conocardia** Koken.

Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 34
 Nom. nov. pr. Craspedodon Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1. 1901, p. 8.

Txp. Craspedodon Hornigi Bittner (1901).

- C. Hornigi** Bittner, l. c. p. 8, Taf. I. fig. 1—9 (Craspedodon). — Frech, Über Diceras-ähnliche Zweischaler, Neues Jahrb. f. Min. 1902/II. p. 131, Taf. IV. fig 4, V. fig. 2 (Physocardia). — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 36, Textfig. 49, 50 (Physocardia). — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LI. fig. 1 (Physocardia). — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 34, Taf. IV. fig. 9, 11.
 Bakony, Südalpen, Karnisch.
C. cf. Hornigi (Bittn.) Toulala, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 111, Taf. VII. fig. 61. (Physocardia). Nordalpen, Karnisch.
C. Verae Frech, Über Diceras-ähnliche Zweischaler. Neues Jahrb. f. Min. 1902/II. p. 131, Taf. IV. fig. 1, V. fig. 1 (Physocardia). — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 34, Textfig. 48 (Physocardia). — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 34. Südalpen, Karnisch.

Gen. **Dicerocardium** Stoppani.

Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 248. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 94. Typ. D. Jani Stoppani (1865).

- D. Curionii** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 251, Pl. LI. LII. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 58, 94, Textfig. 86, 103. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LV. fig. 1. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVII. 1912, p. 88, Tav. XVI. fig. 1—3, XVII. fig. 1—3.
 Südalpen, Nordalpen, Dachsteinkalk. — Sizilien, Hauptdolomit.

- D. sp. ind. ex aff. Curionii** (Stoppani) Frech, l. c. (1904), p. 60, Textfig. 87.

Bakony, Hauptdolomit, Rhaetisch.

- D. dolomiticum** Lorenz, Petref. d. alp. Trias aus d. Südalen, Zeitschr. D. G. G. XVII. 1875, Taf. XXII. fig. 7 (Hemicardium). — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 56, Textfig. 83 [var. Subcurionii Frech, l. c. p. 57, Textfig. 84a, var. Marianii Frech, l. c. p. 57, Textfig. 74c inclus.]. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LIV. fig. 1.
 Südalen, Dachsteinkalk.

- D. sp. ind. aff. dolomitico** (Lor.) Frech, l. c. 1904, p. 58, Textfig. 85. Südalen, Dachsteinkalk.

- D. eupalliatum** Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 51, Textfig. 78, 79, 81a. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LIV.

- fig. 6. — *Vigh*, Beitr. z. Kenntn. d. Trias im Kom. Esztergom, Földt. Közl. XLIV. 1914, p. 600, Taf. III. fig. 3, Textfig. 48 (*Megalodus*).
Südalpen, Dachsteinkalk. — Graner Geb. (Ungarn), Obertrias.
D. Gemmellaroi Di Stefano, La dol. princ. di Palermo. Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 90, Tav. XVI. fig. 4, 5, XVII. fig. 4, 5.
Sizilien, Hauptdolomit.
- D. himalayense** Stoliczka, Geol. seet. Himalaya Mts. etc. Mem. Geol. Surv. India, V/1, 1865, p. 63, Pl. VII. fig. 1. — Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. III/2, 1899, Trias Brach. a. Lam. p. 66, Pl. XII. fig. 1.
Himalaya, Rhaetisch.
- D. himalayense** (Stol.) var. *protracta* Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 62, Textfig. 80. — Frech, in v. Arthaber Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LV. fig. 2.
Südalpen, Dachsteinkalk, (Rhaetisch ?)
- D. incisum** Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 83, Taf. XI. fig. 1—5, XII. fig. 1, XIII. fig. 1, 2, XIV. fig. 1 [D. nov. sp. ind. aff. *mediofasciati* Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias etc. ibidem, 1904, p. 55, Textfig. 82 inclus.].
Nordalpen, Bakony, Dachsteinkalk, Rhaetisch.
- D. incisum** (Frech) var. *cornuta* Frech, l. c. p. 84, Taf. XV, XVI. — *Vigh*, Beitr. z. Kenntn. d. Trias im Kom. Esztergom, Földt. Közl. XLIV. 1914, p. 602, Taf. IV. fig. 1, V. fig. 1.
Bakony, Dachsteinkalk, Rhaetisch. — Graner Geb. Obertrias.
- D. Jani Stoppanni**, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 249, Pl. XLI—L. — Benecke, Üb. Trias u. Jura i. d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. I. 1865, p. 158. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 61.
Südalpen, Dachsteinkalk.
- D. mediofasciatum** Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 52, Textfig. 81b. — Frech, in v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. LV. fig. 4. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schechten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 85, Taf. XI. fig. 2, 3.
Bakony, Hauptdolomit.
- D. sp. ind. aff. mediofasciati* Frech (1904) vide D. incisum.
- D. Ragazzonii** Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 251, Pl. LIII—LV. — Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 61, Textfig. 88.
Südalpen, Dachsteinkalk.
- Gen. *Physocardia* v. Woehrmann.**
- Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 671. — Frech, Üb. Diceras-ähnliche Zweischaler, Neues Jahrb. f. Min. 1902/II, p. 131. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 33.
Typ. Ph. Ogilviae v. Woehrmann (1893).
- P. aequalis** Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 35, Taf VI. fig. 7.
Südalpen, Karnisch.
- Ph. carinthiae** Boué, Sur la const. des prov. Illyriennes, Mém. Soc. géol. France, II. 1835, p. 47, Pl. IV. fig. 5 (Isocardia). — Frech, Üb. Diceras-ähnliche Zweischaler, Neues Jahrb. f. Min. 1902/II. p. 130, Taf. IV.. fig. 2, 3. — Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1907, p. 33, Textfig. 47.
Südalpen, Karnisch.
- Ph. Hornigi* Frech (1902, 1904, 1906), Toulou (1913) vide Cornucardia Hornigi.
- Ph. minor** Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 35, Taf. III. fig. 6, 7, VI. fig. 6.
Südalpen. Karnisch.

Ph. Ogilviae v. W o o c h r m a n n , Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 672, Taf. XIII. fig. 5. — **Koeken**, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 35, Taf. V. fig. 3.

Südalpen, Karnisch.

Ph. sp. ind. **T ou l a**, Kalke vom Jägerhause bei Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 111, Taf. VII. fig. 62, 63.

Nordalpen, Karnisch.

Fam. Tancrediidae Fischer.

Gen. **Tancredia** Lycett.

T. Benecke **P hilippi**, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 173, Taf. VI. fig. 12.

Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

T. Dittmarii **M artin**, Etage rhétien, 1865, p. 281, Pl. III. fig. 7.

Frankreich, Rhaetisch.

T. (Hettangia) chobensis **M an s u y**, Contrib. à la géol. du Tonkin, Paléontol. Mém. Serv. géol. Indochine, 1912, p. 65, Pl. XII. fig. 3.

Tonkin, Rhaetisch.

T. (Hettangia) Garandi **M an s u y**, Contrib. à la géol. du Tonkin, Paléont. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 65, Pl. XII. fig. 2.

Tonkin, Rhaetisch.

T. Marcigniana **M artin**, Paléont. stratigr. de la Côte d'Or, Infralias, Mém. Soc. géol. France, sér. 2, Vol. VII. 1859, p. 80, Pl. III. fig. 10, 11.

Frankreich, Rhaetisch.

T. praenuntia (S t o p p.) **P hilippi** (1898) vide Rhaetidia prae-nuntia.

T. sinemuriensis (M art.) **O o s t e r**, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 71, Taf. II. fig. 8.

Schweiz, Rhaetisch, sonst Lias.

T. (?) triasina v. **S ch a u r o t h**, Schaltierreste d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 124, Taf. VII. fig. 1. — v. **A l b e r t i**, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 147 (syn. exclus.). — **P hilippi**, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 173.

Norddeutschland, Lettenkohle.

Fam. Lucinidae Desh.

Gen. **Lucina** Brug.

Subgen. **Dentilucina** Fischer inclus.

L. (?) alpina **O o s t e r**, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 70, Taf. II. fig. 2.

Schweiz, Rhaetisch.

L. anceps **L a u b e** (1865) vide Megalodon anceps.

L. circularis **S t o p p a n i** (1863), **D u m o r t i e r** (1864), **J a - w o r s k i** (1915) vide L. Stoppaniana.

L. civatensis **S t o p p a n i**, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 123, Pl. XXVIII. fig. 18, 19. — v. **D i t t m a r**, Contortazone, 1864, p. 177 [Astarte rhaetica v. **G u e m b e l**, Geogr. Beschr. d. bayer. Alpengeb. 1861, p. 407 inclus.]. — **C a p e l l i n i**, Foss. infralias. del golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866/67, p. 57, Tav. IV. fig. 6.

Nordalpen, Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

L. Deshayesii v. **K l i p s t e i n**, Östl. Alpen, 1843, p. 22, Taf. VI. fig. 23, d'Oribigny, Prodrome, I. 1849, p. 198 = Gen. ind. sp. ind.

L. donacina v. **A l b e r t i**, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 145, Taf. IV. fig. 3.

Süddeutschland, Lettenkohle.

L. dubia **L a u b e** (1865) vide Leda dubia.

L. duplicata **G r a f z u M ü n s t e r** (1838, 1841), **L a u b e** (1865) vide Hoferia duplicata.

- L. (?) *exigua* Berger, Verst. d. Schaumkalkes am Thüringerwald, Neues Jahrb. f. Min. 1860, p. 199, Taf. II. fig. 8—10 (Myophoria). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 146.
Norddeutschland, Muschelkalk.
- L. *gornensis* Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 139. Tav. XIII. fig. 2 = Gen. ind. sp. ind. (?) Schafhäutlia Mellingi Ha u.). teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 673, Nelli, Il Raibl di Mto. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 220.
- L. (?) Oppelt v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 408 (Deest imago!).
Nordalpen, Rhaetisch.
- L. *Paronai* Del Campana, Foss. dol. princ. valle d. Brenta, Boll. Soc. geol. Ital. XXVI. 1907, p. 475, Tav. XV. fig. 6, 7.
Südalpen, Hauptdolomit.
- L. (?) *parvula* Stoppa n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 51, Pl. V. fig. 10, 11 (Isocardia). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 179.
Südalpen, Rhaetisch.
- L. *plebeia* Giebel (1856) vide Myophoria orbicularis.
- L. *problematica* (Terqu.) De Stefani, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 101.
Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- L. (?) *rhaetica* v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 408. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 178 (Deest imago!).
Nordalpen, Rhaetisch.
- L. *Romani* v. Alberti (1864) vide Anodontophora lettica.
- L. *Salomonis* Tommasi (1894) vide Mysidoptera Salomoni.
- L. *Schmidii* v. Alberti (1864) vide Unicardium Schmidii.
- L. *sphaeroides* Böttger (1880) vide Schafhäutlia sphaeroides.
- L. *Stoppaniana* v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 178 [Typ. L. circularis Stoppa n i (non Geinitz, 1842), Pal. Lomb. III. Couches Av. contorta, 1863, p. 124, Pl. XXIX. fig. 1—4, Dumortier, Terr. jur. bass. du Rhône, I. 1864, p. 38, Pl. VII. fig. 1, 2]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 89, Taf. IV. fig. 64 (L. circularis). — Jaworski, Nuculamerghel v. Misol, Palaeontol. v. Timor, II/5, 1915, p. 121, Taf. XLIV. fig. 18, 19 (L. circularis) [Corbis obscura Bistratam, Unt. Lias i. d. Val Solda, Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. B. XIII. 1903, p. 53, Taf. III. fig. 17—20 inclus.].
Südalpen, Schweiz, Rhaetisch, Ut. Lias. — Indonesien, Norisch.

Subgen. **Dentilucina** Fischer.

- D. *mona* Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 70, Pl. IX. fig. 21.
Burma, Rhaetisch.

- Axinus cloacinus* Moore (1861) vide Isoeyprina (?) Ewaldi.
- A. concentricus* Moore (1861) vide Schizodus concentricus.
- A. depressus* Moore (1861) vide Schizodus depressus.
- A. elongatus* Moore (1861) vide Tapes elongata.
- Corbis aequilateralis* Stoppa n i (1860) vide Mysidoptera aequilateralis.
- C. depressa* Stoppa n i (1861) vide Corbula alpina et Protocardia alpina, Capellini (1867), Vinassa de Regny (1906), Principi (1910) vide Corbula depressa.
- C. Mellingi* v. Hauer (1857) vide Schafhäutlia Mellingi.
- C. plana* Laube (1865) vide Schafhäutlia Laubei.
- C. rugosa* Laube (1865) vide Pachycardia Zittelii.
- Finbria astartiformis* v. Woehrmann (1889, 1893) vide Schafhäutlia astartiformis.
- F. Mellingi* v. Woehrmann (1889, 1892), Parona (1889), Tommasi (1890), Bassani (1893) vide Schafhäutlia Mellingi.

- F. subquadrata* Parona (1889) vide *Unicardium subquadratum*.
Gonodon Schafhäutl (1863), Bittner (1891, 1895, 1901), Salomon (1895), Frech (1907) vide *Schafthäutlia*.
G. Schmidi Hohenstein (non Geinitz), Beitr. z. Kenntn. d. Muschelkalkes am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 67, Taf. I (XII) fig. 12, 13 vide *Schafthäutlia* Hohensteini, fig. 14 vide *Unicardium* Philippi.
G. sp. ind. Diener (1908) vide *Schafthäutlia* Möllingi.

Gen. **Krumbbeckia** Diener.

Zur syst. Stellg. d. PelecypodenGattung Pomarangina, Zentralbl. f. Min. 1915, p. 121.

Typ. *Pomarangina* sp. ind. ex aff. *Haydeni* (Diener.) Krumbbeck (1914) = *Krumbbeckia tambangensis* Diener.

K. tambangensis Diener, l. c. p. 131. [Typ. *Pomarangina* sp. ind. ex aff. *Haydeni* (Diener.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, p. 256, Taf. XVII. fig. 36—38.] Sumatra, Norisch.

Gen. **Scaldia** Ryckh.

S. (?) cassiana Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 225, Taf. XXIV. fig. 24, 25. Südalpen, Karnisch.

Gen. **Schafthäutlia** Cossmann.

Revue crit. d. Paléozool. I. 1897, p. 51. — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe, d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 85 [Nom. nov. pr. *Gonodon* Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 382, Textfig. a, b, c. — Bittner, Triaspotref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 115. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 166. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 12. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 8. — pr. *Gonodus* Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 57.]

Typ. *Gonodon ovatus* Schafhäutl (1863) [non Stoppiani], Jura.

Sch. angulata Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 170, Taf. V. fig. 48 (*Gonodon*). Südalpen, Ladinisch.

Sch. astartiformis Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 87, Taf. VIII. fig. 24 (*Isocardia*). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 37, Taf. XV. fig. 5 (Corbis). — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 226, Taf. IX. fig. 7—9 (Fimbria). — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlerplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 190 (Fimbria). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 667 (*Gonodon*). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 12, Taf. III. fig. 1—4 (*Gonodon*). — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Paleontograph. L. 1904, p. 218, Taf. XXVII. fig. 30, 31 (*Gonodon*). — Wagen, Lam. d. Pachycardientuffe d. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 85. — Willekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Abhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 162, Taf. VI. fig. 11. — Scalia, Il gruppo di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 296, Tav. IX. fig. 14. — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Pal. XVI. 1910, p. 32, Tav. I. fig. 39, 40.

Non Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 63, Taf. VIII. fig. 8 [= *Posidonia* juv., teste Kittl, Italiobiidae etc. ibidem, 1912, p. 8].

Nordalpen, Sizilien, Karnisch. — Südalpen, Karnisch, Ladinisch. — Umbria (Apennin), Rhaetisch.

Sch. sp. ind. aff. astartiformis (M s t r.) B ö h m , Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm 1903, p. 48, Taf. V. fig. 10, 11 (Gonodon).

Bäreninsel, Karnisch.

Sch. cingulata S t o p p a n i , Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 84, Pl. XVI. fig. 20—24 (Cyprina). — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 14 (Gonodon), — B i t t n e r , Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal, 1901, p. 103, Taf. VII. fig. 13 (Gonodon). — M a r i a n i , Contrib. allo studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano 1908 p. 21 (Gonodon). — T o m m a s i Foss. di Ghegna Pal. Ital. XVII. 1911, p. 33 Tav. III. fig. 16 17 (Gonodus).

Südalpen Ladinisch Karnisch. — Bakony, Ladinisch.

Sch. cf. cingulata (S t o p p.) B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 14, Taf. III. fig. 11. (Gonodon).

Südalpen, Karnisch.

Sch. dolomitier F r e e c h , Leitfoss. d. Wurfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 89, Textfig. 20 (Gonodus).

Bakony, Hauptdolomit.

Sch. esinensis S t o p p a n i , Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 85, Pl. XVII. fig. 1—6 (Cyprina).

Südalpen, Ladinisch.

Sch. cf. esinensis (S t o p p.) S a l o m o n , Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 117 (Gonodon).

Südalpen, Ladinisch.

Sch. Hohensteini A s s m a n n , Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias Jahrh. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 627 [Nom. nov. pr. Gonodon Schmidi H o h e n s t e i n , Beitr. z. Kemtn. d. Muschelk. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 67, Taf. I. fig. 12, 13, non 14]. (Gonodon).

Süddeutschland, Muschelkalk.

Sch. laevis S t o p p a n i , Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 86, Pl. XVII. fig. 9 (Cyprina).

Südalpen, Ladinisch.

Sch. lamellosa B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 17, Taf. III. fig. 16 (Gonodon).

Südalpen, Karnisch.

Sch. cf. lamellosa (B i t t n.) G o r t a n i , Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 90, Tav. IX. fig. 3 (Gonodon). — M a r i a n i , Contrib. allo studio d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 8, 21 (Gonodon). — T o m m a s i , Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 34 (Gonodon).

Südalpen, Ladinisch Karnisch.

Sch. laticestata G r a f z u M ü n s t e r , Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 87, Taf. VIII. fig. 25 (Isocardia). — L a u b e , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 39, Taf. XV. fig. 6 (Corbis). — B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 14, Taf. III. fig. 7—9. (Gonodon).

Südalpen, Karnisch.

Sch. Laubei B i t t n e r , Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 14, Taf. III. fig. 5, 6 (Gonodon) [Nom. nov. pr. Corbis plana Laubé , Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 38, Taf. XV. fig. 7, syn. exclus.]. — M a r i a n i , Contrib. allo studio d. bivalvi di Esino etc. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XLVI. 1907, p. 239, Tav. IX. fig. 1 (Gonodon). — W i l c k e n s , Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 163.

Südalpen, Karnisch, Ladinisch.

Sch. Manzavini B i t t n e r , Triaspref. v. Balia, Jahrb. G. R. A. XLI. 1891, p. 115, Taf. II. fig. 4.

Anatolien, Norisch.

Sch. Marianii Tommassi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 34, Tav. III. fig. 18, 19. Südalpen, Karnisch.

Sch. maxima Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 29 (deest imago!) [Gonodon]. Südalpen, Karnisch.

Sch. Mellingi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 549, Taf. III. fig. 1—5 (Corbis). — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 225, Taf. X. fig. 4—6 [Lucina bellena Schafhäutl (non Morris)], Der weiße Jura im Wettersteingeb. Neues Jahrb. f. Min. 1865, p. 794, Taf. VI. fig. 7 inclus.] (Fimbria). — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 140, Tav. XIII. fig. 3, 4 (Fimbria). — Tommasi, Riv. fauna Raibl. d. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 59 (Fimbria). — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 190 (Fimbria). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 673 (Gonodon) [Homomya Bittneri Tommasi, l. c. p. 61, Tav. IV. fig. 12 inclus.]. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 7, Taf. VII. fig. 8—11 (Gonodon). — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 219, Taf. XVII. fig. 32 (Gonodon). — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. Mes. I/3, 1906, Taf. XL. fig. 7 (Gonodus). — Waggen, Lam. d. Pachycardientuffe a. Seiseralm, Abhandl. G. R. A. XVIII/2, 1907, p. 84, Taf. XXXIII. fig. 20, 21. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. 1907, p. 58, Taf. VIII. fig. 10. — Galldieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 113, Tav. III. fig. 9. — Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 161, Taf. VI. fig. 9. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 297, Tav. IX. fig. 15. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 91, Tav. XVII. fig. 6, 7. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 29 (Gonodon). — Vigh, Beitr. z. Kenntn. d. Trias im Kom. Esztergom, Földt. Közl. XLIV. 1914, p. 602. — Jaworski, Nuculamerzel v. Misol, Pal. v. Timor, II/5, 1915, p. 119, Taf. XLIII. fig. 25 (Gonodon) [Gonodon sp. ind. Danner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. V/3, 1908, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 63, Pl. VIII. fig. 3, 4 inclus.].

Nordalpen, Bakony, Himalaya, Karnisch. — Südalpen, Karnisch, Ladinisch. — Sizilien, Karnisch, Hauptdolomit.

— Graner Geb., Sumatra, Indonesien, Norisch.

Sch. Mellingi (Ha u.) var. balatonica Frech, l. c. p. 58, Taf. VIII. fig. 9. Bakony, Ladinisch.

Sch. Mellingi (Ha u.) var. minima Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei vom Gaumannmüllerberg etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 397, Taf. XII. fig. 15. Nordalpen, Karnisch.

Sch. cf. Mellingi (Ha u.) Bassani, Foss. nella dol. trias. di San Severino (Salerno), Atti Acad. sci. fis. mat. Napoli, ser. 2 Vol. V. 1893, p. 13, Tav. I. fig. 22 [Pholadomya rugosa Costa, Note geol. e pal. sui Mti. Picentini, ibidem, ser. 2, T. I. 1861, p. 235, Tav. VI. fig. 16, 19 inclus.] (Fimbria).

Apennin, Rhaetisch.

Sch. cf. Mellingi (Ha u.) Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei etc. l. c. 1909, p. 396, Taf. XII. fig. 13, 14 (Gonodon).

Nordalpen, Karnisch.

Sch. modesta Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 49, Taf. V. fig. 23, 24. Bäreninsel, Karnisch.

Sch. ovata Stoppanni, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 85, Pl. XVII. fig. 7. (Cyprina).

Südalpen, Ladinisch.

Sch. plana Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 87, Taf. VIII. fig. 23 (Isocardia). — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849, p. 189 (Cyprina). — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 169, Taf. V. fig. 47, 49 (Gonodon) [Astarte Antonii Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 47, Taf. III. fig. 6, v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 620, v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 125 inclus.]. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jarhb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 626, Tat. XXXV. fig. 10—12 (Gonodon).

Südalpen, Ladinisch. — Deutschland, Muschelkalk.

Sch. cf. plana (Mstr.) De Lorenzo, Foss. Trias medio di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144.

Basilicata, Ladinisch.

Sch. rostrata Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 87, Taf. VIII. fig. 26 (Isocardia). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 17, Taf. III. fig. 12, 13 (Gonodon). — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 219, Taf. XXVII. fig. 33 (Gonodon). — Wilekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verhandl. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 164, Taf. VI. fig. 6, 7.

Südalpen, Karnisch, Ladinisch.

Sch. (?) rudis Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 18, Taf. III. fig. 14 (Gonodon). — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 220, Taf. XXVII. fig. 29 (Gonodon).

Südalpen, Karnisch.

Sch. sp. ind. aff. rudis (Bittn.) Wilekens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 164, Taf. VII. fig. 5, 6.

Südalpen, Ladinisch.

Sch. (?) rugosa Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 626, Taf. XXXV. fig. 13, 14, XXXII. fig. 9 (Gonodon).

Norddeutschland, Muschelkalk.

Sch. Schafthäutli Diener Nomin. nov. pr. Gonodon ovatus Schafthäutl., Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 382, fig. a—c.

Sch. simplex Tornquist, Recoaro u. Schio, IV. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 141, Taf. III. fig. 5 (Gonodon).

Südalpen, Anisisch.

Sch. sphaeroides Böttger, Tertiaerform. v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. III. 1880, p. 37, Taf. I. fig. 16, 17 (Lucina). — Wanner, Neues über d. Perm-, Trias- u. Juraform. d. Indo-Austral. Archipels, Zentralbl. f. Min. etc. 1910, p. 738 (Gonodon). — Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, Palaeontograph. Suppl. IV, 1914, p. 254, Taf. XVI. fig. 19—22. (Gonodon) [= Sch. Mellungi Haub, teste Jaworski, Nuculamergel v. Misol, Palaeontol. v. Timor. II/5, 1915, p. 119.].

Sumatra, Norisch.

Sch. sp. ind. aff. sphaeroides (Böttg.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, l. c. p. 256, Taf. XVI. fig. 23.

Sumatra, Norisch.

Sch. trigona Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 85, Pl. XVII. fig. 8 (Cryprina).

Südalpen, Ladinisch.

Sch. sp. ind. Tommasi, Nuov. foss. di Sardegna, Boll. Soc. geol. Ital. XV. 1896, p. 499, Tav. XI. fig. 4 (Gonodon).

Sardinien, Karnisch.

Sch. sp. ind. Bittner, Lam. aus d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 94, Taf. VII. fig. 12 (Gonodon).

Bakony, Anisisch.

Sch. (?) sp. ind. Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 120, Taf. VII. fig. 2.

Aragonie (Hispania) Muschelkalk.

Gen. **Storthodon** Giebel.

Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 50.

Typ. St. liseaviensis Giebel (1856).

St. liseaviensis Giebel, l. c. p. 50, Taf. IV. fig. 13.

Deutschland, Muschelkalk.

Gen. **Unicardium** d'Orbigny.

U. Credneri Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 48, Taf. VI. fig. 8 (Lucina). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, Heft 3. XXXVI/1, p. 628.

Deutschland, Muschelkalk.

U. Philippii Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 629, Taf. XXXV. fig. 21 [Nom. nov. pr. U. Schmidii Philippi, Fauna d. unt. Trigonodusdol. etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. LIV. 1898, p. 175, Taf. V. fig. 9, Gondon Schmidii Hohenstein, Beitr. z. Kenntn. d. Muschelk. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1915, p. 67 (239), Taf. I (XII), fig. 14, non 12, 13, inclus.].

Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.

U. rectangulare Ahlburg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. Heft 50, 1906, p. 65, Taf. II. fig. 1 [Venus ventricosa Dunker, Über d. im Muschelkalk Oberschles. gef. Mollusken, Palaeontograph. I. 1851, p. 301, Taf. XXXV. fig. 8 inclus.]. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 628, Taf. XXXV. fig. 19, 20.

Deutschland, Röth, Muschelkalk.

U. Schmidii Geinitz, Über ein. Petref. d. Zechsteins etc. Neues Jahrb. f. Min. 1842, p. 577, Taf. X. fig. 9 (Area). — v. Schauert, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1858, p. 323, Taf. II. fig. 16 (Area). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 635 (Pholadomya). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 145, Taf. IV. fig. 1 (Lucina). — Wallther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsandst. etc. v. Jena, 1906, p. 32, Taf. VII. fig. 42. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. IX. fig. 14, XI. fig. 10. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 105. — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 113, Taf. VI. fig. 21. — Paulcke, Helvet. Trias, Geol. Rundschau, VI. 1915, p. 215. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 628, Taf. XXXV. fig. 16—18. Nec U. Schmidii Philippi (1898) [= U. Philippii] nec U. Schmidii Ahlburg (1906).

Deutschland, Röth bis Unterkeuper. — Aragonia (Hispania), Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

U. (?) subquadratum Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 141, Tav. XIII. fig. 5 (Fimbria). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 674 (Gonodon). — Galderi, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 116, Tav. III. fig. 10 (Gonodus) [Gonodus Meltingi Galderi, Malacofauna trias. di Giffoni, Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, 1905, XII. ser. 2, No. 17, p. 12, Textfig. 12 inclus.]. — Koken, Schichten v. Heiligenkreuz, Abhandl. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 36, Taf. IV. fig. 1. Südalpen, Apennin (Salerno), Karnisch.

U. (an Schafhäutlia?) sp. ind. aff. subquadrato (Par.) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 170, Taf. V. fig. 46 (Gonodon).

Südalpen, Ladinisch.

Fam. Conocardiidae Neumayr.

Gen. **Conocardium** Bronn.

C. superstes Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 15, Pl. III, fig. 1. Burma, Rhaetisch.

C. (?) sp. ind. Healey, Fauna of the Napeng beds, I. e. p. 76, Pl. IX, fig. 41. Burma, Rhaetisch.

Fam. Praecardiidae Hoernes.

Cardiola Brod.

C. (?) dubia v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 103, Taf. I, fig. 10. Deutschland, Ob. Muschelkalk.

Fam. Cardiidae Lam.

Gen. **Cardium** Linne.

C. alpinum v. Gembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 407. — v. Dittmar, Contortazone 1864, p. 176 (Deest imago!). Nordalpen, Rhaetisch.

C. apiculatum Costa (1864) vide Cardita cf. crenata.

C. barnense Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 47, Pl. IV, fig. 12, 13. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 177. Südalpen, Rhaetisch.

C. cloacinum Quenstedt, Der Jura, 1856, p. 31, Taf. I, fig. 37. — Oppol et Suess, Aequival. d. Kössener Schichten i. Schwaben, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, Taf. II, fig. 2. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 143. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 176 [*C. cloacinum* Stoppanni, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 125, Pl. XXIX, fig. 10 exclus., Cardita austriaca Stoppanni, ibidem, 1861, p. 53, Pl. VI, fig. 9, 10 (non 1—8) inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 236. — Pflücker, Das Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 414, Taf. VII, fig. 5. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 70, Taf. IV, fig. 9. — Vaughan, in Reynolds et V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 207, Textfig. 6. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV, fig. 12.

England, Frankreich, Süddeutschland, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.

C. cullatum Stoppanni (1861) vide C. reticulatum.

C. dubium Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 90, Taf. VIII, fig. 27 = sp. inval. (= ? Pichleria polyglypha, teste Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 62, Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 129.).

C. elatum Costa (1864) vide Cardita cf. crenata.

C. harpa (Mstr.) Goldfuss (1838) vide Myophoria harpa.

C. ladinum Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 225, Taf. XXIV, fig. 26. Südalpen, Karnisch.

C. Martini Böttger, Tertiaerform. v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. III. 1880, p. 35, Taf. I, fig. 2, 3. — Krumbeek, Ob. Trias v. Sumatra, ibidem, Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 257, Taf. XVI, fig. 24—27, XVII, fig. 27. Sumatra, Norisch.

C. Nequam Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 74, Pl. IX, fig. 30—34. Burma, Rhaetisch.

- C. nuculoides* Stoppa (1861) vide *Protocardia rhaetica*.
C. obliquum Costa (1864) vide *Cardita crenata*.
C. pentagonum Stoppa (1861) vide *Cardita austriaca*.
C. petaloideum Costa (1864) vide *Cardita petaloidea*.
C. phaseolus Stoppa (1861) vide *Cardita minuta*.
C. Philippianum Quenstedt (1856) [non Dunker, 1847],
 Stoppa (1861) vide *Protocardia rhaetica*.
C. (?) Ragazzonii Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 47, Pl. IV. fig. 16, 17. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 177. — Capellini, Foss. infralias. d. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866/67, p. 58. Südalpen, Apennin, Rhaetisch.
C. reticulatum v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 177, Taf. III. fig. 5 [*C. cucullatum* Stoppa (non Goldfuss), Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 50, Pl. V. fig. 5, 6, inclus.]. — Martin, Etage rhetien, 1865, p. 237 [non *C. cucullatum* Stoppa].
 Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.
C. cf. reticulatum (Dittm.) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 71, Taf. II. fig. 10, 11. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subatrat. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 194.
 Schweiz, Karpathen, Rhaetisch.
C. rhaeticum Merian (1853), Winkler (1861), v. Albert (1864), v. Dittmar (1864), Renevier (1865), Ooster (1869), Vaughan (1904), Vinassa de Regny (1906), Principi (1910) vide *Protocardia rhaetica*.
C. (?) rhynchonelloides Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 46, Pl. IV. fig. 10, 11.
 Südalpen, Rhaetisch.
C. Soldani Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 125, Pl. XXIX. fig. 11, 12.
 Südalpen, Rhaetisch.
C. Stoppanii Renevier, Notes géol. et pal. sur l. Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, T. VIII. 1864, p. 23, Pl. I. fig. 3.
 Westschweiz, Rhaetisch.
C. (?) sp. ind. I. Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1860, p. 50, Pl. V. fig. 1, 2, II. l. c. p. 50, Pl. V. fig. 3, 4 = Gen. ind. sp. ind.

Gen. **Carnidia** Bittner.

Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 6.
 Typ. *C. pannonica* Bittner (1901).

C. pannonica Bittner, l. o. p. 6, Taf. VII. fig. 14.
 Bakony, Karnisch.

Hemicardium dolomiticum Loretz (1875) vide *Dicerocardium dolomiticum*.

Gen. **Myophoricardium** v. Woehrmann.

Fauna d. Carditaschichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 226.
 — Cossmann, Sur l'évolution des Trigones, Annales de Paléontol. VII/2, 1912, p. 65.

Typ. *M. lineatum* v. Woehrmann (1889).

M. lineatum v. Woehrmann, l. c. p. 227, Taf. X. fig. 10—14, [Cypocardia rostrata Schafhäutl, Südbayerns Leth. geogn. 1865, p. 380, Taf. LXV. fig. 18 inclus.]. — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/I, 1895, v. 117, Taf. XIII. fig. 18—22. — Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei vom Gau-mannmüllerkogel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 397, Taf. XII. fig. 16. — Scalia, Il gruppo del Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XXVIII. 1909, p. 299, Tav. IX. fig. 20.
 Nordalpen, Südalpen, Sizilien, Karnisch.

M. sublineatum K r u m b e c k , Ob. Trias v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, 1914, p. 358, Taf. XVI. fig. 28.

Sumatra, Norisch.

Gen. **Protocardia** Beyr.

P. carinata P f l ü c k e r , Das Rhaet. v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 418 (Deest imago!).

Norddeutschland, Rhaetisch.

P. contusa H e a l e y , Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 71, Pl. IX. fig. 22—29.

England, Burma, Rhaetisch. — Tonkin, Lias.

P. sp. ind. aff contusae (H e a l .) K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 67, Taf. IV. fig. 24—28.

Indonesien, Norisch.

P. Ewaldi P f l ü c k e r (1868), L u n d g r e n (1878) vide Isoey-prina Ewaldi.

P. Philippiana (D u n k e r , 1847) O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 70, Taf. IV. fig. 7. — C o s s - m a n n , Infralias de Deux Sèvres, II. p. 529, Pl. XVII. fig. 19, 20. Non D i - S t e f a n o , Lo schisto marnoso con Myoph. vestita d. Punta delle pietre nere, Boll. Com. geol. Ital. XXVI. 1895, p. 30 [= *P. rhaetica*, teste H e a l e y , Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 73.].

Frankreich, Westschweiz, Rhaetisch, sonst Lias.

P. praecursor P f l ü c k e r (1868), L u n d g r e n (1878) vide Taeniodon praecursor.

P. proteus K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 69, Taf. V. fig. 2—10.

Indonesien, Norisch.

P. rhaetica M e r i a n , in E s c h e r , Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg. Nouv. Mémi. Soc. helvét. sci. nat. XIII. 1853, p. 19, Taf. IV. fig. 40, 41 (Cardium). — W i n k l e r , Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 402, Taf. VII. fig. 14 (var. erecta inclus.) [Cardium]. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 176 (Cardium) [C. Philippianum Quenstedt (non D u n k .), Der Jura, 1856, p. 31, Taf. I. fig. 38. S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 48, Pl. IV. fig. 18—25, C. nuculoides S t o p p a n i , l. c. p. 49, Pl. IV. fig. 26—29, Corbis depressa S t o p p a n i , l. c. p. 51, Pl. V. fig. 12—16 inclus.]. — v. A l b e r t i , Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 143 (Cardium). — R e n e v i e r , Notes géol. etc. sur les Alpes Vaud. I. Infralias, Bull. Soc. Vaud. sci. nat. Lausanne, VIII. 1865, p. 60 (Cardium). — P f l ü c k e r , Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 417 (Cardium). — O o s t e r , Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 70, Taf. IV. fig. 8 (Cardium). — S i m o n e l l i , Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5 T. II. 1891, p. 14, Tav. I. fig. 4. — C h e c c h i a - R i s p o l i , Nuove osservazioni sulla fauna trias. d. Punta d. Pietre nere Boll. Soc. geol. Ital. XX. 1901, p. 144, Textfig. . — V a u g h a n , in R e y n o l d s et V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 208. — V i n a s s a d e R e g n y , Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 841 (Cardium). — G a l d i e r i , Sul Trias dei dintorni di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 67, Tav. II. fig. 2, 3. — H e a l e y , Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 73 [Cardium Philippianum D i - S t e f a n o , Lo schisto marnoso con Myoph. vestita d. Punta d. Pietre nere, Boll. Com. geol. Ital. XXVI. 1895, p. 30 inclus.]. — T r a u t h , Grestener Schichten d. niederösterr. Voralpen, Beitr. Pal. Österr. XXII. 1909, p. 113. — P r i n c i p i , Foss. retici d'Amelia. Riv. Ital.

di. Paleont. XVI. 1910, p. 30, Tav. I, fig. 34, 35 (Cardium). — J a w o r s k i , Nuculamerget v. Misol, Palaeontol. v. Timor, II/5, 1915, p. 122, Taf. XLIV. fig. 15, 16. — G o e t e l , Rhaet. Stufe d. subtatra. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 192 (var. longistriata, l. c. p. 193, Taf. IX. fig. 7 inclus.).

England, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch. — Indonesien, Norisch.

P. cf. *rhaetica* (Mer.) Di-Stefano, Lo schisto marnoso con Myoph. vestita d. Punta d. Pietre nere, Boll. Com. geol. Ital. XXVI. 1895, p. 27, Tav. I. fig. 20—22, II. fig. 29 (Cardium). Apulia, Karnisch.

Fam. Cyprinidae Lam.

Gen. *Anisocardia* Mun. Chalm.

A. *parvula* Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 213, Pl. XXII. fig. 6, 7. Neuseeland, Karnisch.

Gen. *Cypricardia* Lam.

C. *alpina* v. G u e m b e l , Bayer. Alpengeb. 1861, p. 408. — v. D i t t m a r , Contortazone, 1864, p. 180 (Deest innago!). Nordalpen, Rhaetisch.

C. angulata (Moore) Martin (1865) vide Pleurophorus angulatus. C. *Beyrichii* Tornquist, Recoaro u. Schio, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 672, Taf. XXII. fig. 5.

Südalpen, Ladinisch.

C. *Bittneri* Tornquist, Recoaro u. Schio, IV. Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 140, Taf. III. fig. 8.

Südalpen, Anisisch.

C. *Breoni* Martin, Paleont. strat. Côte d'Or, Infralias, Mém. Soc. géol. France, sér. 2. T. VII. 1859, p. 81, Pl. III. fig. 17, 18. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 179. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 233.

Frankreich, Nordalpen, Rhaetisch.

C. *Buchlii* Tornquist, Recoaro u. Schio, II. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 671, Taf. XXII. fig. 3, 4 [C. cf. Escheri Philipp, Grignageb. ibidem, XLVIII. 1896, p. 726 inclus.].

Südalpen, Ladinisch.

C. *decurtata* Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 490, Taf. IX. fig. 5.

Nordalpen, Rhaetisch.

C. *Escheri* Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 54, Taf. III. fig. 7, IV. fig. 14 (Cyprina). — v. S e e b a c h , Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 622, Taf. XV. fig. 1. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 127. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI, Heft 3, p. 629, Taf. XXXVI. fig. 1, 2.

Non C. Escheri Renevier (1854) [= *Myacites Escheri*]. Deutschland, Muschelkalk, Unterkeuper.

C. cf. *Escheri* Philipp (1896) vide C. Buchlii. C. (?) *fassaensis* Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 165, Taf. VII. fig. 1.

Südalpen, Ladinisch.

C. *Marcigniana* Martin, Paléont. strat. Côte d'Or, Infralias, Mém. Soc. géol. France, sér. 2, T. VII. 1859, p. 80, Pl. III. fig. 12. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 177 [Pleurophorus elongatus Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 504, Pl. XV, fig. 12, 13 inclus.]. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 279, Pl. III. fig. 6 (Cyprina). — Ooster,

- Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 67, Taf. II. fig. 38. — Vaughan, in Reynolds et V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1904, p. 205, Textfig. 5 (Pleurophorus elongatus). England, Frankreich, Westschweiz, Rhaetisch.
- C. Rablensis* Greider (1863), v. Guembel (1873) vide Trigonomorphus Rablensis.
- C. Renevieri Martin**, Etage rhétien, 1865, p. 273, Pl. I. fig. 3 (Panopaea). — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 67, Taf. II. fig. 18. Frankreich, Schweiz, Rhaetisch.
- C. rostrata* Schafhäutl (1863) vide Myophoricardium lineatum.
- C. suevica Oppel et Suess**, Aequivalente d. Kössener Schichten in Schwaben, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, p. 549. Taf. I. fig. 4. Süddeutschland, Rhaetisch.
- C. sp. ind.** Levallouis, Couches de jonction du Trias et du Lias, Bull. Soc. géol. France, XXI. 1864, p. 395, Pl. VI. fig. 5—7. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 234. Frankreich, Rhaetisch.

Gen. **Cyprina** Lam.

- C. cingulata* Stoppani (1860) vide Schafhäutlia cingulata.
- C. Escheri* Giebel (1856) vide Cypriocardia Escheri.
- C. laevis* Stoppani (1860) vide Schafhäutlia laevis.
- C. lens** Stoppani Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 45, Pl. IV. fig. 5. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 178. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 233. Frankreich, Südalpen, Rhaetisch.
- C. Marcigniana* Martin, Etage rhétien, 1865, p. 279, Pl. III. fig. 6 vide Cypriocardia Marcigniana.
- C. ovata* Stoppani (1860) vide Schafhäutlia ovata.
- C. Purae** Stoppani, Pal. Lomb. II. Couches à Av. contorta, 1863, p. 124, Pl. XXIX. fig. 5, 6. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 233. Südalpen, Rhaetisch.
- C. Stoppanii** Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 66, Taf. II. fig. 37 [Cyprina sp. ind. Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 125, Pl. XXIX. fig. 7, 8 inclus.]. Schweiz, Südalpen, Rhaetisch.
- C. strigillata* Laubé (1865) vide Lauberia strigillata.
- C. trigona* Stoppani (1860) vide Schafhäutlia trigona.
- C. (?) Tschani** Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 67, Taf. II. fig. 1. Schweiz, Rhaetisch.
- C. sp. ind.** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 125, Pl. XXIX. fig. 7, 8 vide C. Stoppanii.
- C. (?) div. sp. ind.** Stoppani, l. c. 1860, p. 46, Pl. IV. fig. 6—9 = Gen. ind. sp. ind.

Gen. **Isocyprina** Röder.

- I. Ewaldi** Bornemann; Liasform. i. d. Umgegend v. Göttingen, 1854, p. 66 (Taeniodon). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 119 (Myophoria?). — Pflücker, Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 415, Taf. VII. fig. 6 (Protocardia) [Opis cloacina Quenstedt, Der Jura, 1856, p. 31, Taf. I. fig. 35. Schizodus cloacinus Oppel et Suess, Aequival. d. Kössener Schichten i. Schwaben, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXI. 1856, Taf. II. fig. 7, Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 475, Taf. VII. fig. 6, Axinus cloacinus Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 502, Pl. XV. fig. 16 inclus.]. — Ooster, Rhaet.

Stufe, v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 64 (Schizodus). — Lungdren, Faunan i. d. stenkolsför. form. v. Skano, kgl. fysiogr. selsk. minneskr. Lund, 1878, p. 47, Taf. I. fig. 6 (Protocardia). — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 630 (Schizodus). — Vaughan, in Reynoldset V., The Rhaetic of the S. Wales direct line, Quart. Journ. Geol. Soc. London, LX. 1901, p. 208. (Schizodus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 5 (Taeniodon). — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 839 (Schizodus). — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Déc. 1916, p. 194. England, Deutschland, Scania (Südschweden), Schweiz, Nordalpen, Karpathen, Apennin, Rhaetisch.

- I. cf. Ewaldi (Bornem.) Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 65, Pl. IX. fig. 13—15. Burma, Rhaetisch.
- I. Germari (Dunkl.) Lundgren, Faunan i. d. stenkolsför. form. i. Skano, kgl. fysiogr. selsk. minneskr. Lund, 1878, p. 56, Taf. II. fig. 78 (Mesodesma). — Lundgren, Mollusk faun. i. Sveriges äldre mesoz. bild., Lunds Univers. Arsskr. XVII. 1881, p. 44 (Mesodesma). — Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 239, Tav. VII. fig. 33 (var. depressa, l. c. p. 240, Tav. VII. fig. 34, 35 inclus.). Scania (Südschweden), Apennin, Rhaetisch, sonst Lias.
- I. manca Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 66, Pl. IX. fig. 12. Burma, Rhaetisch.
- I. Rothpletzi Merciai, Foss. di Mte. Malbe, Atti Soc. Tosc. sci. nat. Pisa, XXIV. 1908, p. 240, Tav. VII. fig. 36. Apennin, Rhaetisch.

B. Sinupalliata.

Fam. Donacidae Desh.

Donax costata Zenker (1833) vide *Myophoria costata*.

Gen. Rhaetidia Bittner.

- Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 222. — Coessmann, Revue de Paléozool. I. 1897, p. 54.
Typ. R. Zittelii Bittner (1895).
- R. praenuntia Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 82, Pl. XVI. fig. 14, 15 (Corbula). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 224. — Philipp, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkd. Würt. 1898, p. 174 (Tancredia). Südalpen, Ladinisch.
- R. Salomoni Bittner, Lam. v. St. Cassian, l. c. p. 224, Taf. XXIV. fig. 20 [Nom. nov. pr. Tellina (?) praenuntia Salomon (non Stoppani), Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 171, Taf. V. fig. 40, 41.] Südalpen, Ladinisch.
- R. Zittelii Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 223, Taf. XXIV. fig. 21—23. — Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 221, Taf. XXVII. fig. 43. Südalpen, Karnisch.

Fam. Maetridae Desh.

Mactra securiformis Stoppani (1861) vide *Anatina* Baldassari.
M. trigona v. Ziehen (1830) vide *Myophoria ovata* var. *trigona*.

Fam. Mesodesmidae Desh.

Mesodesma Germari Lundgren (1878, 1881) vide Isocyprina Germari.

Fam. Solenidae Lam.

Solen caudatus v. Hauer (1857) vide *Cuspidaria gladius*.

Fam. Tellinidae Lam.

Gen. **Tellina** Linne.

Telliniles anceps v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 189, Nachträge, 1822, II. Taf. XXXIII. fig. 5 vide *Unicardium Schmidii* Gein., teste v. Eck, Form. d. bunt. Sandst. etc. i. Oberschlesien, 1865, p. 57.

Tellina (?) *bavarica* Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XII. 1861, p. 485, Taf. VIII. fig. 4. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 184 [Nucula Matani Stoppiani. Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 129, Pl. XXX. fig. 7 inclus.]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 64, Taf. II. fig. 23.

Süddeutschland, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch. *T. canaliculata* Catullo (1843) vide *Anodontophora canalensis*.

T. edentula Giebel, Verst. im Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 53, Taf. IV. fig. 4—7. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 147. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 630, Taf. XXXVI. fig. 3.

Deutschland, Muschelkalk.

T. praenuntia Salomon (1895), Philipp (1898) vide *Rhaetidia Salomoni*.

T. sp. ind. v. Hauer, Üb. d. von Berg. Fuchs i. d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien II. 1850, p. 4, Taf. I. fig. 7 vide *Anodontophora canalensis*.

Fam. Veneridae Gray.

Gen. **Tapes** Megerle (**Pullastra** Sow.).

T. elongata Moore, Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVI. 1861, p. 503, Pl. XV. fig. 18 (Axinus). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 277, Pl. III. fig. 3 (*Pullastra* [Cypriocardia porrecta] Dumortier, Dép. jur. bass. du Rhône, I. Infralias, 1864, Pl. VI. fig. 1—7 inclus.]. — Hébert, Recherches sur l'âge des grès à combustibles d'Helsingborg, Annales sci. géol. Paris, 1869, p. 22, Pl. II. fig. 21, 22. — Lundgren, Faunan i. d. stenkolsför. form. i. Skane, Fysiogr. sellsk. minneskr. Lund, 1878, p. 51, Taf. I. fig. 1, 2, II. fig. 80, 81 (*Pullastra*). — Lundgren, Molluskfaunan i. Sveriges äldre mesoz. bildn. Lunds Univers. Arsskr. XVII. 1881, p. 43 (*Pullastra*). — Simonelli, Foss. retici di Cetona, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 5, T. II. 1891, p. 234. England, Frankreich, Scania (Südschweden), Apennin, Rhaetisch.

T. subundata v. Schaueroth (1855) vide *Myophoriopsis* (*Pseudocorbula*) *subundata*.

Gen. **Venus** Linne.

V. (?) biplicata Schafhärtl, Beitr. z. näh. Kenntn. d. bayer. Voralpen, I. Neues Jahrb. f. Min. 1853, p. 319. — Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 484, Taf. VII. fig. 13. Nordalpen, Rhaetisch.

V. donacina Goldfuss (1838), Bornemann (1856) vide *Anodontophora donacina*.

V. (?) probabilis Martin, Etage rhétien, 1865, p. 276, Pl. III. fig. 2. Frankreich, Rhaetisch.

V. ventricosa Dunker (1851) vide *Unicardium rectangulare*.

Subordo: Desmodonta Neumayr.

Fam. Grammysiidae Fischer.

Gen. Cardiomorpha de Koninck.

- C. (?) **gymnitum** Kittl, Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 716, Taf. XXIII. fig. 16, 17. Dinariden, Anisisch.
 C. (?) **Haydeni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 10, Pl. I. fig. 10, 11.
 C. (?) **nuggetensis** Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 189, Pl. XXI. f. 7. Neuseeland, Karnisch.

Fam. Solenopsidae Neumayr.

Gen. Palaeopharus Kittl.

Triasfoss. vom Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. No. 3, Kristiania, 1907, p. 37.

Typ. P. Scheii Kittl (1907).

- P. Anderssoni Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 45, Taf. IV. fig. 4—7, 9, 10 (Pleurophorus). Bäreninsel, Karnisch.
 P. perlóngus Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, l. c. p. 46, Taf. IV. fig. 1—3, 8 (Pleurophorus). Bäreninsel, Karnisch.
 P. Scheii Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, l. c. p. 35, Taf. III. fig. 1—4. Ellesmereland, Karnisch.

Gen. Solenopsis Mc Coy.

- S. (?) sp. ind. Teller. Pelecypodenfauna v. Werchojansk. in „Arkt. Triasfaunen“, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. 7, T. XXXIV. No. 6. 1886, p. 136, Taf. XX. fig. 2. Nordsibirien, Norisch.

Sanguinolaria recta v. Guembel (1861) vide Anodontophora recta.

Fam. Solenomyidae Gray.

Gen. Solenomya Lam.

- Frech, Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 18.
 S. abbreviata Frech, Neue Zweischaler etc. l. c. p. 19, Textfig. 20. Bakony, Anisisch.
 S. Scialai Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 94, Tav. XII. fig. 7. Sizilien, Hauptdolomit.
 S. Semseyana Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 14, Taf. VIII. fig. 21—24. Bakony, Karnisch.
 S. sp. ind. Bittner, Die Tertiäralagerungen von Trifail etc. Jahrb. G. R. A. XXXIV. 1884, p. 472. Südalpen, Anisisch (?)

Fam. Anthracosiidae Amalitzky.

Gen. Anodontophora Cossmann.

Revue crit. de Paléozool. I. 1897, p. 51 [Nom nov. pr. Anoplophora Sandb.]. — v. Koenen, Über d. Gattg. Anoplophora etc. Zeitschr. D. G. G. XXXIII. 1881, p. 680 (Anoplophora). — v. Koenen, Über Anoplophora, ibidem, XXXV. 1883, p. 624 (Anoplophora). —

Cheechia-Rispoli, Nuove osservazioni sulla fauna trias. d. Punta delle Pietre nere, Boll. Soc. Ital. XX. 1901, p. 147 (Anoplophora). — **Frech**, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 55 (Anoplophora).

A. (an **Homomya?**) **Albertii** **Assmann**, Brach. u. Lam. d. ober-schles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 617, Taf. XXXIV. fig. 8—12 (Anoplophora).

Norddeutschland, Muschelkalk.

A. angulata **Trechmann**; Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 208, Pl. XXI. fig. 10.

Neuseeland, Karnisch.

A. brevis (Schauhr.) **Langenhan**, Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, A. v. Koenen - Festschr. 1907, p. 120, Taf. IV. fig. 8, 9 vide A. lettica.

A. canalensis **Catullo**, Mem. geogn. pal. s. Alpi Venete, 1848, p. 56, Tav. IV. fig. 4 (Tellina). — v. **Schauroth**, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicentin, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 327, Taf. II. fig. 17 (Myacites). — **Bonecke**, Über ein.. Muschelk. Ablagerungen d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 27 (Tellina). — **Omboni**, Foss. trias. del Veneto, Atti Ist. Ven. sci. etc. Vol. VIII. ser. 5, 1882, p. 11 (Tellina). — **Tommasi**, II Trias infer. d. nostre Alpi, 1882, p. 64, Tav. I. fig. 10 (Pleuromya). — **Tommasi**, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 63, Tav. IV. fig. 5 (Pleuromya). — **Bittner**, Verst. d. Süd-Üssurige. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 23, Taf. III. fig. 34—38 (Myacites) [Myacites mactroides v. Schauroth, l. c. p. 328, Taf. II. fig. 18 inclus.]. — **Bittner**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 85, Taf. IX. fig. 11, 12 (Myacites). — **Philipp**, Pal. geol. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 52, Taf. II. fig. 1. — **Frech**, Nachträge zu Cephal. u. Zweischalern d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1905, p. 10, Textfig. 15. — **Frech**, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 40, Taf. VII. fig. 2 (Pleuromya). — v. **Wittenburg**, Werfener Schichten Südtirols, Koenens Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 33 (281), Taf. V (XL), fig. 6. — **Simionescu**, Fauna trias. infer. Dobrogea, Acad. Rom. Publ. Adamachi, V. Boucarest, 1911, p. 67, Textfig. 4 (Myacites). — v. **Wittenburg**, Werfener Schichten Spitzbergens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1912, p. 947.

Südalpen, Bakony, Dobrudscha, Spitzbergen, Ussuribucht, Skythisch.

A. cf. canalensis (Cat.) **Toulou**, Schichten m. Gerv. Bouei vom Gaumannmüllerkogel etc. Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 393, Taf. XII. fig. 10. — **Wurm**, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 119. — v. **Wittenburg**, Untertriad. Aufsamml. an der Teplaja, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1911, p. 1084.

Nordalpen, Karnisch. — **Aragonie** (*Hispania*), Muschelkalk. — Sibirien (Gouv. Jenisseisk), Skythisch.

A. convexa **Mansuy**, Foss. terr. més. Sam Nena, Mém. Serv. géol. Indochine, VII/1, 1919.

Indochina, Obertrias.

A. donacina v. **Schlothheim**, in Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 242, Taf. CL. fig. 3 (Venus). — **Bornemann**, Organ. Reste d. Lettenkohle Thüringen, 1856, p. 16, Taf. I. fig. 7, (Venus). — v. **Koenen**, Über Anoplophora etc. Zeitschr. D. G. G. XXXIII. 1881, p. 684, Taf. XXVI. fig. 1—3 (Anoplophora) [Megalodon thuringicus Tegtmeyer, Beitr. z. Kenntn. d. Keupers im nördl. Thüringen, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. XIII. 1876, p. 434, Taf. VI. fig. 2, Uniona Leukarti Pohlig, Maritime Unionen, Palaeontograph. XXVII, 1880, p. 118, Taf. XIII. fig. 1—8 inclus.]. — **Philippi**, Kontin. Trias. Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 17. — **Langenhan**, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 26, 27. — **Gruppe**, Der unt.

Keuper im südl. Hannover, A. v. Koenen - Festschr. 1907, p. 122. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neue Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 82.

Non *Lucina donacina* v. Alberti (1864), teste Zeller, l. c. p. 82.

Deutschland, Lettenkohle.

A. dubia v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 140, Taf. III. fig. 11 (Anoplophora). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 14. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 83, Taf. II. fig. 6.

Deutschland, Keuper, Rhätsch.

A. edmundiiiformis Trechmann, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 208, Pl. XXI. fig. 8.

Neuseeland, Karnisch.

A. ephippium Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 44, Taf. V. fig. 34, 35. — Kittl, Triasfoss. v. Heurekasund, Rep. 2d. Norweg. Arct. exped. Kristiania, 1907, p. 37, Taf. III. fig. 6.

Bäreninsel, Ellesmereland, Karnisch.

A. fassaensis Wissmann, in Graf zu Münster. Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841 p. 9, Taf. XVI. fig. 2 (Myacites). — v. Hauer, Über d. von Bergr. Fuchs i. d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II. 1850 p. 3 Taf. I. fig. 4 (Myacites). — v. Schaueroth, Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855 p. 515 (Myacites). — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. d. Trias im Vicent. ibidem, XXXIV. 1858, p. 326 (Myacites). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 137, Taf. III. fig. 8 (Anoplophora). — Benecke, Üb. ein. Muschelk. Ablag. d. Alpen, Geogn. Pal. Beitr. II. 1868, p. 22, 27 (Pleuromya). — Tommasi, Il Trias inf. d. nostre Alpi, 1882, p. 63, Tav. I. fig. 9 (Pleuromya). — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 62, Tav. IV. fig. 2, 3 (Pleuromya). — Bittner, Verst. d. Süd-Ussurigebe. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, VII/4, 1899, p. 22, Taf. III. fig. 28—33. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 80 (Myacites). — Philipp, Pal. geol. Unters. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 51. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XXXIV. fig. 10. — Ahlborg, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. 50, 1906, p. 28 (Pleuromya). — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 40, Taf. VII. fig. 3 (Anoplophora). — v. Wittenburg, Werfener Schichten Südtirols, Koken's Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. VIII/5, 1908, p. 33 (281), Textfig. 15 (var. brevis Bittn. inclus.). — v. Wittenburg, Werfener Schichten v. Spitzbergen, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, 1912, p. 947 (var. brevis Bittn. inclus.). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 631, Taf. XXXVII. fig. 8 (Pleuromya). — Bender, Homomiyen etc. Heidelbg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 55. Taf. I. Fig. 6, II. fig. 6, 7, 8, 9 (Homomiyen) [Panopaea gracilis Alberti, Überbl. über d. Trias 1864, Taf. IV. fig. 6 inclus.].

Deutschland, Röth, Muschelkalk, Lettenkohle. — Südalpen
Bakony, Spitzbergen, Ussuribucht, Skythisch.

A. fassaensis (Wissm.) var. *Bittneri* Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 41, Taf. VII. fig. 1 (Anoplophora) [Nom. nov. pr. Myacites fassaensis var. brevis Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, ibidem, p. 84, Taf. IX. fig. 13—17].

Bakony, Südalpen, Spitzbergen, Skythisch.

A. (Myacites) fassaensis (Wissm.) var. *brevis* Bittner (1901).
vide A. Bittneri.

A. cf. fassaensis (Wissm.) v. Haue r, Über d. von Berg. Fuchs i. d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II, 1850, p. 3, Taf. I, fig. 5 (Myacites). — Bittner, Beitr. z. Palaeont. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 708.

Südalpen, Bokhara, Skythisch.

A. grandis (Mastr.) v. Alberti (1864) vide Pleuromya grandis. **A. gregarea** Quenstedt, Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 805, Taf. XLIII, fig. 29 (Anoplophora). — Zeller, Lettenkohle u. Kouper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 80, Taf. I, fig. 10.

Deutschland, Lettenkohle.

A. Griesbachi Bittner, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. Vol. III. Pt. 2, 1899, Trias Brach. and Lam. p. 60, Pl. VIII. fig. 14—16. — Dierer, ibidem, V/3, Ladinie, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 130, Pl. XXIII. fig. 9. — Krumbbeck, Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 55, 147, Taf. III. fig. 21—23. — Jaworski, Nucleamergel v. Misol, Palaeontol. v. Timor, II/5, 1905, p. 109, Taf. XLIV. fig. 22—24. Himalaya, Indonesien, Norisch.

A. cf. Griesbachi (Bittn.) Mansuy, Contrib. à la carte géol. d'Indochine, Paléont. 1908, p. 70, Pl. XVIII. fig. 6.

Tonkin, Obertrias.

A. gypsea (Fraas msc.) Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 21.

Norddeutschland, Gypskeuper.

A. impressa v. Alberti, (1864) vide Homomya impressa. **A. cf. impressa** (Alb.) Assmann (1915) vide Homomya cf. impressa.

A. keuperina (Quenst.) Engel, Geogn. Wegweiser durch Württemberg, 2. Aufl. 1896, Taf. I, fig. 9.

Süddeutschland, Gypskeuper.

A. lettica Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1852, Taf. XLIV. fig. 16 (Anodontata). — v. Bornemann, Organ. Reste d. Lettenkohlengruppe, Thüringens, 1856, p. 15, Taf. I. fig. 3—5 (Myacites). — v. Schaueroth, Schaltiere d. Lettenkohlenform. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 117, Taf. VI. fig. 14 (Anoplophora). — v. Alberti, Überbl. d. Trias, 1864, p. 140, Taf. III. fig. 12 (Anoplophora). — Quenstedt, Petrefaktenkunde, 1867, p. 630, Taf. LV. fig. 16 (Anodontata). — Sandberger, Gliederung d. Würzburger Trias, Nat. Zeitschr. 1867, p. 196 [Lucina Romani v. Alberti, l. c. p. 143, Taf. IV. fig. 4—6 inclus.]. — v. Koenen, Über d. Gattg. Anoplophora, Zeitschr. D. G. G. XXXIII. 1881, p. 685, Taf. XXVI. fig. 4, 5 [Anodontata gregaria Quenstedt, l. c. Taf. LIX. fig. 9, Myacites brevis v. Schaueroth, l. c. p. 119, Taf. VI. fig. 16, Myacites longus v. Schaueroth, l. c. p. 118, Taf. VI. fig. 15, Uniona maritima Pohlig, Maritime Unionen, Palaeontograph. XXVII. 1880, p. 119, Taf. XIII. fig. 9—16, XIV. fig. 25 inclus.]. — Blanckenhorn, Trias am Nordrande d. Eifel, Abhandl. Geol. Spezialk. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 103 (Anoplophora). — ? Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 48 (Anoplophoa). — v. Woehrmann, Syst. Stellg. d. Trigoniiden, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 14 (Anoplophora) [Myoconcha grandis Stur, Geol. d. Steiermark, 1871, p. 248 inclus.]. — v. Woehrmann, Raibler Schichten, ibidem, p. 668. — Philippi, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 175, Taf. VII. fig. 5. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 13, 22 (A. brevis). — Gruppe, Der unt. Keuper im südl. Hannover, v. Koenen - Festschr. 1907, p. 118, 120, Taf. IV. fig. 8, 9 (A. brevis). — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 78.

Deutschland, Lettenkohle. — Nordalpen, Südalpen (?). Karnisch.

- A. sp. ind. aff. lettiae (Quenst.) Gruppe**, Der unt. Keuper im südl. Hannover, I. c. p. 123, Taf. IV. fig. 10. — Hohenstein, Mittl. Muschelkalk am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 240.
Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.
- A. minima Mansuy**, Faunes de Na-Cham, Mém. Serv. géol. Indochine VI/1, 1919.
Tonkin, Karnisch.
- A. montis Huvii Zeller**, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 83 [Nom. nov. pr. Crassatella sp. ind. v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 127, Taf. II. fig. 11, Fraas, Über Semionotus etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. XVII. 1861, Taf. I. fig. 34, 35 inclus.].
Deutschland, Keuper.
- A. Muensteri Wissmann**, in Graf zu Münster, Beitr. z. Geogn. d. südöstl. Tirols, IV. 1841, p. 81, Taf. XVI. fig. 5 (Unionites). — d'Orbigny, Prodrôme, I. 1849, p. 198 (Cardinia). — Laubé, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 35, Taf. XVI. fig. 12 (Anoplophora). — Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 126, Tav. IX. fig. 18 (Anoplophora). — Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 49 (Anoplophora). — v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 668 (Anoplophora). — Tommasi, Fauna calcare conch. Lombardia, 1894, p. 114, Tav. IIa, fig. 2 (Anoplophora). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 9, Taf. I. fig. 22—25 (Anoplophora). — Gortani, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 88, Tav. IX. fig. 4 (Anoplophora). — Galdieri, Malacofauna trias. di Giffoni, Atti Acad. sci. fis. mat. nat. Napoli, 1905, XII. ser. 2, No. 17, p. 18, Textfig. 17 (Anoplophora). — Galdieri, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. Napoli, XXXVIII. 1908, p. 96, Tav. II. fig. 24 (Anoplophora).
Non Anoplophora Muensteri v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 139, Taf. III. fig. 5, 9, 10, Blanckenhorn (1885) [= Pleuromya compressa Sandb.].
Südalpen, Apennin (Salerno), Karnisch.
- A. musculoides** v. Alberti (1864), Tommasi (1894) vide Pleuromya musculoides.
- A. myophoroides Mansuy**, Faunes de Na-Cham, Mém. Serv. géol. Indochine, VI/1, 1919.
Tonkin, Karnisch.
- A. ovalis Trechmann**, Trias of New Zealand, Quart. Journ. Geol. Soc. LXXIII. 1917, p. 208, Pl. XXI. fig. 9.
Neuseeland, Karnisch.
- A. ovalis** Parona (1889) vide Leda tirolensis.
- A. Pappi Frech**, Leitfoss. d. Werfeder Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 64, Taf. VIII. fig. 5 (Anoplophora).
Bakony, Karnisch.
- A. patarkulensis Diener**, Trias, faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 94, Pl. XII. fig. 7.
Himalaya, Anisisch.
- A. Patissii Checchia-Rispoli**, Nuove osservaz. s. fauna trias. d. Punta delle Pietre nere, Boll. Soc. geol. Ital. XXI. 1901, p. 147, Textfig.
Apulia, Karnisch.
- A. postera Fraas**, in Deffner et Fraas, Juraversenkung bei Langenbrücken, Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1859, I. p. 9, (Anoplophora). — Zeller, Lettenkohle u. Keuper in Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 83 (deest imago!).
Deutschland, Keuper.
- A. recta** v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 276 (Sanguinolaria), — v. Woehrmann, Fauna d. Carditaschichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 217, Taf. IX. fig. 7—9 [Modiola imbricata Schäf Härtl, Südbayerns Leth. geogn. 1863, p. 373, Taf. LXV. fig. 15 inclus.] (Anoplophora).
Nordalpen, Karnisch.

A. Schaeferi Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 28.

Norddeutschland, Keuper.

A. Stellai Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 61 Tav. III, fig. 22.

Südalpen Skythisch.

A. subrecta Bittner Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes Pal. Bal. I/1, 1901, p. 100, Taf. VII. fig. 28—30. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. ibidem, 1907, p. 56, Taf. VII. fig. 5. Bakony, Ladinisch.

A. nov. sp. ind. aff. subrectae (Bittn.) v. Wittenburg, Untertriad. Aufsammlungen an d. Teplaia, Bull. Acad. sci. St. Petersbourg, 1911, p. 1084.

Sibirien (Gouv. Jenisseisk), Skythisch.

A. subundata (v. Schaur.) Philipp (1904) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) subundata.

A. Telleri Bittner, Lam. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 231, Taf. VII. fig. 5—7.

Südalpen, Ladinisch.

A. (?) tenebricosa Healey, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 75 Pl. IX. fig. 37—39.

Burma, Rhaetisch.

A. tonkinensis Mansuy, Faunes de Na-Cham, Mém. Sen. géol. Indochine, VI/1, 1919.

Tonkin, Karnisch.

A. torreana Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 71, Taf. VIII. fig. 6, 7 (Anoplophora).

Bakony, Karnisch.

A. trapezoidalis Mansuy, Faunes de Na-Cham, Mém. Sen. géol. Indochine, VI/1, 1919.

Tonkin, Karnisch.

A. Weissenbachensis Toulou, Schichten m. Gerv. Bouei v. Gau-mannmüllerkogel, Jahrb. G. R. A. LIX. 1909, p. 394, Taf. XII. fig. 11.

Nordalpen, Karnisch.

A. Wittenburgi Böhm, Triasverst. v. Bellsunde, Arkiv f. Zool. Svenska Vet. Akad. VIII/2, Stockholm, 1912, p. 10, Taf. I. fig. 16.

Spitzbergen, Skythisch.

A. sp. ind. Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. V/1, 1913, p. 95, Pl. XII. fig. 8.

Himalaya, Anisisch.

Fam. Pleuromyidae Zittel.

Gen. **Alloerisma** King.

A. carniolicum Bittner, Lam. v. Hudiklanec, Jahrb. G. R. A. LI. 1901, p. 232, Taf. VII. fig. 9.

Südalpen, Ladinisch.

Ceromya (?) *acquilateralis* Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 52, Pl. V. fig. 17, 18. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 178 = Gen. ind. sp. ind.

Myacites Schlothoheim, Petrefaktenkunde 1820, p. 176. — Goldfuss, Petref. Germ. 1840, p. 253. — Braun, Lethaea geogn. 1837, p. 174. — Bender, Homomyen etc. Heidelbg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1921, p. 30. vide Homomya Ag. et Pleuromya Ag. et Anodontophora Cossini.

M. Albertii Goldfuss (1838), Berger (1859) vide Homomya Albertii.

M. alpinus (Winkl.), v. Dittmar (1864) vide Pleuromya alpina.

M. bavaricus v. Dittmar (1864) vide Pleuromya bavarica.

M. Bechei Di Stefano (1882), Vinassa de Regny (1906), Principi (1910) vide Pleuromya (?) Bechei.

M. brevis v. Schauroth (1857) vide Anodontophora lettica.

- M. canalensis* v. Schaueroth (1859) vide Anodontophora canalensis.
M. drupaeformis v. Guembel (1861), v. Dittmar (1864) vide Pleuromya drupaeformis.
M. elongatus v. Schlothheim (1823) Giebel (1856), Philipp (1903) vide Pleuromya elongata.
M. Escheri Winkler (1859), Dumortier (1864) vide Pleuromya Escheri.
M. faba Winkler (1859) vide Lithophagus faba, Capellini (1866) vide Pleuromya (?) Bechei.
M. fassensis Wissmann (1841), v. Hauer (1850), v. Schaueroth (1855, 1858), Benecke (1868) Bittner, (1898, 1901) vide Anodontophora fassaensis.
M. grandis Goldfuss (1890) vide Pleuromya grandis.
M. Humboldtensis Gabb (1864) vide Pleuromya Humboldtensis.
M. inaequivalvis v. Schaueroth (non v. Ziethe), Recoaro, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XVII. 1855, p. 516, Taf. II. fig. 6, Krit. Verzeichn. d. Verst. d. Trias im Vicent, ibidem, XXXIV. 1858, p. 326 =? Anodontophora canalensis Cat.
M. letticus v. Bornemann (1856), v. Schaueroth (1857) vide Anodontophora lettica.
M. linearis Schafhäutl (1863) vide Heminajas fissidentata.
M. longus v. Schaueroth (1857) vide Anodontophora lettica.
M. mactroides v. Schlothheim (1822), v. Schaueroth (1859), Wurm (1911) vide Pleuromya mactroides, Goldfuss (1838) =? Pleuromya musculoides v. Schloth., teste v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 142.
M. Meriani v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 409 [Typ. Cardinia sp. ind. Merian, in Escher, Geol. Bem. üb. d. nördl. Vorarlberg, 1853, Taf. IV. fig. 34—37], v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 188 vide Myocencha Curionii et M. lombardica.
M. musculoides v. Schlothheim (1823), Goldfuss (1840), v. Schaueroth (1857), Quenstedt (1885), Langenhahn (1903) vide Pleuromya musculoides.
M. obtusus Goldfuss, Petref. Gernt. II. 1838, p. 261, Taf. CLIV. fig. 4 = sp. non val., teste v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias 1864, p. 137.
M. Quenstedti v. Guembel (1861), v. Dittmar (1864) vide Pleuromya Quenstedti.
M. radiatus v. Muenster (Goldfuss) [1840] vide Pleuromya radiata.
M. subundatus v. Eek (1865) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) subundata.
M. ventricosus v. Schlothheim (1822), Goldfuss (1838). — Quenstedt (1885), Philipp (1903) vide Pleuromya ventricosa.

Gen. **Pleuromya** Agassiz.

- P. Albertii* Tommasi (1895) vide Homomya Albertii.
P. alpina Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 485, Taf. VIII. fig. 3. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 188 (Myacites). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 224 (Panopaea). Nordalpen, Schweiz, Rhaetisch.
P. (?) ambigua Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 5, Taf. VIII. fig. 14. Bakony, Karnisch.
P. baeonica Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 81, Taf. VIII. fig. 33 (Myacites), p. 85, Taf. IX. fig. 10 (? juv.). Bakony, Skythisch.
P. bavarica Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 485, Taf. VIII. fig. 2. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 188 (Myacites). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 224 (Panopaea). Nordalpen, Rhaetisch.

- P. (?) Bechel De Stefanii**, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 102 [Typ. Myacites faba Capellini (non Winkler), Foss. infralias, goldfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 47, Tav. III. fig. 13]. — **Vinassa de Regny**, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 837. — **Principi**, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Pal. XVI. 1910, p. 28, Tav. I. fig. 28. Apennin, Rhaetisch.
- P. brevis Assmann**, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuss. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 631, Taf. XXXVI fig. 7. Norddeutschland, Muschelkalk.
- P. (?) carinata Parona**, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia. 1889, p. 143, Tav. XIII. fig. 6. — v. Woehrmann, Raibler, Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 674. Südalpen, Karnisch.
- P. carnica Gortani**, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 90, Tav. IX. fig. 14. Südalpen, Karnisch.
- P. compressa Sandberger**, Gliederung d. Würzburger Trias., Würzburger Naturwiss. Zeitschr. VI. 1867, p. 178 [Nom. nov. pr. Anoplophora Muensteri v. Alberti (non Wissmann), Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 139, Taf. III. fig. 9]. — v. Eck, Rüdersdorf etc. Abhandl. Geol. Spez. Kte. v. Preußen, I/1, 1872, p. 112. — Zeller, Lettenkohle u. Keuper i. Schwaben, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 84, Taf. I. fig. 12 [Anoplophora Muensteri Blanckenhorn, Trias am Nordrande d. Eifel, Abhandl. Geol. Spez. Kte. v. Preußen, VI/2, 1885, p. 116 inclus.]. Deutschland, Muschelkalk, Lettenkohle.
- P. (?) drupaeformis v. Guembel**, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 409 (Myacites). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 188 (Myacites). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 224 (Panopaea) [Deest imago!]. Nordalpen, Rhaetisch.
- P. Eck Philippi**, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 178, Taf. II. fig. 4. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- P. cf. Eck (Phil.) Ahlburg**, Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. 50, 1906, p. 27, Taf. I. fig. 2. — **Assmann**, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 632. Norddeutschland, Röth.
- P. elegans Assmann**, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 630, Taf. XXXVI. fig. 6. Norddeutschland, Muschelkalk.
- P. elongata v. Schlothoheim**, Nachträge zur Petrefactenkunde. II. 1822, p. 109, Taf. XXXIII. fig. 3 (Myacites). — Goldfuss, l. c. p. 260, Taf. CLIII. fig. 12 (Myacites). — Bronn, Leth. geogn. III/3, 1856, p. 74, Taf. XI. fig. 13 (Myacites). — Giebel, Muschelk. v. Lieskau, 1856, p. 52, Taf. III. fig. 8. (Myacites). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 136 (Pholadomya). — Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 60, Tav. III. fig. 21 (Anoplophora) [P. Albertii Tommasi, II Trias inf. d. nostre Alpi, 1882, p. 65, Tav. I. fig. 12 inclus.]. — Philippi, Kont. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 14. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XI. fig. 3, 7 (Homomya). — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 118, Taf. VI. fig. 28. — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 630, Taf. XXXVI. fig. 4. — Bender, Honoriyen etc. Heidelberg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 90, Taf. III. fig. 2, 3. Deutschland, Roeth bis Unterkeuper. — Südalpen, Anisisch, Aragonia (Hispania), Muschelkalk.
- P. fassaensis Tommasi** (1882, 1895), Ahlbburg (1906), v. Wittenburg (1908), Assmann (1915) vide Anodontophora fassaensis.

- P. (?) *fedaiana* Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 173, Taf. V. fig. 52. Südalpen, Ladinisch.
- P. (an *Homomya*?) *grandis* Graf zu Münnster, in Goldfuss, Petrefacta Germ. II. 1838, p. 261, Taf. CLIV. fig. 2 (Myacites). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 634 (Pholadomya) [Myacites elongatus Giebel, Muschelkalk v. Lieskau, 1856, p. 52, Taf. III. fig. 8 inclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 137 (Anoplophora). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XI. fig. 4. — Bender Homomyen etc. Heidelberg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 87, Taf. III. fig. 1. Deutschland, Muschelkalk.
- P. *himaica* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Himal. Foss. V/3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 132, Pl. XXIII. fig. 15. Himalaya, Norisch.
- P. *hispanica* Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 116, Taf. VI. fig. 24. Aragonia (Hispania), Muschelkalk.
- P. *Humboldtensis* Gabb, Palaeont. of California, I. 1864, p. 28, Pl. V. fig. 22 (Myacites!). — Hatt, Jura and Trias at Taylorville, California, Bull. Geol. Soc. Amer. III. 1892, p. 398 (Myacites), — v. Wittenburg, Triasfoss. vom Fl. Dulgolach, Trav. Mus. géol. Pierre-le-Grand, Acad. sci. St. Pétersbourg, IV. 1910, p. 64, Taf. V. fig. 1—3, (Myacites).
- Nevada, California, NE. Sibiria, Norisch.
- P. (?) *infida* Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII, 1912, p. 93, Taf. XII. fig. 8—10. Sizilien, Hauptdolomit.
- P. Koenigi Willkens, Pal. Unters. triad. Faunen v. Predazzo, Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 166, Taf. VI. fig. 19. Südalpen, Ladinisch.
- P. (?) *lata* Parona, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 143, Tav. XIII. fig. 7. — Di Stefano, La dol. princ. di Palermo, Pal. Ital. XVIII. 1912, p. 93, Tav. XII. fig. 11. Südalpen, Karnisch. — Sizilien, Hauptdolomit.
- P. (?) Loeschmanni Frech, Neue Zweischaler aus d. Bakonyer Trias, Pal. Bal. I/1, 1904, p. 50, Textfig. 76, 77. Bakony, Hauptdolomit.
- P. *mactraeformis* v. Gembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 409. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 188 (Myacites). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 224 (Panopaea) [Deest imago!]. Nordalpen, Rhaetisch.
- P. *mactroides* v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 178, Nachträge, II. 1822, p. 109, Taf. XXXIII. fig. 4 (Myacites). — D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét. III. p. 326 (Panopaea). — v. Schaueroth, Krit. Verz. d. Verst. im Vicentin. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXXIV. 1859, p. 328, Taf. II. fig. 18. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XII. 1861, p. 638, Taf. II. fig. 5 [Myacites mactroides Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, Taf. CLIV. fig. 1 exclus.]. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 142. — Roemer, Geol. v. Oberschlesien, 1870, Taf. X. fig. 8. — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1885, p. 855, Taf. LXVII. f. 16 (Myacites). — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 118. — Philipp, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 177, Taf. VII. fig. 9 (Thracia). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. II. fig. 6 (Myacites). — Wurm, Trias v. Aragonien, Zeitschr. D. G. G. LXIII. 1911, p. 117, Taf. VI. fig. 27 (Myacites). — Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 634, Taf. XXXVI. fig. 15. — Bender Hornomyen etc. Heidelberg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 95, Taf. IV. fig. 2, 3. Deutschland, Röth bis Keuper, — Aragonia (Hispania).
- Muschelkalk. — Südalpen, Anisisch.

- P. (?) Moorei** Pflücker, Rhaet. v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 420 [Typ. Lam. ind. Moore, Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, Pl. XVI. fig. 26]. Deutschland, England, Rhaetisch.
- P. musculoides** v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 177, Nachträge, II. 1822, p. 109, Taf. XXXIII. fig. 1, 2 (Myacites). — v. Ziehen, Verst. Würtemberg's, 1833, Taf. LXXI. fig. 5 (Myacites). — Goldfuss, Petref. Germ. II. 1838, p. 259, Taf. CLIII. fig. 10 (Myacites). — v. Schaueroth, Schaltierreste d. Lettenkohlenformt. Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 116, Taf. VI. fig. 13 (Myacites). — Hellmann, Petrefakten Thüringens, Palaeontogr. 1862, p. 33, Taf. XXII. fig. 27 (Anoplophora). — v. Guembel, Geol. v. Bayern, I. 1858, p. 656, 667, Taf. CCCLXIII. fig. 12 (Panopaea). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, ibid. XIII. 1861, p. 633 (Pholadomya). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 135, Taf. III. fig. 6 (Anoplophora). — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 47, Taf. I. fig. 13. — Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 113, Taf. II. a, fig. 5 (Anoplophora). — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. d. Buntsdst. etc. v. Jena, 1906, p. 32, Taf. VII. fig. 43. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XI. fig. 5, 6. — Zeller, Lettenkohle, Zentralbl. f. Min. 1907, p. 84. — Bender, Homomyien etc. Heidelbg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 76, Taf. II. fig. 1, 2, 3.
Deutschland, Roeth bis Keuper. — Südalpen, Anisisch. — Bogdo (Astrachan), Skythisch.
- P. musculoides var. erassa** Bender, Homomyien etc. Heidelbg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 89, Taf. III. fig. 4. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- P. musculoides var. radiata** v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 179 (Myacites). — Goldfuss, l. c. p. 260, Taf. CLIII. fig. 13 (Myacites). — v. Alberti, l. c. 1864, p. 136 (Pholadomya). — Bender, Homomyien etc. Heidelbg. Muschelk. l. c. p. 84. Süddeutschland, Muschelkalk.
- P. musculoides var. rhomboidea** Bender, Homomyien etc. Heidelbg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 85, Taf. II. fig. 4, 5. Süddeutschland, Ob. Muschelkalk.
- P. musculoides** Tommasi, Riv. fauna Raibl, Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 62 = Gen. ind. sp. ind. teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 674.
- P. cf. musculoides** (Schloth.) Frech, Leitfós. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal. I/1, 1907, p. 56. Bakony, Ladinisch.
- P. prosogyra** Solomon, Maritolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 174, Taf. V. fig. 50, 51. Südalpen, Ladinisch.
- P. cf. prosogyra** (Sal.) Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 638, Taf. XXXVI. fig. 10. Norddeutschland, Muschelkalk.
- P. pulchra** Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 632, Taf. XXXVI. fig. 9. Norddeutschland, Muschelkalk.
- P. Quenstedti** v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 409 (Myacites). — v. Dittmar; Contortazone, 1864, p. 188 (Myacites) [Biv. innom. Quenstedt, Der Jura, 1856, Taf. I. fig. 32, Cleidophorus alpinus Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 18, Taf. II. fig. 5, Winkler, Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 473 inclus.]. — Martin, Étage rhétien, 1865, p. 224 (Panopaea). Süddeutschland, Nordalpen, Rhaetisch.

- P. rectangularis** v. **S e e b a c h**, Conchylienf. d. Weimarer Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 635, Taf. II. fig. 4 (Pholadomya). — Deutschland, Muschelkalk.
- P. rugosa** (D u n k.) **M a r t i n**, Etage rhétien, 1865, p. 225 (Panopaea) [= P. Dunkeri T e r q u.]. — Frankreich, Rhaetisch, sonst Lias.
- P. rugosior** **N o b.** Nom. nov. pr. P. rugosa Ahlbürg (non Martin), Trias im südl. Oberschlesien, Abhandl. Preuß. Geol. L. A. N. F. 50, 1906, p. 27, Taf. I. fig. 1, Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 632, Taf. XXXVI. fig. 11, 12, 14. — Norddeutschland, Röth.
- P. sensimstriata** **A s s m a n n**, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 630, Taf. XXXVI. fig. 5. — Norddeutschland, Muschelkalk.
- P. setina** **G o r t a n i**, Nuovi foss. Raibl. d. Carnia, Riv. Ital. di Pal. VIII. 1902, p. 90, Tav. IX. fig. 19—21. — Südalpen, Karnisch.
- P. striato-granulata** **M o o r e**, Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 506, Pl. XVI. fig. 1. — v. **D i t t - m a r**, Contortazone, 1864, p. 188 (Myacites). — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 224 (Panopaea).
- P. cf. suevica** (R o l l e) **G o e t e l**, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 196, Taf. IX. fig. 8. — England, Nordalpen, Rhaetisch.
- P. sulcatisima** **K r u m b e c k**, Ob. Trias v. Buru etc. Palaeontograph. Suppl. IV. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, 1913, p. 71, Taf. V. fig. 11. — Karpathen, Rhaetisch.
- P. (?) triearinata** **B i t t n e r**, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 5, Taf. VIII. fig. 15. — Indonesien, Norisch.
- P. ventricosa** v. **S c h l o t h e i n t**, Nachr. z. Petrefaktenkunde, 1822, Taf. XXXIII. fig. 2 (Myacites). — **G o l d f u s s**, Petref. Germ. II. 1838, p. 260, Taf. CLIII. fig. 11 (Myacites). — v. **S e e b a c h**, Conchylienfauna d. Weimarer Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 634 (Pholadomya). — v. **A l b e r t i**, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 148, Taf. III. fig. 7 (Panopaea). — v. **G u e m b e l**, Geol. v. Bayern, 1888 p. 668, Taf. CCCLXIII. fig. 7 (Panopaca). — **P h i l i p p i**, Kontinent. Trias, Leth. mes. I/1, 1903, Taf. V. fig. 18 (Pleuromya). — **L a n g e n h a n**, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XI. fig. 8. — **H o h e n s t e i n**, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. XII/2, 1913, p. 239 (67) (Homomya). — **B e n d o r**, Homomiyen etc. Heidelbg. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 71, Taf. IV. fig. 4 [Mya ventricosa v. Zieten., Verst. Württembergs 1830, p. 85, Taf. LXIV. fig. 3 inclus.]. — Bakony, Karnisch.
- P. nov. sp. ind. P a r o n a**, Studio monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 142, Tav. XIII. fig. 8 [= ? Trigonodus Raiblensis G r e d l., teste v. **W o e h r m a n n**, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 674.]. — Deutschland, Muschelkalk.
- P. nov. sp. ind. P h i l i p p i**, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld etc. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturkde. Würt. 1898, p. 179, Taf. VII. fig. 3. — Südalpen, Karnisch.
- P. (an Homomya?) sp. ind. H o h e n s t e i n**, Mittl. Muschelkalk etc. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. N. F. XII/2, 1913, p. 240 (68), Taf. III (XIV), fig. 12. — Süddeutschland, Muschelkalk.

P. nov. sp. ind. Assmann, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 634, Taf. XXXVI. fig. 13.

Norddeutschland, Muschelkalk.

P. nov. sp. ind. Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 196, Taf. IX. fig. 9.

Karpathen, Rhaetisch.

Fam. Pholadomyidae Fischer.

Gen. **Pholadomya** Sow.

P. corbuloides (Desh.) Levallois (1864) vide Anodonta (?) postera.

P. Franciseae Böh m., Oberriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 50, Taf. V. fig. 25, 26, 36.

Bäreninsel, Karnisch.

P. grandis (Mstr.) v. Seebach (1861) vide Pleuromya grandis.

P. (?) lagenalis Schafhäutl., Geol. Bem. üb. d. Kramerberg, Neues Jahrb. f. Min. 1852, p. 286, Taf. III. fig. 8. — Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 43, Pl. III. fig. 1—3. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 187.

Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.

P. lariana Stoppani (1861), v. Dittmar (1864) vide Homomyia lariana.

P. (?) margaritata Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 44, Pl. III. fig. 8—10. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 187.

Südalpen, Rhaetisch.

P. Mori Stoppani (1861) vide Mactra Mori.

P. musculoides v. Seebach (1856) vide Pleuromya musculoides.

P. cf. prima (Quenstedt) Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 63, Taf. II. fig. 5.

Schweiz, Rhaetisch.

P. rectangularis v. Seebach (1861) vide Pleuromya rectangularis.

P. rugosa Costa (1864) vide Schafhäutlia cf. Mellingi.

P. Schmidii v. Seebach (1861) vide Unicardium Schmidii.

P. nov. sp. ind. ex aff. Woodwardi (Oppel) Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 197, Taf. IX. fig. 9.

Karpathen, Rhaetisch.

Fam. Myidae Desh.

Gen. **Corbula** Brug.

C. alpina Winkler, Schichten d. Av. contorta, 1859, p. 15, Taf. II. fig. 2. — Winkler, Der Oberkeuper, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 484, Taf. VIII. fig. 1. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 185 [Schizodus (?) alpinus Winkler, Schichten d. Av. contorta, p. 15, Taf. II. fig. 1, Corbis depressa Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 51, Pl. V. fig. 12—16 inclus.]. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 65, Taf. II. fig. 26, p. 64, Taf. II. fig. 22. — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 843. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 200.

Nordalpen, Südalpen, Apennin, Karpathen, Rhaetisch.

C. Arkosiae, Martin, Etage rhétien 1865, p. 279, Pl. III. fig. 4.

Frankreich, Rhaetisch.

C. Azzarolae Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 45, Pl. IV. fig. 3, 4. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 65, Taf. II. fig. 28b.

Südalpen, Schweiz, Rhaetisch.

C. (?) Blakei Gabb. Palaeontol. of California, I. 1864, p. 29, Pl. V. fig. 24.

Nevada, Obertrias.

C. cordiformis Schafhäutl (1865) vide Myophoriopsis Rosthorni.
C. depressa Capellini, Foss. infralias, golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 57, Tav. IV. fig. 7, 8 (Corbis). — Vinassa de Regnay, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 841 (Corbis an Corbula?). — Principi, Foss. retici d'Amelia, Riv. Ital. di Pal. XVI. 1910, p. 31, Tav. I. fig. 36—38 (Corbis an Corbicula?).

Apennin, Rhaetisch.

C. dubia Goldfuss (1838) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) gregaria, v. Seebach (1861) vide Pseudocorbula incrassata.
C. (?) elongata v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 122, Taf. II. fig. 9.

Süddeutschland, Mittelkeuper.

C. gregaria v. Schauroth (1857) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) gregaria.
C. imperfecta Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 49, Tav. IV. fig. 13, 14.

Apennin, Rhaetisch.

C. incrassata (Mstr.) v. Schauroth (1857) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) incrassata.
C. Keuperina (Quenstedt) v. Alberti (1864), Langenhahn vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) incrassata.

C. (?) nucleiformis Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlerndol. Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 600, Taf. VIII. fig. 6. Südalpen, Ladinisch.

C. muculiformis (Zenck.) v. Schauroth (1857), v. Alberti (1864), Langenhahn vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) nucleiformis.

C. obscura Schafhäutl 1863) vide Myophoriopsis Rosthorni.
C. praenuntia Stoppani 1859) vide Rhaetidia praenuntia.

C. Rosthorni Boué 1853), v. Haauer 1857) vide Myophoriopsis Rosthorni.

C. Schmidii Proescholdt (1879) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) Schmidii.

C. (?) similis Proescholdt (1879) vide Myophoriopsis (Pseudocorbula) similis.

Mya ventricosa (Schlotheim) v. Ziehen (1830) vide Pleuromya ventricosa.

Gen. **Pteromya** Moore.

Rhaetic beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 505.
 Typ. **P. Crowcombeia** Moore (1857).

P. Crowcombeia Moore, l. c. p. 506, Pl. XV. fig. 22, 23. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 230 (Schizodus).

England, Rhaetisch.

P. simplex Moore, l. c. p. 506, Pl. XV. fig. 24. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 230 (Schizodus).

England, Rhaetisch.

Gen. **Taeniodon** Dunker.

T. Ewaldi Bornemann (1854) vide Isocyprina (?) Ewaldi.
T. (?) praecursor v. Schloenbach, Niveaubestimmungen auf d.

Grenze d. zw. Keuper u. Lias im Hannoverschen etc. auftretenden Sandsteins, Neues Jahrb. f. Min. 1862, p. 146, Taf. III. fig. 1. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 120. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 175 (Schizodus). — Dumortier, Etudes pal. s. l. dépôts jur. d. bassin du Rhône, I. Infralias, 1864, p. 12, Pl. I. fig. 1—3. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 230 (Schizodus). — Pfückler, Rhaet v. Göttingen, Zeitschr. D. G. G. XX. 1868, p. 416 (Protocardia). — Ooster,

Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 64, Taf. II. fig. 24. — Lundgren, Faunan i. stenkolsför. form. i. Schonen, Fisiogr. sällsk. minneskr. Lund, 1878, p. 47, Taf. I. fig. 5 (Protocardia). — Vinassa de Regny, Foss. retici di Caprona, Boll. Soc. geol. Ital. XXV. 1906, p. 840. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 6. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subtatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 200, Taf. IX. fig. 10. Frankreich, Deutschland, Schweiz, Südschweden (Scania). Apennin, Karpathen, Rhaetisch.

Fam. Anatinidae Gray.

Gen. **Anatina** Lam (Subgen. **Cercomya** Ag. inclus.)

A. **Amici** Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 127, Pl. XXIX. fig. 20—22. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 186, Südalpen, Rhaetisch.

A. **arista** Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 128, Pl. XXIX. fig. 25. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 186 [A. praecursor Stoppa (non Quenstedt), l. c. p. 127, Pl. XXIX. fig. 17 inclus.]. Südalpen, Rhaetisch.

A. **Baldassari** Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 126, Pl. XXIX. fig. 15. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 186 [Maetra securiformis Stoppa, l. c. 1861, p. 45, Pl. IV fig. 1, 2 inclus.]. — Di Stefano, Rhaet. Foss. d. Apuan. Alpen, Verh. G. R. A. 1882, p. 100 [A. praecursor Capellini (non Quenstedt), Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 46. Tav. III. fig. 12 inclus.]. Südalpen, Apennin, Rhaetisch.

A. **brembana** Tommasi, Fauna calc. conch. Lombardia, 1894, p. 117, Tav. II. a, fig. 8 Südalpen, Anisisch

A. **Carlini** Lundgren, Molluskfaun. i Sveriges äldre mesoz. bildn. Lunds Univers. Arsskr. XVII. 1881, p. 47, Taf. I. fig. 1—3. Südschweden (Scania), Rhaetisch.

A. **gladius** Laubbe (1865) vide Cuspidaria gladius.

A. **Passeri** Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 128, Pl. XXIX. fig. 26. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 186 [Schizodus elongatus v. Guembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 407 inclus.]. Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.

A. **praecursor** Quenstedt, Der Jura, 1856, p. 29, Taf. I. fig. 15 (Ceromya). — Oppel et Suess, Äquivalente d. Kössener Schichten i. Schwaben, Sitzber. Akad. Wiss. XXI. 1856, p. 547. — Oppel, Weitere Nachweise d. Kössener Schichten etc. ibidem, XXVI. 1857, p. 10, Textfig. 2. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 186. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 151. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 225. — v. Arthaber, Alpine Trias, Leth. mes. 1/3, 1906 Taf. XLIX. fig. 6. — Langenhahn, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XXV. fig. 25. Nec A. praecursor Stoppa, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 127, Pl. XXIX. fig. 16—19 [= A. rhaetica, Guembel et A. arista Stoppa, teste v. Dittmar, l. c. p. 186], nec Moore, Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 507, Pl. XVI. fig. 3. [= A. rhaetica]. Dumortier, Dep. jur. bass. du Rhone, I. Infralias, 1864, p. 13, Pl. I. fig. 5 [= A. Remillyana] nec Capellini, Foss. infralias. golfo d. Spezia, Mem. Acad. sci. Ist. Bologna, ser. 2, T. V. 1866, p. 46, Taf. III. fig. 12 [= A. Baldassari Stoppa, teste De Stefani, Verh. G. R. A. 1882, p. 100.].

Frankreich, Deutschland, Nordalpen, Rhaetisch.

- A. cf. praecursor** (Quenst.) Krumbbeck, Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 259, Taf. XVII. fig. 3—7 [Psammobia sp. ind. Böttger, Tertiärform. v. Sumatra, ibidem, Suppl. III. 1880, p. 34, Taf. I. fig. 6—9 inclus.]. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 198. Sumatra, Norisch. — Karpathen, Rhaetisch.
- A. Remillyana** Martin, Etage rhétien, 1865, p. 226, 275, Pl. III. fig. 1—6 [Typ. A. praecursor Dumortier non Quenstedt), Dep. jur. bass. du Rhône, I. Infralias, 1864, p. 13, Pl. I. fig. 5.] Frankreich, Rhaetisch.
- A. rhaetica** v. Gembel, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 408. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 486 [A. praecursor Moore, (non Quenstedt), Rhaetic beds, Quart. Journ. Geol. Soc. XVII. 1861, p. 507, Pl. XVI. fig. 3, Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 127, Pl. XXIX. fig. 16 caet. exclus.], A. Suessii Stoppani, l. c. p. 127, Pl. XXIX. fig. 24 inclus. — Ooster, Rhaet. Stufe v. Thun, Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1869, p. 33, Taf. II. fig. 9. England, Schweiz, Nordalpen, Südalpen, Rhaetisch.
- A. semiradiata* Stoppani 1860) vide Cuspidaria gladius.
- A. ?) Servini Tommasi**, Fauna Trias infer. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 61, Tav. IV. fig. 1. Südalpen, Skythisch.
- A. Stoppanii** Martin, Etage rhétien, 1865, p. 226, 275, Pl. II. fig. 3. Frankreich, Rhaetisch.
- A. Suessii** Oppel, Weitere Nachweise d. Koessener Schichten etc. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXVI. 1857, p. 13, Textfig. — Moore, Rhaet. beds etc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XVII. 1861, p. 507, Pl. XVI. fig. 2. — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 151. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 187. — Martin, Etage rhétien, 1865, p. 225. — Goetel, Rhaet. Stufe d. subatr. Zone i. d. Tatra, Bull. Acad. sci. Cracovie, sér. A. Nov. Dec. 1916, p. 199. Non A. Suessii Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 127, Pl. XXIX. fig. 24, teste v. Dittmar, l. c. p. 187 [= A. rhaetica Gembel]. England, Frankreich, Deutschland, Nordalpen, Karpathen, Rhaetisch.
- A. triadica* Stoppani 1860 vide Cuspidaria triadica.
- A. Zannonii** Stoppani, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 127, Pl. XXIX. fig. 23. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 186. Südalpen, Rhaetisch.

Subgen. **Cercomya** Agass.

- C. ?) crassa** Tommasi, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 63, Tav. IV. fig. 13. Südalpen, Karnisch.
- C. ?) longirostris** Stoppani, Stud. geol. e pal. sulla Lombardia, 1857, p. 272, 372 (Panopaea). — Parona, Stud. monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889, p. 144, Tav. XII. fig. 9, 10. — Tommasi, Fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. techn. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 62 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Woehrmann, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 674.

Gen. **Cuspidaria** Nardo (**Neaera** Gray).

- Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 5.
- C. alpis civiae** Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 5, Taf. I. fig. 1—9. Nordalpen, Karnisch.
- C. dubia** Stoppani, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1859, p. 82, Pl. XVI. fig. 16. Südalpen, Ladinisch.

- C. gladius** Laub e, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XXV. 1865, p. 34. Taf. XV. fig. 1 (Anatina). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 6, Taf. I. fig. 10—16 [Solen caudatus v. Ha u e r, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Raibler Schichten, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, XXIV. 1857, p. 543, Taf. I. fig. 1—3, Par o n a, Stud. monogr. fauna Raibl. Lombardia, 1889 p. 138, Tav. XIII. fig. 1 Tom m a s i, Riv. fauna Raibl. Friuli, Ann. Ist. teen. Udine, ser. 2, T. VIII. 1890, p. 60, Tav. IV. fig. 11, v. Wo e h r m a n n, Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XLIII. 1893, p. 673 inclus.]. — Bittner, Über ein Kohlenvork. nächst Trebinje, Verh. G. R. A. 1900, p. 147. — Bittner, Lam. aus d. Trias d. Bakonyerwaldes, Pal. Bal. I/1, 1901, p. 4. — v. Ar th a b e r, Alpine Trias, Leth. mes. I/3, 1906, Taf. XL. fig. 9.
Südalpen, Dinariden, Bakony, Karnisch.
- C. semiradiata** Stoppa n i, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 84, Pl. XVI. fig. 19 (Anatina). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 8, Taf. I. fig. 21.
Südalpen, Ladinisch.
- C. cf. semiradiata** (Stoppa) Böh m, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Ak. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 49, Taf. V. fig. 30.
Bäreninsel, Karnisch.
- C. (?) sp. ind. aff. semiradiatae** (Stoppa) Mán s u y, Contrib. etc. géol. Indochine, Paléontol. 1908, p. 71, Pl. XVII. fig. 19.
Tonkin, Ladinisch.
- C. siliqua**, Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 8, Taf. I. fig. 19, 20.
Südalpen, Karnisch.
- C. triasica** Stoppa n i, Pal. Lomb. I. Pétrif. d'Esino, 1860, p. 83, Pl. XVI. fig. 17 (Anatina). — Bittner, Lam. v. St. Cassian, Abhandl. G. R. A. XVIII/1, 1895, p. 8 [Anatina praecursor Stoppa n i, l. c. p. 83, Pl. XVI. fig. 18 inclus.].
Südalpen, Ladinisch.
- C. sp. ind.** Broili, Fauna d. Pachycardientuffe etc. Palaeontograph. L. 1904, p. 220, Taf. XXVII. fig. 15.
Südalpen, Karnisch.
- C. (an Solenopsis?) sp. ind.** Heale y, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 62, Pl. IX. fig. 8.
Burma, Rhaetisch.

P sammoco nch a Tom m a s i, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 61 = Gen. inval. (syn. Anatina?).
P. Servini Tom m a s i (1895) vide Anatina (?) Servini.

Gen. **Thracia** Leach.

- T. (?) applanata** K r u m b e e k, Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 74, Taf. V. fig. 15.
Indonesien, Norisch.
- T. mactroides** v. Seebach (1861), b. Alberti (1864), Philipp i (1898) vide Pleuromya mactroides.
- T. (?) Mori** Stoppa n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1863, p. 123, Pl. XXVIII. fig. 16, 17 (Pholadomya). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 187.
Südalpen, Rhaetisch.
- T. prisca** Heale y, Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. I/4 1908, p. 61, Pl. IX. fig. 1—7.
Burma, Rhaetisch.

Fam. **Panopaeidae** Zittel.

Gen. **Panopaea** Menard.

- P. agn ota** v. Alberti (1864) vide Homomya agn ota.
P. Albertii v. Alberti (1864) vide Homomya Albertii.
P. alpina (Winkl.) Martin (1865) vide Pleuromya alpina.

- P. Althausii* v. *Alberti* (1864) vide *Homomya Althausii*.
P. bavarica (*Winkl.*) *Martin* (1865) vide *Pleuromya bavarica*.
P. depressa *Martin*, Pal. stratigr. Côte d'Or, Mém. Soc. géol. France, sér. 2, T. VII. 1859, p. 78, Pl. II. fig. 34—36.
Frankreich, Rhaetisch.
P. drupaeformis *Martin* (1865) vide *Pleuromya drupaeformis*.
P. Escheri *Martin* (1865) vide *Pleuromya Escheri*.
P. gracilis v. *Alberti* (1864) vide *Homomya gracilis*.
P. keupero-liasina *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 274, Pl. II. fig. 2.
Frankreich, Rhaetisch.
P. longirostris *Stoppani* (1857) vide *Cercomya* (?) *longirostris*.
P. mactraeformis (v. *Gembel*) *Martin* (1865) vide *Pleuromya mactraeformis*.
P. Meriani *Martin* (1885) = Gen. ind. sp. ind.
P. Montignyanana *Martin*, Pal. stratigr. Côte d'Or, Infracalias, Mém. Soc. géol. France, sér. 2, T. VII. 1859, p. 78, Pl. II. fig. 37—39.
Frankreich, Rhaetisch.
P. Quenstedti *Martin* (1865) vide *Pleuromya Quenstedti*.
P. Remillyana *Martin*, Etage rhétien, 1865, p. 272, Pl. I. fig. 2.
Frankreich, Rhaeti sch.
P. Renevieri *Martin* (1865) vide *Cypriocardia Renevieri*.
P. (?) rhaetica v. *Gembel*, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 409 (Deest imago!)
Nordalpen, Rhaetisch.
P. rugosa (*Dunkl.*) *Martin* (1865) vide *Pleuromya rugosa*.
P. striato-granulata (*Moore*) *Martin* (1865) vide *Pleuromya striato-granulata*.
P. ventricosa v. *Alberti* (1864) *Gembel* (1888) vide *Pleuromya ventricosa*.

Gen. **Saxicava** Fleuriau.

- S. sinemuriensis* Martin, Pal. stratigr. Côte d'Or, Infralias, Mém. Soc. géol. France, sér. 2, T. VII. 1859, p. 79, Pl. II. fig. 27, 28. — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 189.
Frankreich, Rhaetisch.

Gen. Homomya Ag.

Subgen. **Arcomya** Ag. inclus.

- H. agnata v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 147, Taf. IV.
fig. 6 (Panopaea).
Süddeutschland, Ob. Muschelkalk, Lettenkohle.

H. Albertii Voltz, in Goldfuss, Petr. Germ. II. 1838, p. 261,
Taf. CLIV. fig. 3 (Myacites) [Area inaequivalvis v. Zieten
(non Goldfuss), Versteinerungen Württembergs, 1830, p. 94,
Taf. LXX. fig. 3 inclus.]. — d'Orbigny, Prodrome, I. 1849,
p. 173 (Lyonsia). — Berger, Verst. im Röth v. Hildburghausen,
Neues Jahrb. f. Min. 1859, p. 169, Taf. III. fig. 10—12
(Myacites). — v. Alberti, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 149,
Taf. V. fig. 1 (Panopaea). — v. Sandberger, Übersicht d.
Verstein. d. Triasform. Unterfrankens, Verh. Phys. Med. Ges.
Würzburg, N. F. XXVIII. 1890, p. 5. — Schmidt, Wellengeb.
v. Freudenstadt, Mitt. Geol. Abt. stat. Landesamt. Stuttgart,
No. 3, 1907, p. 41. — Fraas, Der Petrefaktensammler,
1910, p. 160, Taf. XLII. fig. 8 (Panopaea). — Bender, Homomyien
etc. Heidelb. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXXIII. 1921,
p. 41, Taf. I. fig. 1—3 [Myacites inaequivalvis Schaueroth,
Recoaro, Sitzber. Akad. Wien, 1855, p. 516, Taf. II. fig. 6, Area
inaequivalvis Queenstedt, Handb. d. Petrefaktenkde. 1885,
p. 855, Taf. LXVII. fig. 18 inclus.].

Deutschland, Röth, Muschelkalk.

H. cf. Albertii Tommasi, Fauna Trias inf. vers. mer. Alpi, Pal.
Ital. I. 1895, p. 63, Pl. IV. fig. 2.

Südalpen, Skythisch.

- H.** sp. ind. aff. *Albertii* (V o l t z) v. L o c z y, Wissensch. Ergebn. d. Reise d. Grf. B. Szechenyi in Ostasien, III. 1899, p. 157, Taf. X. fig. 12 13 (Pleuromya). Yunnan (Südehina), Karnisch.
- H. Althausii** v. A l b e r t i, Überbl. üb. d. Trias, 1869, p. 150, Taf. V. fig. 3 (Panopaea). — B e n d e r, Homomyen etc. Heidelb. Muschelk., Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 47, Taf. I. fig. 4, 5. Deutschland, Buntsandstein, Muschelkalk.
- H. Bittneri* T o m m a s i (1890) vide Schafhäutlia Mellingi.
- H. fassaensis* (W i s s m.) B e n d e r (1921) vide Anodontophora fassaensis.
- H. Forsbergi** B ö h m, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, Svenska Vet. Akad. Handl. XXXVII/3, Stockholm, 1903, p. 49, Taf. V. fig. 33. Bäreninsel, Karnisch.
- H. gracilis** v. A l b e r t i, Überbl. üb. d. Trias, 1864, p. 148, Taf. IV. fig. 7 (Panopaea). Süddeutschland, Lettenkohle.
- H. impressa** v. A l b e r t i, Überbl. üb. d. Trias 1864, p. 138, Taf. V. fig. 2 (Anoplophora). — B e n d e r, Homomyen etc. Heidelb. Muschelk. Zeitschr. D. G. G. LXXIII. 1921, p. 50, Taf. IV. fig. 1. Deutschland, Röth, Muschelkalk.
- H. cf. impressa** (A l b.) A s s m a n n, Brach. u. Lam. d. oberschles. Trias, Jahrb. Preuß. Geol. L. A. f. 1915, XXXVI/1, Heft 3, p. 617, Taf. XXXIV. fig. 7. Norddeutschland, Muschelkalk.
- H. Kokeni** P h i l i p p i, Fauna d. Trigonodusdol. v. Hühnerfeld, Jahresh. Ver. vaterl. Naturkde. Würtemberg, 1898, p. 179, Taf. VII. fig. 2. — H o h e n s t e i n, Mittl. Muschelk. am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. XII/2, 1913, p. 239 (6). Süddeutschland, Muschelkalk.
- H. lariana** S t o p p a n i, Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta, 1861, p. 44, Pl. III. fig. 4—7 (Pholadomya). — v. D i t t m a r, Contortazone, 1864, p. 187 (Pholadomya). — M a r t i n, Etage rhétien, 1865, p. 223. Westschweiz, Südalpen, Rhaetisch.
- H. sp. ind. aff. larianae** (S t o p p.) D i e n e r, Pad. Ind. ser. XV. Himal. Foss. V/3, Ladinie, carnica a. noric faunae Spiti, 1908, p. 99. Himalaya, Norisch.
- H. sublariana** K r u m b e c k, Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. z. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 72, Taf. V. fig. 12, 13 (var. grandis fig. 14). Indonesien, Norisch.
- H. ventricosa* H o h e n s t e i n (1913) vide Pleuromya ventricosa.
- H. sp. ind. K i t t l**, Triasbildungn. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wiss. —ien, LXXXI. 1908, p. 486, Taf. III. fig. 1. Dobrudscha, Ladinisch.

Subgen. **Arcomya** Agass. (emend. Terquem).

- S a l o m o n, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 171.
- A. Sansoni** S a l o m o n, Marmolata, I. c. 1895, p. 172, Taf. V. fig. 55. — G a l d i e r i, Trias di Giffoni, Atti Acad. Pont. XXXVIII. Napoli, 1908, p. 118, Tav. III. fig. 7. — M a r i a n i, Contr. a. stud. d. bivalvi etc. Rendic. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. 2, XXXVIII. Milano, 1908, p. 6, 21. — T o m m a s i, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XVII. 1911, p. 35, Tav. III. fig. 20. Südalpen, Ladinisch, Karnisch. — Apennin (Salerno), Karnisch.
- A. Sandroccensis** T o r n q u i s t, Recoaro, II. Zeitsch. D. G. G. L. 1898, p. 672, Taf. XXII. fig. 7, 9 (?) [A. nov. sp. ind. S a l o m o n, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 173, Taf. V. fig. 54 inclus.]. Südalpen, Ladinisch.

Fam. Burmesiidae Healey.

Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 56.

Gen. **Burmesia** Healey.

Fauna of the Napeng beds, l. c. p. 58. — K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 75.

Typ. B. Latouchei Healey (1908).

B. Latouchei Healey, l. c. p. 58, Pl. VIII. fig. 16—18.
Burma, Rhaetisch.

B. lirata Healey, l. c. p. 59, Pl. VIII. fig. 19—22.
Burma, Rhaetisch.

B. sp. ind. aff. liratae (Healey) K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. l. c. 1913, p. 77, Taf. V. fig. 17.
Idonesien, Norisch.

B. praecursor K r u m b e c k , Ob. Trias v. Buru etc. l. c. p. 76, Taf. V. fig. 16, Textfig. 4.
Indonesien, Norisch.

Gen. **Prolaria** Healey.

Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 60. — K r u m b e c k , Ob. Trias v. Sumatra, Beitr. Geol. v. Niederl. Ind. II/3, Palaeontograph. Suppl. IV. 1914, p. 60.

Typ. P. Sollasii Healey (1908).

P. mirabilis B ö t t g e r , Tertiärform. v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. III. 1880, p. 41, Taf. II. fig. 2 (Pholas). — K r u m b e c k , Ob. Trias v. Sumatra, l. c. p. 261, Taf. XVII. fig. 29.
Sumatra, Norisch.

P. orientalis M a n s u y , Mission Zeil dans le Laos etc. Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, 1912, p. 50, Pl. IX. fig. 15.
Laos (Indochina), Rhaetisch.

P. Sollasii Healey, Napeng beds, l. c. p. 60, Pl. VIII. fig. 23—26.
Burma, Rhaetisch.

P. V-sculpta K r u m b e c k , Ob. Trias v. Sumatra, l. c. p. 260, Taf. XVII. fig. 30, 31 [Pholas mirabilis B ö t t g e r , Tertiärform. v. Sumatra, Palaeontograph. Suppl. III. 1880, p. 32, Taf. I, fig. 5 inclus.].
Sumatra, Norisch.

Fam. **Dattiidae** Healey.

Fauna of the Napeng beds, Pal. Ind. new ser. II/4, 1908, p. 63.

Gen. **Datta** Healey.

l. c. 1908, p. 63.

Typ. D. oscillaris Healey (1908).

D. oscillaris Healey, l. c. 1908, p. 63, Pl. IX. fig. 9.
Burma, Rhaetisch.

Pholas ungulata S c h a f h ä u t l , Geogn. Untersuch. i. d. süd. bayer. Alpen, 1851, p. 106, 134, Taf. XVIII, XIX. = *Megalodon* sp. ind., teste H o e r n e s , Mat. Monogr. d. Gttg. Megalodus, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XLII. 1880, p. 113.

Fam. **Gastrochaenidae** Gray.Gen. **Gastrochaena** Spengler.

G. (?) amorphia S t o p p a n i , Pal. Lomb. III. Couches à Av. contorta 1863, p. 258, Pl. LX. fig. 17.
Südalpen, Hauptdolomit.

G. herculea S t o p p a n i , Pal. Lomb. I Petrif. d'Esino, 1859, p. 81, Pl. XVI. fig. 11, 12.
Südalpen, Ladinisch.

- C. gracilis* *S top p a n i*, Pal. Lomb. I. Petrif. d'Esino, 1859, p. 89,
Pl. XVI. fig. 13. Südalpen, Ladinisch.
G. (?) obtusa *S top p a n i*, Pal. Lomb. I. Petrif. d'Esino, 1859, p. 79,
Pl. XVI. fig. 1—10, III. Couches à Av. contorta, 1865, p. 257,
Pl. LIX. fig. 22. Südalpen, Ladinisch-Hauptdolomit.
G. (?) ornata v. *G ü m b e l*, Bayer. Alpengeb. 1861, p. 408. —
v. *D i t t m a r*, Contortazone, 1864, p. 188 (Deest imago!).
Nordalpen, Rhaetisch.

Incertae Sedis.

Gen. **Fogiella** Krumbeck.

- Ob. Trias v. Buru etc. Beitr. Geol. v. Niederl. Ind. II/1, Palaeonto-
graph. Suppl. IV. 1913, p. 57.
Typ. *F. Deningeri* *K r u m b e c k* (1913).
F. Deningeri *K r u m b e c k*, l. c. p. 57, 124, Taf. III. fig. 24, 25.
Indonesien, Norisch
-

Die Lamellibranchiatenfaunen der Triasperiode.

Die Gesamtzahl der bisher aus der Triasperiode beschriebenen Lamellibranchiatenarten — soweit es sich nicht um Formen handelt, die als sp. ind. katalogisiert worden sind — beträgt 1795 die sich auf 168 Genera und Subgenera verteilen.

Die Zahl der Familien, Gattungen, beziehungsweise Unter-gattungen und Arten zeigt die folgende Liste.

Anisomyaria.

Aviculidae Lam.

Monotidae Kittl.

Monotis Bronn 12

Halobiidae Kittl.

Pectinidae L a m.

Pecten Klein (Aequipecten Fisch., Amussium Klein, Amphianira Bittn., Antijanira Bittn., Chlamys Bolt., Entolium Meek, Syncilonema Meek, Variamussium Phil., Velopecten Phil. inclus.)	199
Pleuronectites Schl.	6
Streblopteria M'Coy	1
Hinnites Defr.	2

Pinnidae Meek.

Pernidae Zitt.

Limidae O r b.

Lima Brug. (Plagiostoma Sow.,	Mantellum Bolt.	
inclus.)	.	73
Limea Bronn	.	2
Mysidioptera Sal.	.	72
Latemaria Wileck.	.	4
Pseudacesta Waag.	.	12
Aviculolima Phil.	.	1
Badiotella Bittn.	.	7
Tirolidia Bittn.	.	1
Hokonuiia Trechm.	.	1

Spondylidae Gray.

Ostreidae L a m.

Anomiidae Gray.

Anomia Müll. 4
Placunopsis Morr. et Lyce. 18

Myalinidae Frech.

Mytilidae Lam.

Modiolopsidae F i s c h.

Modiolopsis Hall

Homomyaria.

A. Taxodonta.

Nuculidae Gray.

Nucula Lam.	32
Ctenodonta Salt.	1
Leda Schum.	19
Palaeoneilo Hall	38
Phaenodesmia Bittn.	6

Arcidae Lam.

	Arctidae La m.
Area La m.	11
Arcoptera Bittn.	9
Cucullaea La m.	15
Grammatodon M e e k et H a y d e n	3
Catella H e a l	1
Hoferia Bittn.	8
Macrodon L y c	20
Macrodontella A s s m.	1
Parallelodon M e e k	1
Pichleria Bittn.	4

B. Heterodontia.

1. Integripalliata,

Trigoniidae L a m.

Nayadidae Lam.

Astartidae Gray.

Megalodontidae Zitt.

Isocardiidae Gray.

Tancrediidae Fisch.

Conocardiidae Neu m.

Conocardium Bronn 1

Praecardiidae Hören.

Cardiola Brod. ? 1

Cardiidae L a m.

Cyprinidae L a m.

2. Sinupalliata.

Donacidae D e s h.

Rhaetidia Bittn

Tellinidae Lam.

Tellina L.

Veneridae Gray.

C. Desmodonta.

Grammysiidae Fisch.

Cardiomorpha Kon.

Solenopsidae Neu m.

Solenomyidae Gray.

Anthracosiidae A m a l.

Anodontophora, Cossm. 3

Pleuromyidae Zitt.

Alloerisma King Pleuromya Ag. 4

Pholadomyidae Fisch.

Pholadomyia Sow.

Myidae Desh.

<i>Corbula</i> Brug.	8
<i>Pteromya</i> Moore	2
<i>Taeniodon</i> Dunk.	1

Anatinidae Gray.

<i>Anatina</i> Lam.	13
<i>Cercomya</i> Ag.	? 1
<i>Cuspidaria</i> Nardo	7
<i>Thracia</i> Leach	3

Panopaeidae Zitt.

<i>Panopaea</i> Men.	4
<i>Saxicava</i> Fleur.	1
<i>Homomya</i> Ag.	10
<i>Arcomya</i> Ag.	2

Burmesiidae Heal.

<i>Burmesia</i> Heal.	4
<i>Proalaria</i> Heal.	4

Dattiidae Heal.

<i>Datta</i> Heal.	1
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Gastrochaenidae Gray.

<i>Gastrochaena</i> Spong.	5
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Incert-Sed.

<i>Fogiella</i> Krumb.	1
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkenswert ist in dieser Liste zunächst das Zahlenverhältnis der Anisomyaria zu den Homomyaria. Der erstenen Ordnung gehören 80 Gattungen und Untergattungen mit 998 Spezies, der letzteren 88 Gattungen und Untergattungen mit 729 Spezies an. Der etwas größeren Zahl der Gattungen der Homomyaria steht die erheblich größere Artenzahl der Anisomyaria gegenüber, während tertäre oder rezente Lamellibranchiatenfaunen das umgekehrte Zahlenverhältnis zeigen. Familien, wie die *Aviculidae* mit 119 *Halobiidae* mit 195, *Pectinidae* mit 208, *Limidae* mit 165 Spezies sind zugleich die artenreichsten in der triadischen Bivalvenfauna. Nur die Familie der *Trigoniidae* unter den heterodonten Homomyariern stellt sich ihnen mit 149 Spezies ebenbürtig an die Seite. Auch die Taxodonta stellen, obwohl sie an Artenzahl hinter den Heterodonten (408 Spezies) erheblich zurückbleiben, noch immer ein ganz anscheinliches Kontingent unter den Homomyariern [169 Arten] und übertreffen an Artenzahl noch die Desmoconta mit 147 Spezies.

Der mesozoische Charakter der triadischen Lamellibranchiatenfauna tritt noch besonders auffällig in dem Misverhältnis der sinupalliaten zu den integripalliaten Heterodonten zutage. Neben 400 integripalliaten Spezies die sich auf 44 Genera verteilen gibt es nur acht Arten mit Mantelbucht, die vielleicht vier Gattungen angehören.

Die Beziehungen der triadischen Bivalvenfauna zu jenen der nachfolgend Perioden der mesozoischen Ära sind weitaus inniger als zu jenen des Palaeozoikums. Abgeschen von jenen langlebigen Gattungen, die aus den Palaeozoikum bis ins Kaenozoikum hineinragen findet sich allerdings eine nicht geringe Anzahl von solchen, die das Palaeozoikum mit der Trias verbinden, aber diese erlöschene fast ausnahmslos noch innerhalb der Triasperiode selbst und überschreiten nicht die Unterkante des Lias. Solche Gattungen sind: *Actinodesma* und *Leptodesma*, die bisher nur aus dem Devon bekannt waren und in der Trias große Seltenheiten darstellen, ferner *Aviculopecten*, *Pteroperna*, *Eumierotis*, *Streblopteria*, *Mysidioptera*, die aber erst in der Trias ihre Blüte erreicht, *Prospondylus*, *Myalina*, *Ctenodonta*, *Palaeoneito*, *Schizodus*, *Myophoria*, deren Akme ebenfalls erst in die Triasperiode fällt, *Pleurophorus*, *Conocardium*, *Alloerisma*.

Nicht sicher ist das Vorkommen der sonst nur aus dem Silur bekannten Genera *Modiolopsis* und *Cardiola*, ferner der Genera *Solenopsis* und *Cardiomorpha*.

Die große Umprägung der Lamellibranchiatenfauna im Mesozoikum wird durch das Erscheinen einer sehr beträchtlichen Anzahl neuer Gattungen und Untergattungen in der Triasperiode eingeleitet. Unter diesen sind der letzteren Periode die folgenden eigentümlich: *Bittneria*, *Oxypteria*, *Cassianella*, *Burckhardtia*, *Lilangina*, *Claraia*, *Rhynchopterus*, *Monotis*, *Amonotis*, *Daonella*, *Dipleurites*, *Enteropleura*, *Pleuronectites*, *Amphijanira*, *Antijanira*, *Angustella*, *Edentula*, *Hoernesia*, *Leproconcha*, *Latemaria*, *Pseudacea*, *Aviculolima*, *Badiotella*, *Tirolidia*, *Hokonua*, *Pseudoplacunopsis*, *Philippiella*, *Avicomyalina*, *Joannina*, *Mysidia*, *Pergamidia*, *Mytiloconcha*, *Arcoptera*, *Catella*, *Hoferia*, *Macrodontella*, *Pichleria*, *Heminajas*, *Myophoriopsis*, die allerdings vielleicht schon in den permischen Kulingschiefern von Spiti einen Vertreter besitzt, *Pseudocorbula*, *Pachycardia*, *Pomarringia*, *Trigonodus*, *Cryptocoelopsis*, *Protopis*, *Laubeia*, *Lycodus*, *Conocardia*, *Physocardia*, *Dicerocardium*, *Krumbeckia*, *Storthodon*, *Carnidia*, *Myophoricardium*, *Rhaetidia*, *Anodontophora*, *Palaeopharus*, *Burmnesia*, *Prolaria*, *Datta* und *Fogiella*. Zur Gänze triadisch sind die Familien der *Monotidae*, *Burmesiidae* und *Dattiidae*, zum weitaus überwiegenden Teil jene der *Halobiidae* (mit Ausnahme von *Posidonia*) und *Isocardiidae* (mit Ausnahme von *Isocardia*).

Die folgenden Gattungen erscheinen zum ersten Mal in der Triasperiode und setzen sich aus dieser in jüngeren Schichtgruppen fort: *Hinnites*, *Pinna*, *Perna*, *Limea*, *Ctenostreon*, *Plicatula*, *Dimyodon*, *Gryphaea*, *Alectryonia*, *Anomia*, *Placunopsis*, *Mytilus*, *Phaenodesmia*, *Cucullaea*, *Arca*, *Cardinia*, *Trigonia*, *Anodontia* (sonst zumeist erst aus dem Eozän zitiert), *Unio*, *Cardita*, *Opis*, *Tancredia*, *Schafhäutlia*, *Unicardium*, *Cardium*, *Protocardia*, *Cypriocardia*, *Cyprina*, *Tapes*, *Tellina*, *Solenomya*, *Pleuromya*, *Homomya*, *Panopaea*, *Saxicava*, *Pholadomya*, *Anatina*, *Thracia*, *Cuspidaria*, *Corbula*, *Gastrochaena*. Unsicher sind: *Inoceramus*, *Spondylus* (eine sehr zweifelhafte Art aus der Obertrias von Buru), *Terquemia* (zwei zweifelhafte Arten aus der alpinen Trias), *Isocardia* — je eine zweifelhafte Spezies wird von Stöppani aus den Südalpen, von Guembel aus den Nordalpen angegeben — und *Venus*.

Keine einzige Bivalvenspezies geht aus dem Permsystem in die untere Trias hinauf. Dagegen ist eine nicht ganz geringe Zahl von Arten den Faunen der rhätischen Stufe und des Liás gemeinsam. Sie finden sich in der nachfolgenden Liste zusammengestellt.

Avicula Deshayesii Terq u. (Rhaet des Apennin).

Avicula Nilssonii Lundgr. (Rhaet. u. Liás von Skåne).

Oxytoma inaequivale Sow.

Pecten (Chlamys) Valoniensis Defr.

Pecten (Entolium) Hehlii Orb.

Pecten (Entolium) liasinus Nyst. (Rhaet. d. Karpathen?).

Gervilleia inflata Schafh. (Rhaet bis Dogger).

Lima exaltata Terq. (vielleicht im Rhaet d. Schweiz).

Lima compressa Terq u.

Plicatula hettangiensis Terq u.

Plicatula spinosa Sow. (vielleicht im Rhaet d. Schweiz)

Dimyopsis intussstriata Emmer.

Ostrea anomala Terq u.

Ostrea Hisingeri Nils.

Ostrea irregularis Gdf.

Ostrea Pictetiana Mort.

Mytilus liasinus Terq u.

Mytilus psilonoti Quenst. | (Sämtlich auch im Rhaet d.

Mytilus rusticus Terq. | Apennin)

Modiola minima Sow. (Rhaet v. England).

Modiola minuta Gdf.

Parallelododon hettangiensis Terq u.

Myyoconcha psilonoti Quenst.. (Rhaet d. Schweiz).

Tancredia sinemuriensis Mart. (Rhaet d. Schweiz).

Lucina problematica Ter q. (Rhaet d. Apennin).

Protocardia Philippiana Dunk.

Pholadomya prima Quenst. (vielleicht auch im Rhaet der Westschweiz, Oester.).

Für eine Sonderung nach zoogeographischen Provinzen können die Lamellibranchiaten der Triasperiode nur in beschränktem Maße herangezogen werden, insbesondere deshalb, weil unsere Kenntnis triadischer Bivalvenfaunen außerhalb des Mediterranen Reiches eine ziemlich dürftige ist. Die nachstehende Liste der außerhalb des Mediterranen Reiches überhaupt bekannten Gattungen und Arten lässt diese Tatsache klar hervortreten.

Zahl der Spezies

	Himalayisch	Arktisch	Andin*)
Avicula	11	4	2
Actinodesma	1		
Cassianella	7	1	
Burckhardtia			2
Leptodesma		1	
Meleagrina		2	
Lilangina	1		
Aviculopecten		1	
Oxytoma		2	
Pseudomonotis	9	7	2
Eumorphotis	8	7	1
Eumierotis		2	
Claraia	4	1	
Rhynchopterus		1	1
Monotis	2	1	
Amonotis	1		
Daonella	7	6	1
Halobia	24	2	2
Posidonia	2	4	2
Pecten (Subgen. inclus.)	27	13	1
Pinna	1	2	
Gervilleia	11	9	
Angustella	3		
Pteroperna	1		
Hoernesia	6		
Perna	2		
Lima (Subgen. inclus.)	9	8	
Mysidoptera	3	1	
Hokonua	2		
Latemaria	1		
Plicatula	5		
Dimyodon		1	
Dimyopsis	1		
Pseudoplacunopsis	1		
Ostrea		1	
Gryphaea		3	
Alectryonia	2		
Enantiostreon	1		
Anomia	1		
Placunopsis	3		
Myalina		1	
Mytilus	2	1	1
Modiola	5	1	

*) Vergl. C. Diener: Die marinen Reiche der Triasperiode. Denkschr. Akad. Wissensch. Wien, XCII. 1915, p. 411.

Zahl der Spezies

		Himama layisch	Arktisch	Andin
<i>Modiolopsis</i>	.	?	1	
<i>Nucula</i>	.	6	2	
<i>Leda</i>	.	4		
<i>Palaeoneilo</i>	.	8	2	13
<i>Phaeonodesmia</i>	.		1	1
<i>Area</i>	.		1	
<i>Areoptera</i>	.	2	2	
<i>Macrodon</i>	.	1		
<i>Grammatodon</i>	.	1		
<i>Catella</i>	.	1		
<i>Hoferia</i>	.	1		
<i>Cardinia</i>	.		1	1
<i>Myophoria</i>	.	26	5	
<i>Myophoriopsis</i>	.	2		
<i>Trigonia</i>	.		1	
<i>Trigonodus</i>	.	1	1	1
<i>Unio</i>	.			4
<i>Pomarangina</i>	.	2	2	
<i>Cardita</i>	.	3		
<i>Myoconcha</i>	.	2		
<i>Pleurophorus</i>	.	3		
<i>Megalodon</i>	.	3	2	
<i>Dicerocardium</i>	.	4		
<i>Tancredia</i>	.	1		
<i>Lucina</i>	.	2		
<i>Dentilucina</i>	.	1		
<i>Krumbeckia</i>	.	1		
<i>Schafhäutlia</i>	.	2		
<i>Concardium</i>	.	2	2	
<i>Myophoricardium</i>	.	2		
<i>Protocardia</i>	.	4		
<i>Isocyprina</i>	.	2		
<i>Anisocardia</i>	.	1		
<i>Cardiomorpha</i>	.	2		
<i>Anodontophora</i>	.	11	5	
<i>Palaeopharus</i>	.		3	
<i>Solenopsis</i>	.		1	
<i>Pleuromya</i>	.	2	1	1
<i>Pholadomya</i>	.		1	
<i>Corbula</i>	.			1
<i>Anatina</i>	.		1	
<i>Cuspidaria</i>	.		1	
<i>Thracia</i>	.	2		
<i>Homomya</i>	.	3	1	
<i>Burmesia</i>	.	4		
<i>Proalaria</i>	.	4		
<i>Datta</i>	.	1		
<i>Fogiella</i>	.	1		

Dieser Liste entsprechend, entfallen auf das Himamalayische Reich 70 Gattungen mit 283 Spezies, auf das Arktische 45 Gattungen mit 119 Spezies und auf das Andine 16 Gattungen mit 36 Spezies. Nach den Ordnungen und Unterordnungen gruppieren sich die Arten in folgender Weise.

	Anisomyaria	Homomyaria		
		Taxodonta	Heterod.	Desmod.
Himamalayisch	164	24	63	32
Arktisch	84	8	14	13
Andin	15	13	6	2

Im Himamalayischen und Arktischen Reich ist das Zahlenverhältnis der Anisomyaria und Homomyaria für die letztere Ordnung noch ungünstiger als im Durchschnitt der gesamten Bivalvenfauna der Triasperiode. Nur im Andinen Reich überwiegen die Homomyaria infolge der außerordentlichen Häufigkeit des Genus *Palaeoneilo* in den Triasablagerungen von Zacatecas.

Neben den kosmopolitischen Lamellibranchiatengattungen spielen solche, die für eine bestimmte Provinz ausschließlich bezeichnend sind, eine untergeordnete Rolle. Auch sind sie meist artenarm und selbst innerhalb ihres Verbreitungsgebietes keineswegs häufig. Im Himamalayischen Reich gehören zu ihnen: *Hokonvia*, *Catella*, *Lilangina*, *Pomarangina*, *Krumbeckia*, *Burmesia*, *Prolaria*, *Fogiella* und *Datta*, während der Triasperiode außerdem noch: *Actinodesma*, *Pteroperna*, *Modiolopsis* (?), *Dentalucina*, *Conocardium* und *Cardiomorpha* (?), im Arktischen Reich: *Palaeopharus*, und, soweit die Verbreitung die Triasperiode betrifft, *Leptodesma*, *Eumicrotis* und *Gryphaea*, im Andinen Reich nur *Burckhardtia*.

Viele Arten triadischer Lamellibranchier sind durch eine weite Verbreitung ausgezeichnet. Da diese bei einigen, z. B. in den Familien der *Halobiidae*, *Aviculidae*, *Trigoniidae* mit einer beschränkten vertikalen Verbreitung zusammenfällt, so entsprechen sie den Anforderungen am gute Leitfossilien in vorzüglicher Weise. So findet sich die Bivalvenfauna der Werfener Schichten mit sehr geringen Abänderungen in Bokhara, der Salt Range und selbst noch an den Küsten der Ussuribucht wieder. *Pecten discites* z. B. ist aus der Untertrias Deutschlands, Spitzbergens, des Mittelmeergebietes, der Salt Range und des Usshrigegebietes bekannt. Die obertriadische *Pseudomonotis ochotica* wird von der ganzen Eismeerküste Sibiriens, ferner aus Spitzbergen, Japan, Indonesien, Alaska, Californien, Peru und der Krym zitiert.

Manche Arten zeigen eine auffallend diskontinuierliche Verbreitung, so *Avicula Hofmanni*, die in den karnischen Schichten des Bakony und Mexicos erscheint, oder *Halobia Zittelii*, die entlang der Eismeerküste von Ellesmereland über die Bäreninsel bis Neu-Sibirien ein wichtiges Leitfossil der karnischen Stufe darstellt, aber auch südlich vom Äquator in der Obertrias Neu-Caledoniens sich findet.

Index.

Seite	Seite	Seite
Actinodesma 16	Coelopis 203	Hokonuia 118
Actinophorus 29	Conchodus 211	Homomya 245
Aequipecten 65	Conocardiidae 222	Homomyaria 146
Alectryonia 127	Conocardium 222	
Alloerisma 234	Conocardia 215	Inoceramus 101
Amonotis 46	Corbis 216	Ioannina 134
Amphianira 65	Corbula 240	Isocardia 212
Amussium 65	Craspedodon 213	Isocardiidae 212
Anatina 242	Cryptocoelopis 204	Isoeyprina 226
Anatinidae 242	Ctenodonta 150	
Angustella 97	Cucullaea 158	Krumbeckia 217
Anisocardia 225	Cuspidaria 243	
Anisomyaria 16	Cypicardia 225	Latemaria 117
Anodontata 192	Cyprina 226	Laubeia 211
Anodontophora 229	Cyprinidae 225	Leda 151
Anomia 129	Daonella 46	Leproconcha 101
Anomiidae 129	Datta 247	Leptochondria 65
Anoplophora 229	Dattiidae 247	Leptodesma 27
Anthracosiidae 229	Dentilucina 215	Lilangina 34
Antijanira 65	Desmodonta 229	Lima 102
Arca 157	Dicerocardium 213	Limea 110
Arcidae 157	Dimyodon 118	Limidae 102
Areomya 246	Dimyopsis 121	Lithodomus 139
Arcoptera 158	Dipleurites 51	Lucina 215
Astarte 194	Donacidae 227	Lucinidae 215
Astartidae 194	Donax 227	Lycodus 212
Astartopis 185	Edentula 98	Lyrodon 166
Avicula 16	Enantiostreon 128	
Aviculidae 16	Enteropleura 52	Macrodon 161
Aviculolima 117	Entolium 65	Macrodontella 164
Aviculomyalina 134	Eumicrotis 40	Mactra 227
Aviculopecten 28	Eumorphotis 40	Mantellum 102
Axinus 216	Fimbria 216	Megalodon 205
Badiotella 117	Fogiella 248	Megalodontidae 205
Bakewellia 98	Gastrochaena 247	Meleagrina 27
Bittneria 27	Gastrochaenidae 247	Mesodesmidae 227
Burckhardtia 34	Gervillea 88	Modiola 140
Burmesia 247	Gervillella 88	Modiolopsidae 145
Burmesiidae 246	Gonodon 217	Modiolopsis 145
Cardiola 165	Grammatodon 160	Monotidae 43
Cardiomorpha 229	Gruenewaldtia 165	Monotis 43
Cardiidae 222	Gryphaea 129	Mycites 234
Cardinia 165	Halobia 52	Myalina 133
Cardita 195	Halobiidae 46	Myalinidae 133
Cardium 222	Heminajas 165	Myidae 240
Carnidia 223	Heterodonta 165	Myoconcha 198
Cassianella 29	Hinnites 86	Myophoria 166
Catella 161	Hoernesia 98	Myophoricardium 223
Ceromya 243	Hoferia 161	Myophoriopsis 185
Ceromya 234		Mysidia 134
Chlamys 65		Mysidoptera 111
Claraia 38		Mytilidae 135
		Mytiloconcha 135
		Mytilus 135

Seite	Seite	Seite
Nayadidae 192	Pinnidae 86	Septiola 145
Neomegalodon 205	Placunopsis 130	Solen 228
Neoschizodus 188	Plagiostoma 102	Solenomya 229
Nuculidae 146	Pleuromya 235	Solenopsidae 229
Nucula 146	Pleuromyiidae 234	Solenopsis 229
Odontoperna 88	Pleuronectites 85	Spondylidae 118
Opis 203	Pleurophorus 204	Spondylus 123
Ostrea 125	Plicatula 119	Storthodon 221
Ostreidae 125	Pomarangina 188	Streblopteria 86
Oxypteria 29	Posidonia 62	Synclonema 65
Oxytoma 34	Praecardiidae 222	
Pachycardia 188	Polaria 247	Taeniodon 241
Pachyrisma 212	Prospondylus 122	Tancredia 215
Palaeocardita 195	Protocardia 224	Tancrediidae 215
Palaeoneilo 153	Protopis 204	Tapes 228
Palaeopharus 229	Psammoconcha 244	Tauroceras 212
Panopaea 244	Pseudacesta 117	Taxodonta 146
Panopaeida 244	Pseudocorbula 186	Tellina 228
Parallelodon 164	Pseudomonotis 35	Tellinidae 228
Pecten 65	Pseudoplacunopsis 121	Terquemia 123
Pectinidae 65	Pteromya 241	Thracia 244
Pergamidia 135	Pteroperna 93	Tirolidia 118
Perna 101	Pullastra 228	Trigonodus 190
Pernidae 88	Rhaetidia 227	Trigonia 190
Phaenodesmia 156	Rhynchopterus 43	Trigoniidae 165
Philipiella 124	Sanguinolaria 229	
Pholadomya 240	Saxicava 245	Unicardium 212
Pholadomyiidae 240	Scaldia 217	Unio 193
Pholas 247	Schafhäutlia 217	Unionina 193
Physocardia 214	Schizodus 189	Variamussium 65
Pichleria 164	Septifer 139	Velopecten 65
Pinna 86		Venus 228

